

cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Det här verket har digitaliseringen vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



GÖTEBORGS UNIVERSITET

Priskurant å Frö och Växter,



Balantium antarcticum.

Från Göteborgs Trädgårdsförening.

Vänligen anhålls att denna priskurant — ifall den skulle komma någon tillhanda, som deraf ej kan hafva nytta — måtte godhetsfullt öfverlemnas åt någon, som för det dermed afsedda ändamålet kan använda densamma.

Göteborgs Trädgårdsförening.

Obs! Då det både för köpare och säljare bör vara önskvärt, att uti deras affärsförhållanden rubbning ej må uppstå genom den **förändring i handelsboks vitsord**, som, jemlikt Kongl. Förordn. den 12 September 1868, från och med 1870 inträdt, få vi, vid öfverlemnandet af vår priskurant för året, framställa den önskan, att våra kunder å **andra orter** behagade efter **emottagandet af räkningar, återsända** de räkningarne åtföljande **bvisen derom**, försedde med vederbörlig **underskrift**.

Requisitioner, hvars värde ej uppgår till **minst 10 Rdr Rmt**, böra, för att blifva effektuerade, ovilkorligen **åtföljas** af liquid. Öfverskott af insände penningar åter-sändes noggrannt, då räkning å det expedierade aflatås. Innehållet å nästa sida torde benäget noga observeras.

Göteborgs Trädgårdsförening.

PRISKURANT,

gällande för året

1871,

i tvenne huvudafdelningar,

innehållande förteckning å

F R Ö OCH VÄXTER,

som billigt försäljas af

Göteborgs Trädgårdsförening.

Rekommenderande denna priskurant hos resp. blomstervänner och landbrukare, anhålla vi, att beställningar måtte så tidigt som möjligt oss tillsändas (helst 8 à 14 dagar före det reqire-rade skall användas) och torde observeras, att bref, reqvisitioner och remisser **adresseras:**

"Till Göteborgs Trädgårdsförening."

1. Genom denna nya priskurant annulleras alla föregående. De i densamma förekommande kulturbeskrifningar och öfrige upplysningar göra den i någon mån äfven till en handbok i trädgårdsskötsel. Alla nyare, väckrare eller eljest utmärktare sorter äro tryckta med särskild stil, för att lättare kunna observeras.
2. Reqirementet anmodas att utskrifva reqvisitionen på **ett särskilt blad**, helst upptagande **frö för sig**, och **växter för sig**, med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande. Då det någon gång inträffar att en eller annan sort så starkt requireras, att förrådet deraf snart uppriymmes, vore det önskligt, att å reqvisitionen antecknades, om det tillåtes oss att i så fall fylla bristen med andra, motsvarande sorter. De requirenter, som vilja anförtro oss urvalet af sorterna, våga vi försäkra, att det skall ske med största omsorg.
3. Vid oförutsedda förändringar i värdet å de mest kuranta frösorerna, ikläda vi oss ingen annan förbindelse, än att notera det billigaste pris, som omständigheterna medgivna.
4. Reqvisitioner, som icke åtföljas af **liqvid** eller **anvisning** på något kändt handelshus härstädes, **expedieras ej**, såvida regirenten ej förut stött i affärsförbindelse med oss.
5. **Överskott** af insände penningar återsändas noggrannat då räkning å det requirerade aflatés.
6. **Reqvisitioner, hvars värde ej uppgår till minst 10 rdr rmt, torde alltid åtföljas af liqvid.**
7. Å reqvisitioner, hvilka åtföljas af liqvid och uppgå till belopp af minst 50 rdr rmt, godtgöres 6 % rabatt; dock för rabatt ej beräknas för **gräs- och ekonomifrö** eller för **emballage**.
8. Afsändningen sker för köparens räkning och risk, sedan vi såsom afsändare uppfyllt våra förbindelser.

Våra priskuranter å frö, växter och lökar erhållas på begüran kostnadsfritt.

*Göteborgs Trädgårdsförening,
genom Georg Löwegren.*

Innehållsförteckning.

Priskurantens innehåll är uppställdt i följande ordning:

Första Åfdelningen,

Priskurant å frö;

A. Köksträdgårdsväxter:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| I. <i>Kålväxter.</i> | VI. <i>Spinatväxter.</i> |
| II. <i>Rotväxter.</i> | VII. <i>Salladväxter.</i> |
| III. <i>Knölväxter.</i> | VIII. <i>Kryddväxter.</i> |
| IV. <i>Skidfrukter.</i> | IX. <i>Lökväxter.</i> |
| V. <i>Sparrisväxter.</i> | X. <i>Gurkartade växter.</i> |
| XI. <i>Ätliga Svampar.</i> | |

B. Gräs-, Foder- och Ekonomiväxter:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| I. <i>Gräsväxter.</i> | III. <i>Diverse Foderväxter.</i> |
| II. <i>Klöfverväxter.</i> | IV. <i>Diverse Ekonomiväxter.</i> |

C. Träd- och Buskväxter:

Fruktkärnor.

D. Blomster- och Bladväxter:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| I. <i>Modeblommor, (Sortiment).</i> | V. <i>Ettåriga (annuella) växter.</i> |
| II. <i>Dekorativna Bladväxter.</i> | VI. <i>Två- och fleråriga (bienna och perenna) växter.</i> |
| III. <i>Dekorationsgräs.</i> | VII. <i>Krukväxter.</i> |
| IV. <i>Stingerväxter.</i> | |

E. Ormbunkar.

F. Barrväxter.

Andra Åfdelningen,

Priskurant å växter:

- | | |
|---|--|
| I. <i>Fruktträd och Bärbuskar, m. m.</i> | IV. <i>Törnrosor för fritt land.</i> |
| II. <i>Träd och Buskar till Alle-, Park- och Trädgårdsanläggningar.</i> | V. <i>Fröplantor till Ettåriga Blomsterväxter.</i> |
| III. <i>Buskar till häckar och bersäder.</i> | VI. <i>Fleråriga Blomsterväxter.</i> |
| VII. <i>Krukväxter.</i> | |

I slutet af Priskuranten finnes infördt ett:

Register,

innehållande alla i densamma förekommande svenska växtnamn, jemte anvisning hvor de i katalogen återfinnas.

Första Afdelningen,

Prisförteckning å frö:

A. Röksträdgårdsväxter.

Efter vigt säljes ej mindre än 1 ort. Från och med 25 ort säljas efter $\frac{1}{2}$ priset.

I. Kålväxter.

Brassica, (*Cruciferae*.)

	<i>Pr</i>	<i>H.</i>	<i>Ort.</i>
	Rmt	Rd	ö.
Bladkål, (<i>Br. oleracea acephala</i>)			
” hög, blå, krusbladig	2,25	—	4
” grön, krusbladig	2	—	4
” låg, blå krusbladig	1,75	—	4
” grön krusbladig	1,75	—	4
” ljusgrön Edinburger,	2,50	—	5
” plumage- eller fjäder-,	—	—	20
” palmträd-, å port. 8 öre	—	—	20
” jätte-,	4,75	—	7
” träd- eller kokål	2,25	—	4
” snitt- eller värkkål	1	—	3
” ” brun	1	—	3
” ” gul	3	—	5
” ” grön	2	—	4
Till odling för köket är isynnerhet den låga, blå och gröna, krusbladiga kålen att rekommendera. Fjäderkålen odlas hufvudsakligen för sina språckliga, färgskiftande blad. Jätte-, ko- och palmträdkålen användes till kreatursfoder; den sistnämnda äfven till prydnadsväxt på kallfjord.			

Brüssel eller **Rosenkål**, (*Br. oleracea gemmifera*.)

" hög	3 — —	5
" läg, förbättrad	4,75 —	7
" roseberry	4 — —	6

Dessa utmärkta kälssorter fördra god, vilt gödslad jord och fritt läge. De bilda, synnerligen om toppen af knipes, längs utmed stammen en mängd små, törnroslikta hufvuden, hvilka, om de väl tillagas, liksom välsmakande som blomkål. Inplanteras på hösten i källare, hyvarest de hela vintern fortfarande bilda hufvuden.

Savoykål eller Wirsing. (Br.)

<i>(var. capilla varia.)</i>					
tidig, gul Blumenthaler	4	—	—	6	
" " Drumhead	3,25	—	—	5	
" sen	3,25	—	—	5	
" tidig, grön	5,25	—	—	7	
" chou mareelin	4,50	—	—	7	
" Waterloo curled	3,50	—	—	6	
Alla sorterna behandlas som vanliga					

H. S. N. 85

Hufvudkål, (*Br. ol. capitata.*)

" hvit, extra stor, platt Braunschweiger	4,50	—	7
" platt Lübecker,	4,50	—	7
" Yorker, tidig	3,50	—	6

	<i>Pr. ü. Ort.</i>	<i>Rmt Rd. ö.</i>	<i>Rd. ö.</i>
Hufvudkål, hvit Drumhead-, stor Engelsk, sen	2,25	—	4
„ hvit midsommarkål, låg, tidig, utmärkt	3,75	—	6
„ majspets-, tidig, med spetsiga hufvuden	6	—	8
„ sockertopp-, tidig, med spet- siga hufvuden	4	—	6
„ Enfields Markt-, tidig	3,50	—	6
„ Emperor-, tidig	3,50	—	6
„ Prince Albert	3,50	—	6
„ röd Cabus-, stor, platta hufvuden — — —	7	—	—
„ Erfurter, tidig	—	—	15
Blomkål, (Br. ol. botrytis.)			
„ Holländsk dverg-, à p. 10 öre — — —	50	—	—
„ tidig engelsk	18	—	20
„ sen engelsk	18	—	20
„ Asiatisk, stor sen	18	—	20
„ Cyprisk, tidig	18	—	20
„ Siciliansk, svart	—	—	25
„ standholder-, utmärkt	20	—	22
„ Walchern-, utmärkt	20	—	32
„ Erfurter dverg-, (Haages) 1:ma — — —	2,50	—	—
„ dverg-, 2:da à p. 10 öre — — —	1	—	—

Till drifning är Haages Erfurter dvergblokmål den bästa. Blifver ej gärna öfver 15 tum hög, har helt små blad och stora, fasta, rent hvita blomhufynden.

Broccoli; Sparriskål, (*Br. oleracea*, *botrytis cymosa*.)

„ Engelsk, violett —— 8
 „ „ hvit —— 8

Denna, flerstädes i utlandet med
förfärlig odlade, käl är nära be-
slagtad med blomkålen, hvarf den
endast är en förrändring. Odlas
icke så mycket för blomknoppar-
nes skull, som fastmora för de
tjocka, köttiga blomstjälkerna,
hvilika kunnna nyttjas som sparris.
Behandlas som blomkål, men be-
läfver större utrymme.

II. *Rotväxter*.

Ur familjen Cruciferæ:

Kålrabbiti, (*Br. ol. caulocarpa.*)

„ glas-, tidiga, hvita	4,25	—	6
„ „ tidiga, blå	4,75	—	7
„ „ sena, hvita	4	—	6

	Pr. fl. Ort.	Rmt Rd ö. Rd. ö.	Pr. fl. Ort.	Rmt Rd ö. Rd. ö.
Kålrabbiti, glas-, sena blå	5 — — 7		Rädiser, alla sorter, blandade	2 — — 4
Trifvas båst och blifya smakligast på svala platser. Planteras på 1 à $1\frac{1}{2}$ fots afstånd från hvarandra.			Bifva båst i en sandig, ej nygödslad jordmåne. För att ständigt hafta tillgång på rädiser utsås fröet en gång i månaden t. o. m. Augusti.	
Kålrotter, (Br. <i>Napus rapifera</i>)			R. caud. har långa, ormlikla skid- or, hvilka kunna inläggas som gurkor och äro mycket välsma- kande.	
" gula, underjordiska	1,10 — 3			
" hvita, underjordiska	— 90 — 3			
" Schmalz, gula	1,25 — 3			
Välsmakande och lättkokta.				
" jätte-, nya, rödgrå toppiga, släta . .	1,25 — 3		Ur familjen Compositæ:	
" golden ball, guldgulda	1,50 — 4		Haftrerötter, (<i>Tragopogon porri-</i> <i>folium</i>)	8 — — 10
" stora, hvita, Pommerska	2 — — 4			
De gula sorterna, hvilka hos oss van- ligen kallas „rötabagga,“ äro mest omtyckta. Planteras $1\frac{1}{2}$ fot ifrån hvarandra, eller utsås mycket tunnt i rader och gallras sedan.			En tvåårig växt hvars frö utsås ti- dig på våren i lös och lucker, året förrt gödslad jord. Om hösten upptagas rötterna och förvaras öf- ver vintern i källare, uti sand.	
Rofvor, (Br. <i>Rapa rapifera</i>)				
" tidiga, hvita, runda, maj	85 — 3		Scorzonera, (<i>Scorzonera hispa-</i> <i>nica</i>)	4,50 — 7
" Amerikanska, runda, röda	2,50 — 5		Behandlas och användas som föreg.	
" Maltheser, fina gula	2,50 — 5		Vid upptagning av såväl scorzonera som haftrerötter bör man noga akta på att rötterna ej på något sätt såras, ty då utrinner den i dem be- fintliga, hvita mjölkasften, hvilket försakar röta.	
" Wilhelmsburger-, runda, gula	1,25 — 3			
" Wiburger, gula	2 — — 4		Cichoria, (<i>Cichorium intybus</i>)	
" Teltower, små, äkta	2,50 — 5		" äkta Braunschweiger	1 — — 3
" Märkiska	1,50 — 4		" ny jätte	2 — — 4
" snow ball, hvita, Eng. runda	1,25 — 3		Rötterna upptagas om hösten och an- vändas som kaffesurrogat. Bladen lempa ett godt foder till mjölkor. Se vidare under rubriken „Sallad- växter.“	
" Bottfelder-, långa, gula	1,25 — 3			
" höst-, hvita, långa, gula	1,25 — 3		Morötter, (<i>Daucus Carota</i>)	
" Åker-, rödtoppiga, långa	1,25 — 3		" tidiga karoter	1,75 — 4
Med undantag af majrofvan, hvilken utsås så tidigt som möjligt, böra rofsorterna ej utsås förr än kort före eller straxt efter midsommar. Jorden bör ej till någon af rofsor- terna vara nygödslad, utan helde- rä nägot mager. De små sorterna böra hafta 3 à 4 tum afstånd från hvarandra; de större fordra minst dubbelt så stort utrymme.			" Douvikér-, korta, tidiga	2 — — 4
Rättikor, (<i>Raphanus sativus esculen-</i> <i>tus</i>)			" Pariser- (très-courtes de Paris)	4,50 — 7
" vinter-, långa, hvita	1 — — 3		" Hornska, tidiga, långa, röda	1,50 — 4
" " runda, svarta	1 — — 3		" violetta, långa, fina	1,75 — 4
" sommar-, tidiga, svarta	1,60 — 4		" hvita, genomskinliga, fina	2 — — 4
" " tidiga, hvita	1,60 — 4		" rent hvita, fina	1,60 — 4
" " " gula Wiener Maj.	2 — — 4		" Surrey-, långa, röda	2 — — 4
" höst-, roseröda	1,60 — 4		" Altringhams-, stora, långa, söta	1,10 — 3
Fordra en nägot fuktig, lös och luc- ker, förra året gödslad jord. Fröet utsås i rader, 4 à 5 tum från hvar- andra.			pr 100 fl. 105 rdr.	
Rädiser, (<i>Raph. sativ. radicula</i>)			" Braunschweiger-, långa, röda	1,25 — 3
" månads-, runda hvita	1,60 — 4		pr 100 fl. 120 rdr.	
" " runda röda	1,60 — 4		" Belgiska, hvita stora med gröna toppar, pr 100 fl. 75 rdr	— 80 — 3
" " " gula	1,80 — 4		" orangegula, gröntoppiga jätte- pr 100 fl. 120 rdr.	1,25 — 3
" " " violetta	1,80 — 4		Till drifning är de tre förstnämnda sorterna bäst passande. De hvita sorterna, med undantag af grö- ntoppiga belgiska, äro såsom stuf- vade utmärkt välsmakande. Al- tringhams-, de hvita Belgiska och orangegula morötterna användas hufvudsakligen till kreatursfoder. Morötterna fordra en fet, men ej nygödd, sandig, lätt och lös jord.	
" Wood's superb frame Radish	1,50 — 4			
" Early scarlet " "	2 — — 4			
" långa, hvita	2 — — 4			
" långa, tidiga, rosemöda, Glas-	1,75 — 4			
" ovala, högröda, utmärkta	2,75 — 5			
" hvita, italienska	1,75 — 4			
" högröda med hvita rotänder	2,75 — 5			
" från Madras (<i>Raph. caudatus</i>). — — — 75				
à port. 10 öre.				

Pr. fl. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

Körfvelrosvor, (*Scandix bulbosa*)

" vanliga	2,50	—	5
" Sibiriska (<i>Chærophyllum Prescottii</i>).		—	10

Frukt bör helst sätts om hösten, ty om det över vintern förvaras så gror den mycket ejemant. Fordrar fet och lucker jord. De om hösten såddé äro i Juli färdiga att begagnas i hushållet. En fin och omtyckt köksväxt.

Rotpersilja, (*Petroselinum sativum*)

" stor Bardowiker,	60	—	3
" socker	90	—	3
Sås i lös, något fuktig jord, i rader och gallras sedan så, att hvarje planta får en kvadratrotföt utrymme. Öfrige sorter, se kryddväxter.			

Rotselleri, (*Apium graveolens*)

" stor, Berliner-	4	—	6
" mycket stor Erfurter-	5	—	7

Frukt sås tunnt i en ljum driftbänk och plantorna utättas, med 1 à $1\frac{1}{2}$ fots afstånd mellan hvardera, i starkt gödslad, något lerbländad och fuktig jord. Utmärkt släta och vackra rötter erhålls, om man i Augusti borttagar det öfversta jordlagret kring rötterna och sedan afskär alla sidorötter. Upptagas om hösten och förvaras i källare.

Sockerötter, (*Sium Sisarum*)

" vanliga	4	—	6
Fet, ej nygödslad jord och varmt läge. Fortplantas äfven genom sidorötter, hvilka om våren planteras på 1 fots afstånd från hvarandra. Bör ej förevaslas med scorzonera, som af många kallas sockerötter.			
" Castle Nandy, utmärkta . . .	1,75	—	4
" White's new, karmosinröda . . .	1,75	—	4
" Bassano-, runda, ljusröda, fina . . .	1,75	—	4

För hvarje planta läggas 3 à 4 frökornar så, att plantorna få 1 fots afstånd emellan hvarandra. Sedan borttagas de svagaste så att endast den starkaste plantan får stå qvar på hvarje ställe. De utgallrade kunnas, om man så vill, planteras på en annan plats.

Rapunzel, (*Campanula Rapunculus*)

" små, fina, äkta.	1,50	—	4
----------------------------	------	---	---

Flerärig; utsås i rader i god jord. Bör ej förbländas med Valeriannela eller Fedia Olitoria, hvilka somliga äfven kallas rapunzel.

Rapontica; Rapunzellselleri, (*Oenothera biennis*)

" stor gul.	1,60	—	4
---------------------	------	---	---

Utsås i Maj på kalljord. (Vid tidigare sädd skjutsa de redan första sommaren blomstjälkar, hvarefter rotten är oduglig.) I Oktober upptagas rötterna och övervintras i källare eller skärs de i skifvor och inläggas i åttika och olja.

III. Knölväxter:

(Tuberosæ.)

Pr. fl. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

Jordärtskockor, (*Helianthus tub.*)

" vanliga		—	30	—
Fortplantas genom rötter, hvilka läggas i rader, 6 tum djupt och med 1 fots mellanrum. Om hösten upptages hvad man ämnar använda under vintern; de öfriga qvarlemnas på sängen. Växten blir 6 à 8 fot hög; bör derföre sättas så, att den ej hindrar spädare växter.				

Potates. (*Solanum tuberosum*)

" blandade sorter.		5,25	—	7
Utsås om våren i en ljum driftbänk. När nattfrosterna upphört upplantas plantorna på sängar och behandlas som vanligt. Genom frösädd erhåller man ofta nya och för de lokala förhållanden passande sorter.				

Jordmandel, (*Cyperus esculentus*)

" vanlig		—	—	—	5
En gräslik växt, hvars rotknölar sedan nattfrosten upphört upplantaras i god, sandig jordmän, 6 à 8 tum från hvarandra. Jordmandeln användes dels som kaffesurrogat, dels stekes den och ätes som kanstanjer.					

Harklöver, (*Oxalis esculenta*)

lökar, pr 100 st. 1 rdr.		—	—	—	—
Fortopl. genom smålökkar, som af växten bildas i mängd. Planteras 1 tum djupt och med 5 tums mellanrum. Om hösten upptagas plantorna, lökarne förvaras frostfritt och de hvita, tjocka rötterna tillagas som blomkål.					

IV. Skidfrukter; Ärter, Bönor etc.:

(Leguminosæ.)

Pr. fl.

Rmt Rd ö.

Sockerärter, (*Pisum sativum*)

" stora sabel, pr 100 fl. 50 rdr . . .	—	55			
" , sabel-med vaxgula skidor . . .	—	80			
" buxbom-, låga.		1,25			
" kryp.		60			
" Queen of dwarfs		80			

At alla sorterna sockerärter anvindes hela skidan till mat. De trenne första behöfva 3 alnar långt ris; de två sistnämnda, som blixta blott omkring $1\frac{1}{2}$ fot höga, behöfva ej risas.

Sprötarter, (*Pisum sativum hortense*)

" maj-, 2 à 3 fot hög, tidigaste . . .	—	35			
" , emperor, 2 à $2\frac{1}{2}$ fot, tidigaste . . .	—	30			
" Auvergne-, 4 fot, tidig, riktlörande. —	40				
" Prince Albert-, $2\frac{1}{2}$ fot, tidigaste . . .	—	35			
" biskops-, 1 fot hög, tidig		35			
" , med långa skidor, 1 fot hög . . .	—	40			
" Burbridge's eclipse-, 2 fot, tidig . . .	—	45			
" Caper-, grön, $2\frac{1}{2}$ fot.		30			
" capuziner-, grön, 2 à 3 fot.		50			
" , hvita, 3 à 4 fot		60			

	Pr <i>fl.</i>	Rmt Rd ö.	Pr <i>fl.</i>	Rmt Rd 0.
Spritärter, Charlton-, 4 fot, tidig	— 30		röda blommor göra dem äfven användbara säsong ptydnadsväxter.	
" cymitar-, 4 fot, tidig	— 40			
" Daniel O'Rourke-, 2 à 3 fot, tidigast . . .	— 40			
" Early wonder-, utmärkt sort	— 50			
" Fairbaird's surprise, 5 fot	— 50			
" stora snabel-, 4 à 5 fot.	— 60			
" gula vax	— 60			
" Laxton's prolific, medeltidig, mycket riktbärande, god sort	— 50			
" Dickson's favorit-, tidigaste, låg.	— 35			
" Harrison's glory, 2½ fot, tidig	— 40			
Märg-spritärter,				
Jenny Linds-, hvit	— 60			
" paradies-, 4 fot, tidig	— 50			
" Thurston's Reliance, 8 fot, riktb.	— 50			
" Victoria-, 5 fot, riktbärande	— 40			
" Watarloo-, 6 fot, riktbärande	— 40			
Skrynkliga märg-spritärter,				
Brittish Queen-, 6 fot hög.	— 80			
" champion of England-, 4 fot	— 60			
" Fairbaird's new early nonpareille.	— 65			
" Knight's dwarf green-, låg, utm.	— 60			
" " dwarf white-, låg, utmärkt	— 60			
" " tall green-, hög, utm.	— 75			
" " white-, hög, utm.	— 75			
" Lord Raglan's-. 2½ fot.	— 70			
" ne plus ultra, god sort	— 70			
Till driftning användas endast de längsta och tidigaste soterna. De skrynkliga märg- ärterna utmärka sig genom sin sötma.				
Stångbönor, (<i>Phaseolus vulgaris</i>)				
stora svärd-, eller Turkiska	— 85			
pr 100 <i>fl.</i> 80 rdr.				
" jätte-socker-svärd	— 70			
" " socker-svärd-, med vaxgula skidor . . .	— 90			
" hvita, vax-socker- perl	— 90			
" " vax-socker-perl, m. vaxgula skidor . . .	— 90			
" genomskinl., Romerska vax-perl, svarta . .	— 90			
" Turkiska ärt, små ärlrika, hvita	— 80			
" Algier-, svarta, tidiga, riktbärande . . .	— 1			
Krypbönor, (<i>Phac. vulgaris nanus</i>)				
perl-, hvita, tidiga	— 75			
" svärd-, breda, tidiga, till driftning . . .	— 50			
Holländska svärd-, allratidigaste	— 50			
" adler-, rödfäckiga	— 40			
" gula, tidiga	— 50			
" socker- eller smör-, hvita, tidiga . . .	— 75			
Ilsenburger-, brokiga, tidiga	— 50			
Kafferländer-, svarta	— 50			
bruna, (Callevanser, Prinsessbönor)	— 30			
pr 100 <i>fl.</i> 25 rdr.				
" tusen för en, hvita	— 75			
" tusen för en, gula	— 1 —			
" flageolet-,	— 50			
Rosen-, Blomsterbönor, (<i>Ph. multifl.</i>)				
svärd-, rödblomande	— 90			
Alla dessa bönsorter läggas i medio eller slutet af Maj. Fordre nägorlunda torr, ej nygödslad jord och varmt läge. Till drift- ning ärö Holländska, Ilsenburger- och ad- lerbönor tjenligast. Blomsterbönorna an- vändas och behandlas som vanliga Tur- kiska bönor, men dess vackra skarlakan-				

Pr fl. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

Matrhabarber. Prince Albert.	— — — — 6
” jätte-	— — — — 6
” blandad, (<i>R. undulatum, Rha-ponicum & Emodi</i>)	3,50 — 8
Fröet sås på ett solrikt ställe. När plantorna är något försigkoma, omplanteras de i fet och djup jord i tvenner rader på en 5 fot bred säng. Om hösten nedgrävdes brunnen gödsel mellan plantorna.	

Strand-; Sjökål, (<i>Crambe maritima</i>)	— — — — 6
---	-----------

Fördrar fet och djupt gräfd sandjord. Fröet läggas i tvenner rader på en 4 fot bred säng, 2 fot från hvarandra och 3 a 4 frö på hvarje ställe. Om hösten afskärs bladen och kring hvarje planta lägges grof sand, men det öfriga från sängen beträckes med brunnen gödsel, som om våren nedmyndas mellan plantorna. Under sommaren afbrytas alla blombärande skott. Tredje våren, innan plantorna börjat växa, stjälpes tommna krukor, träläder, gamla bikupor och dylikt över ständen, hvarefter de i mörkret framskjutande, gulgröna skotten afskärs och användas till mat. Skörden fortfar till Juni, då beväckningen borttagas.

Bladselleri, (<i>Apium graveolens variegatus</i>)	— — — — 6
” hvit och violett	— — — — 6
” Coles new crystal white	6
” Seymour's white champion	6
” Sheppard's red gigantic	6
” Red solid, red gigantic	6

Varieteter af rotsselleri (som förekommer under rubriken: Rotväxter.) Plantorna uppdragas i bänk och upplanteras sedan i 1 1/2 fot djupa färör, hvilka, altt eftersom bladstjälkarne skjuts i höjden, fyllas men den ur färorna tagna jorden. När färorna är fyllda börjar man kupa. 1 Sept. och Oktober kan man aftaga stjälkarne och förvara dem över vintern i sand. Växten fördrar mycket fet, nygödd jord.

Kronärtskockor, (<i>Cynara Scollinus</i>)	— — — — 12
” Fransyska, stora gröna	— — — — 35
” Bretagner-, stora	— — — — 20

Fördrar varmt, torrt läge och starkt gödslad jordmän. Fröet utsås i 2-tums krukor, ett frö i hvarje och krukorna ställas sedan i ljum driftbänk. Sedan plantorna så småninjam fått vänjas vid den yttre luften, upplanteras de på 2 a 3 fot s åfstånd från hvarandra. När blomknopparne framkomma bör man blott bibehålla 5 a 6 sådana på hvarje planta, de öfriga afslägsnas. Om vintern beträckas plantorna med näverhattar, träläder eller dylikt, hvarpå lägges torrt löf eller myrrack.

Spanjs Cardy; Cardoner, (<i>Cynara Cardunculus</i>)	— — — — 5
---	-----------

Plantorna uppdragas såsom den nära beslägtade kronärtskockans och

Pr fl. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

planteras sedan med 3 a 4 fot mellanrum i en fära, 1 fot djup och 2 fot bred, på en 4 fot bred säng. När bladen utvecklat sig sammanbindas de och omlindas med halm, hvarefter jorden nedföres i färan och kupas kring plantorna, så att blott bladpetarne synas. Tvåeller tre veckor derefter är de färdiga för köket.

Sparris-sallad, <i>Lactuca angustana</i>)	— — — — 5
--	-----------

För att få tidig skörd utsås fröet i ljum bänk, hvarefter plantorna utplanteras på sängar i kraftig jord. Eljest utsås fröet hvar 14:e dag på kalljord. Blomstjälkarna skördas innan blomornon utvecklat sig och anträts som sparris.

Angelika, (<i>Angelica Archangelica</i>)	— — — — 5
--	-----------

Denna växt, som förekommer vild i Lappland, är särdeles omtyckt af Lapparne. Man affägsnar det yttre skalat, femente bastfiberna; allt det öfriga åtes, antingen rått eller stuvadt tillsammans med Lappsk syra, (*Oxyura digyna*). De utvecklade blomknopparne läggas på köttssoppa, som derigenom får en egendomlig, behaglig smak. Växten är tvärfärg och fördrar en fet, lös och fuktig jordmän.

VI. Spinatväxter:

Spinat, (<i>Spinacia glabra & spinosa</i>)	— — — — 3
--	-----------

” bredbladig, stor med rundt frö — 40 — 3
Pr 100 fl. 35 Rdr.

” ” stor med spetsigt frö . . . — 40 — 3
” salladbladig (de Gaudry) . . . — 50 — 3

” Savoy- — 60 — 3
Fröet bör utsås hvar 14:e dag ända till Augusti. Ju fetare jorden är, desto större och tjockare bliiva bladen.

Winter-; Romersk Spinat, (<i>Rumex Patientia</i>)	1,50 — 4
---	----------

Fröet sås i kall bänk eller på kalljord. Plantorna sättas i 4 rader på en 4 fot bred säng. Planterad i läder och ställd i växthus, kan den skördas hela vintern.

Spanjs Syra, (<i>Rumex Acetosa</i>)	— — — — 4
---	-----------

” vanlig 1,75 — 4
” jette-, från Belleville 2,75 — 5

Varieteter af den hos oss vildt växande arten; behandlas som Patientia.

Nysealandsk Spinat, (<i>Tetragonia expansa</i>)	— — — — 4
---	-----------

Fröet blöts några dagar i vatten innan det utsås. Då plantorna uppkommit, gallras de så, att hvarje planta får 2 fot utrymme. Fördrar kraftig jord.

Molla; Mell, (<i>Atriplex hortensis</i>)	— — — — 3
--	-----------

” gul och röd — — — — 3
Behandlas som spinat. Man bör ej låta för många planter bära frö

Pr fl. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

emedan växten lätt kan bliiva ett ogräs och dessutom betydligt ut-suger jorden.

Qvinoa. (*Chenopodium Quinoa*) 1,50 — 4
Odlas som spenat; fröet kan använ-das som gryn.

Portlak. (*Portulaca oleracea & sativa*)

„ gul	3 — — 5
„ grön	2 — — 4

Utsås i bänk, upplanteras sedan i fet, lös jord med 6 a 8 tums mel-lanrum.

Isplanta. (*Mesembryanthemum ery-stallinum*), à port. 8 öre — — — 40

Bladen lemnas en särdeles fin spinat. Fröet sås i bänk eller kruka och planterna sättas på sängar i god, lös jord.

Mangold. (*Beta cicla*)

„ ny, särdeles fin, Schweizer . .	3,50 — 6
„ ny, krusbladig	3 — — 5

„ poirée à cardes blanches	— — — 6
„ Brasiliansk, i flera färger	1,75 — 4

Behandlas som rödbetor. Bladen an-vändas som spinat eller sallad. För winterbehofvet planteras röt-terna i lädor, hvilka ställas i väx-tus eller ljus källare, då man hela vintern kan skördta späda blad.

Phytolacca esculenta — 8

Bladen begagnas som spinat. Fröet sås i bänk och planterna sättas i rader. Växten blifver 5 a 6 fot hög. Rotknölarne kunna öfvervin-tras om de täckas med lös eller myrtack.

VII. Salladväxter:

Snittsallad; (*Lactuca sativa fo-liosa praecox*)

„ tidig, gul	1,50 — 4
„ gul, krusbladig	— — — 4

Sätter inga hufvuden. Begagnas fö-reträdesvis innan de andra salladsor-terna blifvit färdiga.

Bindsallad; Sommar-Endivie,
(*Lactuca sativa romana*)

Dessa präktiga salladsorter bildar ej hufvuden, hvarför man brukar sammanbinda ytterbladen, hvarige-nom de intre bladen blifva bleka och möra. Fordra starkt gödslad jord och böra sås flora gånger un-der sommaren, till i Augusti.

Hufvudsallad, (*Lactuca sativa capitata*)

Pr fl. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

Hufvudsallad Asiatisch, stor, gul . . 3,75 — 6

„ Berliner, stor, gul 3,75 — 6

„ Steinkopf, tidig, gul 4 — — 6

„ Schwedenkopf, rödaktig, extra 4 — — 6

„ Schweizer, god sort 4 — — 6

„ Haarlemer, brun 4 — — 6

„ Blodforelle 4 — — 6

„ Mogul, stor, rödkantad 4 — — 6

„ Jätte-Mogul, stor 4 — — 6

„ Broy-Geel-, utmärkt 4 — — 6

„ dubbelhufvud, (*Lact. discephala*) — — — 6

„ Whelers Thom-Thumb-, för-träfflig — — — — 15

„ non plus ultra-, ny, fin, gul 15

„ Perpignaner, äkta, à p. 15 ö. — — — 60

En af de aldra bästa sorter; har mycket fasta hufvuden, som håller sig ovaniigt länge.

„ All the year round, god och fin — — — 60
à port. 15 öre.

„ alla sorter blandade 3,75 — 6

Alla salladsorter fordra fet jord och mycket fuktighet, hvarförutan huf-vudena bliiva små och osmakliga. Planterna sättas på 10 a 12 tums afstånd från hvarandras. Fröet ut-sås hvar 14:e dag till slutet af Juli. Till drifning passa Broy-Geel, Steinkopf Mogul och Whelers Thom-Thumb.

Cichoria, (*Cichorium Intybus*)

„ äkta Braunschweiger 1 — — 3

„ ny, förhåttard, storbladig 1,50 — 4

Rötterna intagas om hösten och in-släss i sand uti källare eller plan-teras i trälador, som ställas bak-om hyllorna i ett växthus. Bla-den begagnas till sallad. Se åtven under rubrik: Rotväxter.

Endivie, (*Cichorium Endivia*)

„ grön krusbladig, vinter- 3

„ gul, krusbladig, vinter- 3

„ Casseler-, bredbladig 4

„ Escariol-, stor, gul, bredbl. 6

„ fin, krusig, mosslik 8

Utsås i Juni eller Juli. Då planterna hafva 4 a 6 blad planteras de på en säng med 1 fot mellanrum. När bladen utbildat sig, samman-bindas de och bliiva efter 14 da-gar färdiga att begagnas. Upphän-gas under vintern på snören i en stor källare. Användes i utlandet mycket, såväl till soppor, som till sallad.

Maskros; Lejontand, (*Leon-todon Taraxacum; Taraxacum officinalis*)

„ odlad. — — — — 10

„ ny, mycket storbladig, extra 65
à port. 15 öre.

Bladen af denna välkända förekommende växt, användes utrikes mycket till sallad. Utsås i rader på sängar. Om hösten pällegges ett så tjockt löflager, att frost ute-stänges. Om våren borttages denna betäckning och hela sängen infat-tas med bräder, eller och påsätta-

Pr. fl. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

vanliga driftänklådor, hvaröver man lägger gamla brädstumpar och deroftvapn på lif eller strö. De under denna öfverbyggnad i mörkret talrikt framkommande bladen blifva mörka och välsmakande och kunna skördas upprepade gånger.

Krusig Krasse, (*Lepidium sativum*)

" ordinär	60	3
" dubbel eller krusig	1 — —	3
" fin, krusig, mosslik	1,50 — 4	

För tidig skörd säs fröet tjoct i lädor, som ställas i växthus, böningsrum eller stall. Till senare bruk säs fröet på kalljord. Trifves här som helst.

Skedört, (*Ochlearia officinalis*)

Säs i rader och bör ej omplanteras. Bladen kunna skördas heila året om.

Kapuciner; Indiansk Krasse, (*Tropaeolum majus*)

2,50 — 5

Frifves i all slags god jord. Bör stödjas med ris, eller planteras vid espaler. Se under rubriki Kryddväxter.

Åker-; Vintersallad, (*Valeriana officinella* (*Pedia*) *Olitoria*)

" storbladig 1 — — 3

" stor, bred Holländsk 2 — — 4

Utsås i Juli och Augusti; skördas under hösten, vintern och våren.

VIII. Kryddväxter:**Anis, (*Pimpinella anisum*)**

80 — 3
Ettårig, säs tidigt om våren i mager jord.

Basilica, (*Ocimum Basilicum*)

2,50 — 5
" stor

" fin, violett 7

" stor sked- eller skepps 10

Ettåriga växter. Säs i bänkar och planteras i Maj på kalljord.

Boretsch; Gurkört, (*Borago officinalis*)

4
Ettårig; säs på kalljord. Bladen användbara till sallad; de vackra, blå blommorna begagnas till prydnad på stekfat, karrotter, m. m.

Citromelliss, (*Melissa officinalis*)

8

Beträckes om vintern; fordrar skugga och god jord.

Coriander, (*Coriandrum sativum*)

75 — 3

Säs på våren i sandig, ej fet jordmåna.

Dill, (*Anethum graveolens*)

75 — 3

Ettårig; fortplantar sig ofta sjelf.

Dragon, (*Artemisia Dracunculus*)

— port. 20 öre.

Bladen användas vid inläggning af gurkor, m. m. År ej kinkig med jordmåna. Planteras i rader med 12 a 15 tums mellanrum; omplanteras och delas hvarannat år. Beträckes om hösten med gammal gödsel från bänkarne.

Pr. fl. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

Fenkol, (*Foeniculum officinalis*)

" söt Bologneser 1,40 — 3

Fördrar fet jord och skyddad läge.

Fröet säs på kalljord och plantorna sätts sedan i rader, i 3 tum djupa fär, 1 fot ifrån hvarandra. Täckas om hösten med granris och när stänglarna följande år skjutit i vädret, kupas de så högt som möjligt.

Isop, (*Hysopus officinalis*)

2 — — 4
Egnar sig förträffligt till infattnigar.

Indiansk Krasse, (*Tropaeolum majus*)

2,50 — 5

Se Salladvixter. Utrikes begagnas ej blott den s. k. Krassekoppen, utan äfven de gröna bladen, blombladen och blomknopparne, hvilka blandas med vanlig sallad.

Krusmynta, (*Mentha crispa*)

— port. öre.

Fördrar kraftig, nägot fuktig jord. Skyddas mot barfrost.

Kummelin, (*Carum carvi*)

90 — 3

Utsås på fritt land; omplanteras ej.

Kyndel, (*Satureja hortensis*)

4

" sommar-

" vinter-

Behandlas som kummelin.

Kärleksäpple; Tomates, (*Lycopersicum esculentum*)

Solanum Lycopersicum. 6

" vanliga 15

" extra tidiga, röda 15

" stora, gula 15

" nya, monströsa, roseröda 80

— port. 15 öre.

Den sistnämnda sorta, hvars frukter hafva en fin vinsmak och uppnå en anseelig storlek, bilda 12 a 20 fot långa rankor, prydda af talrika frukter. Alla sorterna säs i driftbänk och utplanteras när frosten upphört på skyddade, varma platser t. ex. mot söder belägna plank eller murar. Jorden bör vara fet och nygödslad. Kvistarne uppbindas vid espaler och toppas när man tycker att ett tillräckligt antal frukter bildat sig. Utmärkta Köksväxter.

Körvel, Svensk, (*Anthriscus Cerefolium*)

1,25 — 3

Ettårig; trives hvarsomhelst. Fröet utsås flera gånger under sommaren.

Körvel, Spansk, (*Scandix Myrrhis odorata*)

6 — — 8

Flerårig; säs i rader på skuggigt ställe.

Lavendel, (*Lavandula Spica*)

2,50 — 5

En i köksträdgårdar, synnerligen i södra Sverige, mycket bekant infattningsväxt. Omplanteras hvarart tredje år och sättes dervid så djupt, att endast 2 a 3 tum af grenarna synas ovan jord.

Malört, (*Artemisia absinthium*)

7

Fördrar sandjord; kan äfven fortplantas genom delning.

	Pr. d. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.
Malva, krusbladig, (<i>Malva crispa</i>)	— — — — 5	
Ettårig. De vackra bladen användas till prydnad på stekfat, m. m.		
Mejram. (<i>Origanum vulgare</i>)	4 — — 6	
Fortplantas även genom rötDELNING.		
Pepparmynta, (<i>Mentha piperita</i>)	— — — — 6	
Behandling, se krusmyta.		
Persilja, blad-, (<i>Petroselinum sativum</i>)	— — — — 6	
„ vanlig, slätbladig	70 — — 3	
„ „ krusbladig	75 — — 3	
„ plumage-, extra fin	1 — — 3	
„ Mitchell's Matchless	1,20 — — 3	
„ Myatt's new garnishing	1,20 — — 3	
Behandling och användande allmänt bekant.		
Pimpinella, (<i>Poterium Sanguisorba</i>)	1,25 — — 3	
Planteras i rader och är ej kinkig med jordmän; de unga bladen be-gagnas bland sallad.		
Rosmarin, (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	— — — — 15	
Odlas i krukor.		
Salvia, (<i>Salvia officinalis</i>)	— — — — 6	
Bladen används såväl till medicin som till matkryddning. Fröet säs på kalljord; fördras på våra orter skydd mot sträng barfrost.		
Spanisk Peppar, (<i>Capsicum annum</i>) blandade sorter.	— — — — 10	
Uppdrages i krukor under glas. Om hösten mogna frukterna, hvars användande i hushållet är tillräck-ligt kändt.		
Senap, (<i>Sinapis</i>)	— — — — 4	
„ gul Engelsk (<i>Sin. alba</i>)	50 — — 3	
„ brun Engelsk (<i>Sin. nigra</i>)	90 — — 3	
Thymjan, (<i>Thymus vulgaris</i>)	— — — — 6	
„ sommar-	8 — — 10	
„ vinter-	4 — — 6	
Passar förträffligt till ganering af köksväxtqvarter.		
Vinruta, (<i>Ruta graveolens</i>)	— — — — 4	
Fröet säs i bänk och sedan planteras plantorna i rader med 1 fots mellanrum. Bladen anses vara magstärkande och åtäts sönderhac-kade på snörgås, eller läggas de som krydda på säsar. De blifva mera aromatiska om de odlas på mager och torr jord.		

X. Lökväxter:

(*Allium*.)

	Pr. d. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.
„ Holländsk, stor, mörkröd . . .	2,75 — 5	
„ „ stor ljusröd	3 — — 5	
„ „ svafvelgul	3,75 — 6	
„ „ fin, hvit, sylt-	3,25 — 5	
„ Braunschweiger, stor, mörkröd . . .	3 — — 5	
„ Madera- eller jätte-, stor . . .	5 — — 7	
„ lång, gul, päronformig, utmärkt	2,75 — 5	

	Pr. d. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.
Fördra god, tjolåret gödslad jord och öppet, varmt, lagom fuktigt läge. Fröet utsås tidigt och efter sädjen tillklappas sängen väl. Den so ter man önskar små, t. ex. den hvita syltlöken, sås tätt, hvaremot de storväxta sorterna sås glesare. Maderalöken sås helst i bänk och upplanteras sedan, hvarvid rötterna, men ej bladen, något förkortas.		
Vinterlök, (<i>Allium fistulosum</i>)	— — — — 7	
„ vanlig, hög	— — — — 10	
„ tidig, låg	— — — — 10	
„ fin, hvit	— — — — 10	
Fröet utsås om våren på fritt land och de små lökarne qvarstår ute över vintern. Våren derpå kunna de planteras i rader eller som infattningsväxter. Bladen nyttjas tidigt om våren som surrogat för annan lök. Borde användas mera än som sker.		
Schallott-; Eschallottlök, (<i>Allium Ascalonicum</i>)	— — — — 75	
„ vanlig Svensk	— — — — 75	
„ stor Dansk, pr 100 st. 1,75	— — — — 75	
„ „ Rysk, pr 100 st 1,75	— — — — 75	
Denna lökar, som för sin mildare smak af många föredrages framför alla andra löksorter, fortplantas genom smålökar, hvilke om våren utplanteras i god, fet, men ej nygjord jord. Upptagas om hösten och förvaras som vanlig rödlök.		
Hvitlök, (<i>Allium sativum</i>)	— — — — 1	
Trifves hyar som helst, men blifver bäst i en varm, sandblandad jordmän. Bildar sällan frö, men fortplantas lätt genom smålökar. Omlanteras hvartannat år.		
Rokamboll, (<i>Allium Scorodoprasum</i>)	— — — — 1	
pr 100 st. 1 rdr.	— — — — 1	
Behandlas och används som Schallottlök.		
Gräslök, (<i>Allium Schoenoprasum</i>)	— — — — 1	
pr torfva 25 öre.		
Potatislök, (<i>Allium Ascalonicum variegatum</i>)	— — — — 75	
Behandlas och används som Schallottlök.		
Purjolök, (<i>Allium porrum</i>)	— — — — 1	
„ vanlig vinter-	3,75 — 5	
„ „ sommar-	3 — — 5	
„ Brabanter-, vinter-	3 — — 5	
„ jätte- eller momströrs vinter- . . .	4 — — 6	
„ gul sommar- från Poitou	— — — — 20	
Säs om våren i halvvarm bänk och upplanteras sedan, (något djupare än de uppkomma plantorna statt i bänken) i rader, 8 a 10 tum ifrån hvarandra, hvarvid både rötter och blad något förkortas. Fordrar ny-gödslad jord.		

X. Gurkartade växter:

	Pr. d. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.
Gurkor, (<i>Cucumis sativus</i>)	— — — — 1	
A. För fritt land,		
„ Holl., gröna druf (s. k. We steråsgurkor).	3,25 — 5	

	Pr <i>el.</i> Ort.
	Rmt Rd. ö. Rd. ö.
Gurkor, allmänna, långa, gröna.	
" långa, gröna slang-, à p. 10 ö. 8 — — 10	
" gröna slang-, extra, à p. 10 ö. 10 — — 12	
" hvita slang-, à p. 10 ö.. 10 — — 12	
" Chin, gröna slang-, à p. 10 ö. — — 18	
" bleka slang-, à p. 10 ö. — — 18	
" Ryska, små gröna 3,50 — 6	
" Grekiska-, Athener-, utm. 25	
B. För driftning:	<i>Pr Ort. Port.</i>
" non plus ultra, gröna 75 — 15	
" hvita 1 — — 15	
Dessa gurkor blifva över i aln långa.	
" snöhvita Jätte- extra 15	
" hvita, Alabaster, Egyptiska 15	
" Rhum von Quedlinburg 25	
Snöhyvit, 24 30 tum lång.	
" Rhum von Erfurt 25	
Frukterna 2 fot långa, snöhvita.	
" Silley's, hvita 15	
" Arnstädter, ljusgröna, jätte- 15	
" släta, gröna 15	
" Brasilianska, hvitgröna, långa, tidiga, utmärkta 15	
" aldra tidigaste, riktbärande 15	
" Cuthill's blaespine 15	
" Emperor of Manchester 15	
" Gladiator 15	
" Glory of London, utmärkta 15	
" Man of Kent 15	
" Patrik 15	
" Race Horce 15	
En ständigt bärande sort; kan med fördel kultiveras i kruga.	
" Snow's Horticultural 15	
" Walker's Travello 15	
" Victory of Bath 15	
" semperfifructifera ständ. bärande — — 15	
Alla gurksorter fordra sol, värme och en kraftig, men framförallt lucker jordmän. Obrunnen gödsel bör ej nyttjas emedan frukterna deraf få en bitter smak.	
Ormgurkor, (<i>Trichosanthes</i>)	
" anguinea 10	
" colubrina vera 10	
Böra odlas i drifbänk; ha ofantligt långa, märkvärdiga frukter, vilika kunna användas som gurkor.	
Meloner, (<i>Cucumis Melo</i>)	
" socker- 75 — 10	
" från Texas 10	
" Nutmeg-, riktbärande, välsm. 10	
" Japanska, hvita 10	
" tidiga, Amerikanska 75 — 10	
" ananas 1 — — 10	
" Arbuse-, från Sarepta 10	
" Beechwood- 10	
" Chito- från Havanna 10	
" Erfurter Preis 10	
" muscatell- 10	
" nätt- 10	
" de Cavaillon- 10	
" Sucrin de Tours- 10	

	Pr	Ort.	Port.
	Rmt	Rd ö.	Rd ö.
Meloner, nät, tidiga, runda, riktb.	—	—	10
" Pariser-Glocken-	—	—	10
" Persian green flesh	—	—	10
" Queen Victoria	—	—	10
" Fransyska frilands-	—	—	10
" blandade sorter	—	60	10
12 sorter Meloner 1 rdr.			
6 " 50 öre.			
Cantalouper, (Cucum. Melo var.)			
" Portugisiska	—	—	10
" gula Orange-	—	—	10
" Malta d'hiver	—	—	10
" Pariser-torg	—	—	10
" Holländska	—	—	10
" Prescot de Paris	—	—	10
" Ungerska socker-, från Nissa	—	—	10
" blandade sorter	—	50	10
6 sorter Cantalouper, 50 öre.			
Vattenmeloner, (C. citrullifol.)			
" Amerikanska smultron-	—	—	10
" " is-gelée-	—	—	10
" " early mountain sprout-	—	—	10
" " äpple pie-	—	—	10
" Italienska sommar-	—	—	10
" strimliga m. rödt kött	—	—	10
" " med hytt kött	—	—	10
" jätte-, nya, m. stora frukter	—	—	10
" blandade sorter	—	—	10
6 sorter Vattenmeloner, 50 öre.			
Skilnaden mellan meloner och cantalouper är den, att melonernas hafva en nätklik teknung på skalat, vanligtvis afångande form samt, såsom mogna, ljusgul färg och en ganska stark melonlukt, hvaremot cantalouperna hafva ett tjockt, med värter besatt skal, mycket varierande form, än oval, än rund, läng, plattrund o. s. v. samt ananaslik lukt. Cantaloupen blifver 2 à 3 dagar efter mognaden mjölig; melonen vid samma tid vattenaktig. Vattenmelonerna blifva ofta nycket stora, och frukter af dem, vägande över 40 äro ej sällsynta.			
Pumpor; Gräskar; Kurbiss,			
<i>(Cucurbita Pepo.)</i>			
A. Åtbara; Matpumpor:			
" Växtmärg- (Vegetable marrow.)			
<i>(Cucurbita ovifera.)</i>			
" Custard squash	—	—	10
" Courge goufrée	—	50	15
" angurie	—	50	15
" Valparaiso-, gröna, strimliga	—	30	10
" " mörkröda, hvitstrimliga	—	30	10
" " strimliga	—	30	10
" " gula, strimliga	—	30	10
" " rosenfärgada, strimliga	—	30	10
" stora, gula jätte-melon-	—	30	10
" melon-, sililvergrå.	—	—	10
" " gröna	—	—	10
" " skarlakanröda	—	—	10
" " hvita	—	—	10
" Ryska, stora, gröna	—	—	10
" mandel-, gula	—	—	10

	Pr Ort.	Port.
Pumpor, blandade sorter	Rmt Rd. ö.	Rd. ö.
	15	5
B. Prydnadspumpor; Gräskar,		
Figurkurbits:		
" Angurie-, m. brokiga blad (<i>Cucurbita melanocarpa</i>)	10	
Utmärkt att plantera vid lusthus, espaliar, etc. etc.		
" centner	25	10
" flask	10	
" Herkulesklubba	10	
" kejsarmössa, röd	30	10
" " hvit	30	10
" med ådror	30	10
" turban-, stora, röda	30	10
" " stora, gröna med rödt	30	10
" apelsin-	30	10
" citron	30	10
" flera andra sorter	30	10
" blandade sorter, pr <i>fl.</i> 4 rdr	8	5
12 sorter ätbara pumpor, rdr 1		
6 " " " 60		
20 " Figurkurbits" " 1,75		
12 vackra sorter " 1		
6 " " " 50		

Alla sorter pumpor förråda varma och skyddade platser samt fet, lös och lucker jordmän. Bäst ärjatt utsätt fröet i krukor och sedan plantera plantorna med klimp på för dem bestämda ställen.

B. Gräs-, Foder- & Ekonomiväxter:

Till Hrr Landbruksares synnerliga uppmärksamhet.

Priserna å alla Ekonomie-frö äro ej fullt bestämda, men noteras efter dagens pris här på platsen. De säljas blott pr kontant, utan rabatt.

Från och med 25 *fl.* säljes efter 100 *fl.*-priset.

I. Gräsväxter:

(Gramineæ.)

	Pr 100 <i>fl.</i>	Pr <i>fl.</i>
	Rmt Rd. ö.	Rd. ö.
<i>Agrostis alba</i> , (<i>Hvitven</i>)	40	45
" <i>capillaris</i> , (<i>Hårhven</i>)	50	55
" <i>stolonifera</i> , <i>Krypheen</i> ; <i>Fiorin-gräs</i>	50	55
Hvensorterna växa nästan hvar som helst, men blixta yvigast i sandblandad lerjord. På torr sandmark blixta de smävixta och tuviga. Särdeles omtyckta fodergräs och af erkändt värde för gräsplaner i trädgårdar.		
<i>Aira canescens</i> , (<i>Gråtåtel</i>)	70	
" <i>cæspitosa</i> , (<i>Tuftåtel</i>)	35	40
" <i>flexuosa</i> , (<i>Kruståtel</i>)	20	25
Tuftåteln är att rekommendera endast för fuktig mark, hvaremot		

XI. Ätliga Svampar:

Champignon, (*Agaricus campestris*)

bästa qualité thallus, pr *fl.* 1,75 — Champignoneerna kunnas drifvas antingen i dertill särskildt inrättade hus, eller i läder under hyllorna i växthus, der man kan hafta + 15 a 18° eller och i häststall, där vanligen den nämnda temperaturgraden är rådande. Lådorna fyllas med varmt hästströ, hvilket väl nedpackas så att det ligger omkring 9 tum tjockt, hvarefter lådorna täckas med lock. Efter några dagar undersöks temperaturgraden i ströet och om densamma är + 20 a 25° så täckes ströet med thallus. Vill man använda groddstenar (tegelstenstformade klippar) av hästgödsel, keller färgödsel samt löffjord och genombväda af thallus) så sänderbytas dessa i 2 a 3 tum stora bitar, hvilka läggas på ströet, nedtryckas något derutti och täckas åter. Efter omkring en veckas tid börjar thallus förgrena sig, då det hela täckes med 2 a 3 tum lös och lätt jord, som helt sakta nedpackas hvarefter locken ej mera påläggas. Efter 4 a 5 veckor framkomma champignoner fortfarande under omkring 3 månader. När de skördas, utstickas de temligt djupt. Om jorden torkar så översprutas den något. Temperaturen hålls beständigt mellan + 15 a 18°. Då sådana läder stå under hyllorna i ett växthus, bör man skydda dem mot dropp.

	Pr 100 <i>fl.</i>	Pr <i>fl.</i>
	Rmt Rd. ö.	Rd. ö.
krus- och grätateln passa för torra lägen, den sistnämnda till och med för torr sandjord, hvarest den lemnar ett godt färbete.		
<i>Alopecurus pratensis</i> , (<i>Ängkafle</i>)	85	90

Värdernas såsom fodergräs af många lika mycket, om ej mera, än thi-mothej. Blifver kraftigast i god, multrik och något fuktig jord. Kan äfven ingå i blandningen till grövre gräsplaner i stora trädgårdar eller parker.

Anthoxanthum odoratum,

(*Vårbrädd*)

Ett tidigt och godt gräs för torra lägen; användes dock blott i förening med andra sorter. Ingår i blandningen för finare gräsplaner.

	Pr 100 fl.	Pr fl.		Pr 100 fl.	Pr fl.
	Rmt Rd. ö.	Rd. ö.		Rmt Rd. ö.	Rd. ö.
Arundo arenaria, (Sandvör).	1 —				
Använt till att binda flygsand.					
Avena elatior, (Knölhafre).	50 — — 55				
" <i>flavescens, (Gulhafre)</i>	20 — — 25				
" <i>pubescens, (Luddhafre)</i>	— — — 90				
Knölhafren är ett af de bästa fodergräs, synnerligen på märgelhäftig, lerbländad, ej alltför fuktig sandjord. Gulhafren lämpar sig för hvarje jordmån, som ej är alltför torr; kan ingå i blandningar till större gräspaner. Luddhafren trifves i torr jordmån och är ett ganska godt fodergräs.					
Briza media, (Darrgräs).	3 —				
På torra ängar är detta gräs ofta öfvervägande, men trifves även på lagon fuktig mark.					
Bromus mollis, (Mjuklost)	25 — — 30				
" <i>pratensis, (Ånglost)</i>	55 — — 60				
Mjuklostan trifves både i torr och drygt fuktig jord och är ett mycket beaktansvärdt fodergräs. Ånglostan växer helst på något fuktig lerbotten.					
Ceratochloa australis, (Bromus Schradieri).	80				
På nägorunda god jord är denna utländska grässort ett af de aldra-bästa till foder.					
Cynosurus cristatus, (Kamexing)	1,25				
Bildar om det ofta afnejas täta och vackra torvor, hvarför det bör ingå i hvarje blanding till trädgårdsplaner. Trifves även på torr mark.					
Dactyloctenium glomerata, (Hundexing)	75 — — 80				
Ät af de bästa, mest givfrande fodergräs och så mycket mera att rekommendera, som det trifves på alla sorter jord, med undantag af mycket torr och lätt. Bör afnejas innan eller kort före det börjar plocka blomma.					
Elymus arenarius, (Strandhafre)	1,50				
En af de bästa växter för bindande af flygsand. Ates af kreaturen endast i ungt tillstånd.					
Festuca arundinacea, (F. elatior)					
" <i>Säfsvingel</i>	1,30				
" <i>duriuscula, (Hårdsvingel)</i>	40 — — 45				
" <i>elatior (pratensis) (Ångsv.)</i>	70 — — 75				
" <i>fluitans (Glyceria) (Mannagräs)</i>	70 — — 75				
" <i>ovina, (Färsvingel)</i>	60 — — 65				
" <i>rubra, (Rödsvingel)</i>	30 — — 35				
Svingelarterna räknas till de nyttigaste grässlagen. Hård-, fär- och rödsvingeln lemnar på torr och mager jord, der knappat något annat gräs skulle kunna växa, ett uppriktigt färbe. Ångsvingeln är ett af de bästa gräs för ängar och dessutom af stort värde för större gräspaner i parker och trädgårdar. Säfsvingeln trifves på steril och grusig mark, men lemnar på bättre jord ett godt foder. Mannagräs-fröet begagnas som sagogryn; trifves på väta, öfversvämmade stäl-len.					
Holcus lanatus, (Luddtåtel)	30 — — 35				
Trifves i mager sandjord, men lemnar rikare afkastning i nägorunda god och fuktig jord. Ett af de bättre fodergräserna.					
Lolium perenne, (Eng. Raygräs)	30 — — 35				
" <i>perenne tenue, (Pacey's Raygr.)</i>	40 — — 45				
" " <i>italicum, (Italienskt Raygr.)</i>	55 — — 60				
I fröblandningen till gräspaner i trädgårdar utgör som bekant raygräs oftast huvudbestämdelen. Ingen annan grässart är så bladrik eller växer så hastigt som raygräset, hvarför det i utlandet odlas i betydlig mängd och afnejas s. t. o. m. 5 gånger årligen. Ar ej synnerligen noga på jordmånen, blott den ej är för våt.					
Melica (Molinia) coerulea, (Perlgr.)	25 — — 30				
Fodergräs för mossbotten och fuktig sand; blandas med andra grässlag.					
Milium effusum, (Amur-; Luktgr.)	— — 1,30				
Ett 3 a 4 fot högt, bredbladt, väl-luktande gräs, som kan odlas överallt, der tätta trädskronor beskugga marken och hindra andra grässarter att växa.					
Phalaris (Baldergera) arundinacea	— — 1,50				
(Rörflex.)					
" <i>canariensis, (Kanariefrö)</i>	30 — — 35				
Rörflex är ett flera fot högt, styft och bredbladt gräs, som trifves på sumpig och kärkraktig mäkr; bör före blomningen afnejas och uppfodras. Kanariefröet nyttjas till föda åt småfuglar.					
Phleum pratense, Thimothejgr.)	— — —				
Thimothejgräset, hvars användbarhet som fodergräs är allmänt känd, brukas även, i förening med andra sortir, till gräspaner i större trädgårdar, men bör då ej tillsätta blandningen utan säs särskilt.					
Poa annua, (Hvitgröe)	— — — 1,70				
" <i>aquatica, (Glyceria spectabilis)</i> — — 1,25					
" <i>némoralis, (Lundgröe)</i>	— — — 90				
" <i>pratensis, (Slötter-; Ånggröe)</i>	— — — 90				
" <i>serotina, (P. fertilis) (Höstgröe)</i>	— — 1,10				
" <i>trivialis, (Betesgröe)</i>	— — — 90				
Alla gräearterna räknas till de bättre gräsen; ångs- eller slöttergröe t. o. m. till de bästa. De är lika brukbara till fodergräs som till gräspaner och ingå i myckenhet uti blandningarna. Lundgröe är mycket användbar på trädbeväxta skuggiga platser. Jätte- eller vattengröe växer i sött vatten och måste afnejas före blomningen. Hvitgröe lemnar ett utmärkt färbe.					
Blandning af de nyttigaste och bästa fodergräs, för besåning af ängar, med såväl torr, som våt jordmån, 1:ma qualité	45 — — 50				
" äfven för ofvannämnde ändamål af 2:da qualité	40 — — 45				
" af finare grässarter, för besåning af gräspaner i trädgårdar och parker, passande för hvarje, ej alltför dålig jord	55 — — 60				
" af finaste grässorter, för besåning af småre planer, med fin, god jordmån	— — — 75				

II. Klöfverväxter:

	Pr 100 fl.	Pr fl.	Rmt Rd. ö.	Rd. ö.
Klöver, Holl., röd 1:ma, (<i>Trifolium pratense</i>)				
" Schlesisk, röd, 1:ma				
" hvit, 1:ma. (<i>Trif. repens</i>)				
" Alsike-, Svensk, (<i>Tr. hybrid.</i>)				
Alskeklövern föredrages mångestadies i utlandet för dess högre fodervärde och dess förmåga att äfven på ganska dålig jord, der man af den vanliga klövern ej har mycket att vänta, gifva god skörd. Triflens väl tillsammans med timothej.				
Inkarnatklöver, (<i>Tr. incarnatum</i>) 65 — — 70				
En ettårig art, hvaraf utsäts ungefär 24 a 26 fl. på tunnlandet. Utrikes begagnas den mycket tillsammans med Italienskt rygris och lemnar då både tidiga och rika grässkördar. Den användes äfven till igensättning af under vintern uppkomna luckor å de andra klöfverfälten.				
Skogsklöver, (<i>Tr. medium</i>).	1,50			
Af symmetriskt värde för skogstrakter; är ej noga med jordmän och lemnar rik afkastning.				
Räfklor, (<i>Anthyllis vulneraria</i>)	1,25			
Bland de växter som på senare tider blivit använda till foder, intager Anthyllis ett utmärkt rum. Den håller tillgodo med den magraste jord och motstår den starkaste torka. På torr och mager mark utsägs den jemte färsvingel och gifver ett godt, rikligt färbe.				
Blå-Luzern, (<i>Medicago sativa</i>)	1,35			
Sand-Luzern, (<i>Medicago media</i>)	2,50			
Humleklöver, (<i>Medic. lupulina</i>) 30 — — 35				
Blåluzern har långa, starka, krypande rötter och anses för en god foderväxt. På sandjö gifver sandluzern årligen en, stundom två rätt goda skördar och på något bättre jord överträffar den blåluzern. Humleluzern emotstår torka, lemnar god färbe och användes i trädgårdar att besä torra sluttningar o. s. v.				
Bokharaklöver, (<i>Melilotus albus altissimus</i>)	2,50			
Honungsklöver, (<i>Melil. officinalis</i>; <i>Melil. macrorrhiza</i>)	2 —			
" bla; (<i>Mel. coeruleus</i>)	3 —			
Bokharaklöver kan på nägorunda god jord skördas grön 3, 4 a 5 gånger under sommaren och hösten. Den bör ej få växa mera än 1 fot högt, emedan den ejest blifver grof och tråaktig. Honungsklövern är något mindre, men väl förtjent att uppmarkas; dess blommor äro mycket eftersöcta af bien. Den bla användes vid beredningen af den s. k. apitsosten.				
Esparsette, (<i>Onobrychis; Hedysarum sativum</i>)	45 — — 50			
Växer egentligen på kalkmark och är på sådan, af t. o. m. tarligt be-skaffenhets, en god foderväxt.				

Pr 100 fl. Pr fl.
Rmt Rd. ö. Rd. ö.

Gigelsärter; Käringtänder, (<i>Lotus corniculatus</i>)	— — — — 2
I förening med andra klöfverväxter lemnar denna art ett godt foder för mjölkkor.	
Grekiskt Hö, (Trigonella foenum-graecum)	30
Bör ej sås tjockt.	

III. Diverse foderväxter:

Foderoftor; Turnips,

White globe (Hvita, runda)	65 — — 70
Pomeranian white globe (Pommerska, hvita, runda)	65 — — 70
White Norfolk, hvita	65 — — 70
Autumn stubble. (Höst-stubb-)	70 — — 75
Red globe. (Röda, runda)	65 — — 70
Wolton's hybrid, röda, runda	65 — — 70
Skirwing's förbättr., rödtopp.	85 — — 90
Purple top yellow Bullock. (Gula, rödtoppiga)	80 — — 85
Border imperial, gula, rödtopp.	85 — — 90
Green top yellow Bull. (Gula grönstopiga)	70 — — 75
Aberdeen green top. (Gula, grönstopiga)	70 — — 75
Dales hybrid, grönsgula.	75 — — 80
Red top white tankard. (Långa, hvita, rödtoppiga)	80 — — 85
Gren top yell. tankard. (Långa, gula, grönstopiga)	80 — — 85
Tweeddale's förbättrade, rödtoppiga, gula	85 — — 90
Hoods imperial, gula, grönstopp.	— — — 95
Bottfelder, långa, gula	120 — 1,25
Höst, långa, hvita	120 — 1,25
Aker, långa, rödtoppiga	120 — 1,25
Fröet till ofvan nämnda rösorter införskrifter från Skottland, hvarest odlingen af foderoftor bedrivs i stor skala. Dess värde som foderväxter är så allmänt bekant, att det är onödigt att här yttra något vidare derom. Se även ann. under Rotväxter bland köksväxterna.	
Kålrotter, Rotabagga eller Svensk Turnips.	
Purple top yellow swedish. (Gula, rödtoppiga)	80 — — 85
Skirwing's förb., rödtoppiga.	80 — — 85
Laing's förb., röda, grönstopp.	90 — — 95
Green top yellow. (Gula, grönstoppiga)	95 — 1 —
Nya, rödgråttopp, släta, jätte-	120 — 1,25
Dessa sortar säs 3 a 4 veckor tidigare än rosvorna. Plantor, uppdragna ställe å kallbjörk eller på passande ställe å kalljord, begagnas till efterplantering å de ställen i turnipsfälten, hvarefti luckor uppståt genom loppmaskens härrinjar eller af andra orsaker. Vid utfodringen är det bäst att börja med de hvita turnipssorterna, hvarefter tages de röd- och grönstoppiga	

Pr 100 fl. Pr fl.
Rmt Rd. ö. Rd. ö.

samt till sist rotabagga. Deraföre är det angeläget att odla flera sortar, så att man ej nödgas att för hastigt uppfodra förrådet.

Fodermorötter,

" Altringham, stora, Engelska	105	—	1,10
" Belgiska, hvita, gröntopp,			
jätte-,	75	—	80
" orangegula gröntoppiga, jätte-	120	—	1,25
" mörkröda Braunschweiger .	120	—	1,25

Dessa morötters värde såsom foderväxter är allmänt erkändt. Synnerligen är de hvita jättemorötterna utmärkta för dess rika afkastning. Alla morotsorter fordras en djupt arbetad jord och måste, i motsats mot turnipsen, utsås så tidigt, som möjligt.

Foderpalsternackor,

" långa, stora, tjocka	—	—	90
" runda, stora	—	—	1,25

Säväl rötterna som bladen af palsternackorna lemnas, som man vet, ett ypperligt foder för mjölkkor. Utås omkring 16 fl. på tunnlandet och behandlas för örträg som morötter.

Foderbetor; Runkelrosvor,

" långa, röda	50	—	55
" " gula	50	—	55
" runda, röda	60	—	65
" " gula	60	—	65
" Dippe's röda Riesen-Pfal- . . .	55	—	60
" " gula Riesen-Pfal- . . .	55	—	60

Begagnas isynnerhet gerna till foder åt mjölkkor, emedan mjölken ej deraf får den sträfva smak, som så lätt uppkommer då turnips för mycket användas. De sistnämnda båda sorterna lemnas den rikaste afkastningen.

Sockerbetor,

" äkta, hvita vanliga	45	—	50
" hvita, imperial-	55	—	60
" Vilmorin's, nya förbättrade .	85	—	90

Böra ej säs för sent; ej heller i nygdslad jord, emedan sockerhalten i så fall betydligt minskas. De blifva bäst i god, sandblandad lermylla. För närvärande anses Vil-morins varia de bästa.

Foderkål,

" Jätte-	—	—	4,75
" äkta träd- eller ko-, (Jerseykale) . . .	—	—	2,25
" Tuseinhöddad, Grekisk centner- . . .	—	—	2 —

Alla sorterna förträffliga till kreatursfoder.

Seradella, (*Ornithopus sativus*)

35	—	40
----	---	----

Anses som foderväxt lika god som rödklöver.

Gifver stor afkastning, även på lättd jord.

På mycket torrt sandmark och tung lerjord trifves den mindre väld. Utås omkring 30 a 35 fl. på tunnlandet.

Spergel, (*Spergula*)

" vanlig (<i>Sp. arvensis sativa</i>) . . .	25	—	30
" stor (<i>Sp. arvensis maxima</i>) . . .	35	—	40

Kända och omyckta foderväxter,

isynnerhet på sandmark till förföete.

Den kan utsås, 10 a 12 fl.

på tunnland, tillsammans med hafre

eller andra gräsfoderväxter.

Pr 100 fl. Pr fl.
Rmt Rd. ö. Rd. ö.

Majs, (<i>Zea</i>)			
" stor hästtand-	—	—	50
" Amerikansk	—	—	50
" gul	—	—	40
" röd	—	—	60

Alla sorterna till grönfoder.

Sockerhirs, (*Sorghum saccharatum*)

Italiensk	—	—	75
italicun)	45	—	50

Sockerhirs, liksom majs, fordrar nägorlunda fuktig jordmän och mot storm skyddade lägen. På torra och blåsiga platser misslyckas alltid dessa växter. Den italienska kolfhirsens är på varm jord en utmärkt foderväxt.

Groblad, (*Plantago lanceolata*)

Lemnar i hvilken jordmän som helst ett godt färbe.

IV. Diverse Ekonomiväxter:

Pr fl. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

Bohvet, (*Polygonum Fagopyrum*)

" vanlig	—	—	25
" Skottsk silfvergrå	—	—	40
Den skottsk, silfvergrå bohveten växer ytterst kraftigt och användes derföre mängeståndes som foderväxt. Motstår sträng torka och blir rikligare frö, än den vanliga.			
Canariefrö, se rubr. Gräsväxter	—	—	—
Cichoria, se rubr. Sallad & Rotväxter	—	—	—

Hampa, (*Cannabis sativa*)

" vanlig	40	—	3
" Chinesisk jätte-, (<i>Cannabis sativa var. gigantea</i>)	—	—	4
" Piemontesk jätte-, (<i>C. sat. var.</i>)	—	—	20

Kummun, se rubr. Kryddväxter

Lin, (*Linum usitatissimum*)

" vanligt Svenskt	50	—	—
" Riga, pr tunna 48 rdr	60	—	—

Lupiner, (*Lupinus*)

" hvita (<i>L. albus</i>)	40	—	3
" blå (<i>L. angustifolius</i>)	35	—	3
" gula (<i>L. luteus</i>)	25	—	3

Lupinernas värde i landbruken har under de senaste åren blifvit allmänt erkändt.

Senap, (*Sinapis*)

" Engelsk, gul (<i>sin. alba</i>)	50	—	3
" brun (<i>sin. nigra</i>)	90	—	3

Solros, (*Helianthus annuus*)

" vanlig	—	—	5
" ny, ovanligt stort frö (<i>H. annuus maeropsporus praecox</i>)	—	—	10
Fröet af solrosen gifver en utmärkt god matolja.			

Tobak, (*Nicotiana Tabacum*)

" äkta Cuba	5,50	—	8
" stor Havana	—	—	8
" Portorico	5,50	—	8

	Pr	U.	Ort.		Pr	U.	Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.				Rmt Rd ö. Rd ö.			
Tobak, stor, Turkisk	6	—	8	Wallmo, rödblommende med hvitt			
" Amersforter	—	—	8	frö och tillslutna fröhus	80	—	3
" storbl. jätte-, (<i>N. macrophylla gigantea</i>)	—	—	10	" Jätte-, m. hvitt frö (<i>Pap. somn. giganteum</i>)	2	—	4
Tobaken fördras lätt, sandblandad, kraftig jord, som årligen bör uppföras med gammal gödsel.				" Opie-, (<i>P. somn. opiférum</i>)	4	—	6
Wallmo, (<i>Papaver somniferum</i>) hvidblommende med blått frö och tillslutna fröhus	—	80	—	Wallmo odlas på många ställen utrikes i stor skala för vinmane af olja, hvilken påstäs varu fullt sät god som den bästa italienska olivolja			

C. Träd- och Buskväxter.

Som det visat sig vara mycket kinkigt att kunna hafrva friskt löfräd- och buskväxtfrö å lager, emedan dessa frösor, hvilka i allmänhet lätt taga skada och bliiva odugliga, till en del ej mycket efterfrågas, så hafrva vi upphört med att deraf hålla lager, och derföre uteslutit dem ur priskuranten. — Vi åtaga oss dock att till möjligt billigaste priser **anskaffa större partier af de mest efterfrågade löfräd-frösorerna** om rekvizition derå tidigt tillsändes oss.

Förteckningen å Barrträdfrö återfinnes i statet af 1:sta afdelningen, efter krukväxtfröet.

Fruktkärnor:

Äpplekärnor pr U.	3 —	Plommonkärnor pr U.	1,50
Pärönkärnor " " " " "	5,50	Körsbärskärnor " " " " "	1,75

D. Blomster- och Bladoväxter.

För att lättu mödan för resp. rekvizenter, hafrva vi anordnat blomsterfröförfteckningen, med undantag af „Modeblommor“ i alfabetisk ordning under särskilda hufvudrubriker, hvars ordningsföljd finnes angifven i katalogens innehållsförteckning.

Vid rekvizitioner är det tillräckligt att angifva numren å de frösor, som önskas. Om rekvizition uppgöres efter annan, än den för året gällande katalogen, så torde detta benäget omnämnas.

Portionerna äro tillräckligt stora för vanligt behof; **halfva** sådana säljas ej. Af de sortter, vid hvilka ortpriser finnas noterade, säljes även efter vigt; dock ej mindre än helt ort.

I. Modeblommor; Sortimentblommor:

Aster:

(*Callistephus chinensis*; *Callistemma hortensis*. *Aster chinensis*)

(*Asteroideæ*)

Fröet utså i April på en ljum (icke varm) driftbänk och betäckes foga hyarefter plantorna så snart som möjligt omskolas och sättas på ett par tums afstånd ifrån hvarandra. I slutet af Maj upplanteras de på kall jord i djupt arbetad och med gammal gödsel rikligent uppbländad jord. Alla Aster-sorternas bilda stora rotklimapar, hvarfure nan lätt kan upp-

taga och flytta dem, äfven då de stå i full blomstring. Man bör vid omflyttningen iakttaga att dertill välia en mulen dag, eller hålla plantorna beskyddade tills några dagar efter omsättningen.

Rör-Aster.

Alla blombladen äro sammanrullade i form af smala cylindrar

- I följande färger:
 1. p. 8 öre, pr ort 50 öre.
 1. hvit.
 2. silfverhvit.
 3. gulaktigt hvit.
 4. hvit med rödt.

5. carmosinröd.
 6. mörk carmosinröd.
 7. mörk carmosinröd m. hvitt.
 8. rosenfärgad.
 9. lila färgad.
 10. violett.
 11. violet med hvitt.
 12. himmelsblå med hvitt.
 13. mörkblå.
 14. persikoblomfärgad.
 Alla 14 sorterna 1 rdr,
 6 sorter 45 öre.
 15. blandade färger, à p. 5 öre.
 pr ort 40 öre.

Klot-Aster.

Namnet härleder sig från blommornas runda form.

I följande färger:

- à p. 8 öre, pr ort 50 öre.
 16. hvit.
 17. carmosin.
 18. mörk carmosinröd.
 19. ljus carmin.
 20. carmosin med hvitt.
 21. ljusröd.
 22. rosa med hvitt.
 23. mörkross med hvita strim.
 24. köttfärgad.
 25. mörkblå.
 26. mörkblå med hvitt.
 27. ljusviolett.
 28. mörkviolett.
 29. mörkviolett med hrytt.
 30. mörklila.
 31. äppleblomfärgad.
 Alla 16 sorterna rdr 1,10
 12 sorter . . . — 85
 6 " " " — 45
 32. blandade färger, à p. 5 öre,
 pr ort 40 öre.



Fransysk Pion-Aster.

Klot-Pyramid-Aster.

Pyramidalt växtsätt och klotformiga blommor.

I följande färger:

- à p. 10 öre, pr ort 1 rdr.
 33. rent hvit.
 34. blek svavfvgul.
 35. carmosin.
 36. mörk carmosin.
 37. lysande carmosin med hvitt.
 38. carmin.
 39. mörkröd med hvitt.

40. mörk rosa med hvitt.
 41. ljus azurblå.
 42. svartblå.
 43. mörk lila med hvitt.
 44. violett.
 45. persikoblomfärgad.
 46. äppleblomfärgad.
 Alla 14 sorterna rdr 1,25.
 6 sorter — 50.
 47. blandade färger, à p. 8 öre,
 pr ort 80 öre.



Ranunkel-Pyramid-Aster.

Fransysk Pion-Aster.
 Kraftigt, pyramidformigt växtsätt, stora, väl fyllda blommor af oklanderlig form samt förmåga att motstå mindre tjenlig väderlek ärö egenskaper, som hafva gjort denna astervarietet allmänt omtyckt. Se afbildningen.

I följande färger:

- à p. 15 öre, pr ort rdr 1,75.
 48. hvit.
 49. hvit klotrund.
 50. hvit med mörk carmosinrött centrum.
 51. hvit med mörkrödt.
 52. hvit med rosa.
 53. hvit med svartblått.
 54. carmosin.
 55. eldig carmosin.
 56. mörk carmosin.
 57. mörk carmosin med hvitt.
 58. victoriaröd (eldröd) med hvitt.
 59. liflig rosa.
 60. mörkrosa med hvitt.

61. mörkröd med hvitt.
 62. svartblå.
 63. svartblå med hvitt.
 64. ljusblå med hvitt.
 65. purpurviolett med hvitt.
 66. äppleblomfärgad.
 67. La superbe.
 Alla 20 sorterna, rdr 2,80.
 12 sorter " 1,65.
 6 " " 85.
 68. blandade färger, à p. 10 öre,
 pr ort 1 rdr.

Pion-Klot-Aster.

Utmärker sig för kraftig växt och stora, utmärkt väl formade blommor.

I följande färger:

- à port. 12 ö , pr ort rdr 1,50.
 69. snöhvit.
 70. carmosin.
 71. carmosin med hvitt.
 72. mörk carmosin.
 73. mörk carmosin med hvitt.
 74. rosa med hvitt.
 75. ljusblå.
 76. mörkblå med hvitt.
 77. biljant lila.
 Alla 9 sorterna, 1 rdr.
 78. blandade färger, à p. 10 ö
 pr ort rdr 1,25.



Victoria-Aster.

Oaktadt denna nya asterform upp nära nära 2 fots höjd, växer den dock så kraftigt, och blifver så stark, att den på någorlunda lugna platser ej behöver stödjas eller uppbindas. Hvarje ständ frambringar ett ovanligt stort antal stora och väl fyllda blommor. Man kan således med skäl påstå denna sort vara en af de aldrabästa, nu oglade asterformer. Se afbildningen på omslagets sista sida.

I följande färger:

- à port. 25 öre.
79. hvit.
80. hvit med rosa.
81. hvit med mörklila.
82. mörk carmin.
83. mörk carmosin med hvitt.
84. ljuslila med hvitt.
85. ljusblå.
86. mörkblå.
87. mörkviolett.

Alla 9 sorterna, rdr 2.
88. blandade färger, à p. 20 ö.
pr ort rdr 2.

Victoria.Aster.

Betydligt lägre än föreständende, men lika utmärkt för blomsterrikedom och blommornas skönhet, hvarföre äfven denna sort häftiores till de aldrabästa astrarna. Se afbildningen.

I följande färger:

- à port. 20 öre.
89. hvit.
90. carmosin.
91. carmosin med hvitt.
92. carmosinrosa.
93. hortensiariöd.
94. rent mörkblå.
95. rent ljusblå
96. ljusblå med hvitt.
97. mörkblå med hvitt.
98. lila rosa.
99. persikoblomfärgad.
- Alla 11 sorterna, rdr 2.
6 sorter rdr 1,10.
100. blandade färger, à p. 20 ö.

Låg Victoria-Aster.

En divergärdad, 7 à 9 tum hög form af föregående. Har talrika utmärkt väl fyllda blommor.

I följande färger:

- à port. 25 öre.
101. snöhvít.
102. carminrosa.
103. mörkblå.

Schiller-Aster.

En ny, utmärkt vacker bukettaster.

- I följande färger:*
à port. 25 öre.
104. hvit.
105. mörk carmosin med hvitt.

Dverg-Turban-Aster.

En egendomlig astervariietet med svartgrönt bladverk; passar förträffligt till markerade infattningar.

- à port. 15 öre.
106. mörkröd med hvitt.

Dverg-Bukett-Aster.

Vacker, rikblommig och väl passande till infattning af högre astrar.

- I följande färger:*
à p. 12 ö, pr ort rdr 1,50.
107. hvit med rödt centrum.
108. hvit med mörkblått.
109. carmin.
110. carmin med hvitt.
111. mörk carmin med hvitt.
112. rosa med hvitt.
113. mörkviolett med hvitt.

Alla 7 sorterna, 75 öre.

114. blandade färger, à p. 10 ö.
pr ort rdr 1,25.

Dverg-Bukett-Pyramid-Aster.

Pyramidformigt växtsätt; i ofrigt som föregående. Se afbildningen.

I följande färger:

- à p. 15 ö, pr ort rdr 2,25.
115. hvit.

116. mjölkvit

117. hvit med rosa.

118. carmosin.

119. mörkcarmosin.

120. carmin med hvitt.

121. roseröd.

122. blodröd.

123. mörkblå.

124. ljusblå.

Alla 10 sorterna, rdr 1,35.

125. blandade färger, à p. 12 ö.
pr ort rdr 2.

Dverg-Pyramid-Aster.

Omkring en fot hög; mycket grönig och rikblommande. Blommorna klotformiga, starkt fyllda.

I följande färger:

- à p. 12 ö, pr ort rdr 1,50.
126. rent hvit.

127. hvit med lazurblått.

128. carmosin.

129. mörk carmosin med hvitt.

130. rosa.

131. lazurblå.

132. lazurblå med hvitt.

Alla 7 sorterna, 75 öre.

133. blandade färger, à p. 10 ö.
pr ort rdr 1,25.



Dverg-Bukett-Pyramid-Aster.



Igel-Aster.

Ranunkel-Pyramid-Aster.

Har endast små blommor, hvilka fördelaktigt kunna användas till buketter, kransar, o. s. v.

I följande färger:
å p. 10 ö., pr ort rdr 1,25.

134. hvit.

135. carmosin.

136. carmosin med hvitt.

137. carmin.

138. carmin med hvitt.

139. rosa.

140. rosa med hvitt.

141. ljusblå.

142. ljusblå med hvitt.

143. mörkblå.

Alla 10 sorterna, 90 ö.

144. blandade färger, å p. 8 ö.
pr ort 75 öre.

Kokard-Aster.

En vacker, intressant form. Blommorna, som ej äro särdeles stora, men väl formade och fyllda, äro alltid hvita i midtton, hvarefter de se ganska egendomliga ut.

I följande färger:
å port. 10 öre.

145. carmin med hvitt.

146. mörk carmosin med hvitt.

147. mörkröd med hvitt.

148. ljusblå med hvitt.

149. mörkblå med hvitt.

Alla 5 sorterna, 40 öre.
150. blandade färger, å p. 8 ö.
pr ort rdr 1.

Igel- eller Nål-Aster.

Äfven en intressant varietet. Alla blombladens äro sammanrullade och bilda smala, sträfliformiga ställda rör. Se afbildningen.

I följande färger:

å port. 10 öre.

151. mörkröd.

152. rosentröd.

153. ljusblå.

154. mörkblå.

Alla 4 sorterna, 30 öre.
155. blandade färger, å p. 8 ö.
pr ort 75 öre.

Hög, storblommig Chrysanthemum-Aster.

Har stora vackra blommor med breda, tegellikt liggande, utåtböjda blomblad. Tillhör de bästa astersorterna.

I följande färger:
å p. 12 ö., pr ort rdr 1,75.

156. hvit.

157. hvit med rosa.

158. carmosin med hvitt.

159. rosa.

160. körsbärsröd.

161. hortensiåröd.

162. mörkröd.

163. lila rosa med hvitt.

164. lila med hvitt.

165. kötfärgad.

166. ljusblå.

167. indigoblå.

Alla 12 sorterna, rdr 1,25.

6 sorter " 65.

168. blandade färger, å p. 10 ö.
pr ort rdr 1,25.

Låg, storblommig Chrysanthemum-Aster.

Blommor rikt; lika utmärkt som föregående, men lägre.

I föliande färger:

å p. 12 ö., pr ort rdr 1,75.

169. rent hvid.

170. hvid med mörkblått.

171. carmin.

172. carmin med hvitt.

173. rosa.

174. rosa med hvitt.

175. mörkrosa med hvitt.

176. ljusblå.

177. ljusblå med hvitt.

178. mörkblå med hvitt.

Alla 10 sorterna, rdr 1,05.

179. blandade färger, å p. 10 ö.
pr ort rdr 1,25.

Truffaut's imbrikerade Pompon-Aster.

En mycket prydig, rikt blommade sort med klotformiga blommor.

I föliande färger:

å p. 10 ö., pr ort rdr 2.

180. rent hvid.

181. hvid med carmin.

182. hvid med mörkblått.

183. carmin.

184. carmin med hvitt.

185. rosa.

186. mörk rösenröd med hvitt.

187. ljusblå med hvitt.

188. violet med hvitt.

189. brunviolett med hvitt.

Alla 10 sorterna, 90 öre.

190. blandade färger, å p. 8 ö.
pr ort rdr 1,50.

Vilmorins' Chinesiska Original-Aster.

Intressant sort, hvars blommor, eftur ej af särdeles vacker form, utmärka sig genon sin utomordentliga storlek.

191. blandade färger, å p. 10 ö.

pr ort rdr 1,25.

192. blandade Dverg-Aster, passande att infatta grupper,
å port. 5 öre, pr ort 70 ö.

Då urvalet helt och hållet anförtros å oss, lemnas:

150 sorter Aster, rdr 14 —

100 " " 10 —

50 vackra sorten " 5,50.

25 " " 3 —

Löfkojor:

(*Cheiranthus annuus*; *Mathiola annua*, Sommar-Löfkoja. —

Cheir; *Math. annua* var. *autumnalis*, Höstlöfkoja. — *Cheiranth*. *Math. incana*, Vinter-Löfkoja.)

(Cruciferae.)

Löfkojorna tillhör kälvåxternas familj (cruciferae) och den enkla formen växter allmänt vild i södra Europa. För att under hela sommaren och hösten oäfbrutet knuna hafva dessa vackra och omtyckta växter blommande, bör man antingen utså fröet på olika tider eller dock, hvilket är bequämre och sällan, välja sådana sorten, hvars blomningstider afsluta hvarandra. De engelska sommarlöfkojorna blomma tidigast; denna näst de tidiga höstlöfkojorna och sist kejsarlöfkojor, med hvars öfvervintrade exemplar man föliande våren gör början. Fröet sätts i ljum (ej varm) driftbänk och betäckes föga. Så snart hjertbladen äro utbildade böra plantorna omsköljas, med 3 tums mellanrum mellan hvarandra, uti väl sandblandad jord. När de börja växa erhålla de rikligt frisk luft och vatten då det behöfves. För att så mycket som möjligt hindra plantornas omkulfallande, bör man ej så eller plantera för tätt, ej vattna när jorden är starkt upphettad af solvärmen eller bygagna för kallt vatten. Jorden bör vara fri från alla oförmulnade ämnen, af hvad slag det vara må. Mot slutet af Maj upplanteras löfkojorna uti djupt och fint arbetad, kraftig jord på fritt land, hvarvid man bör tillse att roten ej krökas vid nedslätningen, hvilket ofta försäkrar plantans död. Vinterlöf. upplanteras på sängar, insläs om hösten i krukor, öfvervintras i en svat och luftig lokal och vattnas föga. Höst- och kejsarlöf. kunna äfven användas som vinterlöf, och äro oftast tacksammare, alltid vackrare än de sistnämnda.

Engelsk Sommar-Löfkoja.

Bästa qualité frö, af i krukor odlade exemplar.

I föliande färger:

å p. 15 ö., pr ort rdr 2,50.

193. hvid.

194. carmosin.

195. mörk carmosinröd.

196. carminröd.
 197. mörk carminröd.
 198. rosa med gult sken.
 199. ljusröd.
 200. blodröd.
 201. victoriaröd, extra.
 202. köttfärgad, storbl.
 203. ljusbrun.
 204. mörkbrun.
 205. chamois.
 206. bleklila.
 207. mörklila.
 208. azurblå.
 209. ljusblå med gult sken.
 210. mörkblå.
 211. ljusviolett.
 212. mörkviolett.
 213. ljus mordoré.
 214. persikoblomfärgad.
**Alla 22 sorterna, 3 rdr
20 sorter rdr 2,75.**
12 " 1,70.
 215. blandade färger 1:ma.
 à p. 12 ö., pr ort rdr 2,25.
 216. blandade färger, 2:da.
 à p. 8 ö., pr ort 85 öre.

Engelsk,**Bukett-Sommar-Löfkoja.**
Hvarje planta bildar en blomsterrik, pyramidformig bukett.*I följande färger:*

à p. 20 ö., pr ort rdr 3,75.

217. carmosinröd.
 218. rosenröd.
 219. ljusblå.
 220. mörkviolett.
Alla 4 sorterna, 70 öre.
 221. blandade färger, à p. 15 ö.
 pr ort 3 rdr.

Engelsk,**Lackbladig Sommar-Löfkoja.**
Varieteterna af denna afdeling hafva släta, gröna blad, liknande gyllenlackens. Föredrages att många blomsterodlare.*I följande färger:*

à p. 15 ö., pr ort rdr 2,75.

222. hvit.
 223. mörk carmosin.
 224. carmin.
 225. köttfärgad.
 226. ljusbrun.
 227. svartbrun.
 228. svafvelgul.
 229. mörk lila.
 230. ljusblå.
 231. mörkblå.
 232. violett.
 233. mörkviolett.
 234. persikoblomfärgad.
Alla 13 sorterna, rdr 1,80.
6 sorter " — 80.

235. blandade färger à p. 12 ö.
 pr ort rdr 2,50.

**Engelsk,
Storblommig Sommar-Löfkoja.**
Utmärkt för sina stora blommor och sitt kraftiga växtsätt.*I följande färger:*

à p. 20 ö., pr ort rdr 3,75.

236. hvit.
 287. carmosin.
 238. mörk carmosin.
 239. carmin.
 240. carminrosa.
 241. högröd.
 242. mörk blod-, victoriaröd,
 243. amaroräffad.
 244. rosa.
 245. köttfärgad.
 246. kanariegul.
 247. svafvelgul.
 248. chamois.
 249. ljusblå.
 250. mörkblå.

Alla 15 sorterna, rdr 2,75.**6 sortter** " 1,10.

251. blandade färger, à p. 15 ö.
 pr ort rdr 3.

Engelsk, Pyramidiformig, Storblommig Sommar-Löfkoja.

Hålls af många för den bästa sommarlöfkoja och är särdeles utmärkt. Blommor längs med stora blommor; växtsättet pyramidformigt.

I följande färger:

à p. 20 ö., pr ort rdr 3,75.

252. rent hvit.
 253. hvit med svag rosa.
 254. hvit med lackblad.
 255. carminröd.
 256. mörkrosa.
 257. rödbrun.
 258. chamois.
 259. canariegul med lackblad.
 260. ljusblå.
 261. mörkblå.
 262. brilliant lila.

Alla 11 sorterna, rdr 1,85.
6 sortter " 1.

263. blandade färger, à p. 15 ö.
 pr ort rdr 2,75.

Engelsk, Ständigt Blommande Sommar-Löfkoja.

Varieteterna af denna sort hafva förmåga att, sedan de förvissnade blommorna blifvit afskurna, ånyo frambringa blombärande skott.

I följande färger:

à p. 15 ö., pr ort rdr 3,25.

264. hvit.
 265. carmosin.
 266. köttfärgad.
 267. rödbrun.

268. rödgrå.**269. mörkblå.****270. mörkviolett.****Alla 7 sorterna, 90 öre.**
pr ort rdr 2,75.**Dverg-Pyramid-Sommar-Löfkoja.**

En ungefär 6 à 8 tum hög, storblommig, mycket praktfull sort.

I följande färger:

à port. 20 öre.

272. carmosin.**273. rosenröd, briljant.****274. ljusblå.****275. mörkblå.****276. äppleblomfärgad.****Alla 5 sorterna 85 öre.****277. blandade färger, à p. 15 ö.
pr ort rdr 3,25.****Bastard-Sommar-Löfkoja.**

Denna sort bildar en öfvergäng från de lackbladiga till de vanliga löfkojorna.

I följande färger:

à port. 15 öre.

278. hvit med rosa.**279. hvit med azurblått.****280. carminröd.****281. rosa.****282. lila.****283. kanariegul.****284. azurblå med gult öga.****Alla 7 sorterna, 90 öre.****285. blandade färger, à p. 12 ö.****Trädlik Jätte-Sommar-Löfkoja.**

Växter trädlik, blommorna stora och praktfulla; en i alla hänsynen utmärkt sort.

I följande färger:

à port. 25 öre.

286. hvit.**287. carmosin.****288. rosa.****289. citrongul.****290. ljusblå.****291. mörkblå.****Alla 6 sorterna, rdr 1,35.****292. blandade färger, à p. 25 ö.****Engelsk, tidigt blommande Höst-Löfkoja.**

Om fröet utsätts i April, samtidigt med sommarlöfkojorna, och i öfrigt behandlas som dessa, så blomma de i Augusti, eller just lagom tidigt för att ersätta de då vanligaste vissnande sommarlöfkojorna.

I följande färger:

à p. 25 ö., pr ort rdr 5,25.

293. hvit.**294. carmosin.**

295. carmosin med lackblad.
296. carminröd.
297. mörkblå med lackblad.
298. brunviolett med lackblad.
Alla 6 sorterna, rdr 1,25.
299. blandade färger, à p. 20 ö.
pr ort rdr 4,50.

Engelsk Bastard Höst-Löfkoja.
Något senare än föregående.

I följande färger:

à port. 25 öre.

300. hvit med lackblad.

301. carmosinröd.

302. carminröd.

303. rosenröd.

304. kastanjbrun.

305. ljusblå.

306. mörkblå.

Alla 7 sorterna, rdr 1,50.

307. blandade färger, à p. 20 ö.

pr ort rdr 4,50.

Perpetuell eller Kejsar-Höst-Löfkoja.

Denna utmärkta sort blommar något senare än de båda förtutnämnda arterna, mot slutet af Augusti och i September. De kunnar senare på hösten upptäckas, planteras i krukor och övervintras på ett luftigt, frostfritt ställe, då man följan-de vår af dem erhåller en tidig, rik och väcker blomning.

I följande färger:

à p. 25 ö., pr ort rdr 4,75.

308. carminröd.

309. ljus purpur.

310. rosenröd.

311. eldröd med lackblad.

312. köttfärgad.

313. kopparrosa, skön,

314. svavelf gul med lackblad.

315. blå.

316. violett.

Alla 9 sorterna, rdr 2.

317. blandade färger, à p. 20 ö.

pr ort rdr 4,25.

Storblommig Kejsar-Höst-Löfkoja.

Som föregående sort, utmärkt.

I följande färger:

à p. 25 ö., pr ort rdr 4,25.

318. rent hvit.

319. carmosinröd.

320. carminrosa.

321. rosa.

322. ljusröd.

323. köttfärgad.

324. ljusblå.

325. mörkviolett.

326. persikoblomfärgad.

- Alla 9 sorterna, rdr 2.
327. blandade färger, à p. 20 ö.
pr ort rdr 3,50.

Vanlig Vinter-Löfkoja.

Bästa sort frö, samlad af kru-kor odlade exemplar.

I följande färger:

à p. 15 ö., pr ort rdr 3,25.

328. hvit.

329. mörk carmosinröd.

330. carminröd.

331. carminröd, låg, trädartad.

332. rosenröd.

333. högröd.

334. eldröd.

335. svavelf gul.

336. ljusblå.

337. mörkblå.

Alla 10 sorterna, rdr 1,30.

338. blandade färger, à p. 12 ö.

pr ort rdr 2,50.

Cocardeau- eller Stång-Vin-ter-Löfkoja.

Trädartad med yvfiga kronor och store blomklasta.

I följande färger:

à port. 25 öre.

339. hvit.

340. hvit med lackblad.

341. carmosinröd.

342. carmin.

343. kungsblå.

Alla 5 sorterna, rdr 1,10.

344. blandade färger, à p. 20 ö.

pr ort rdr 3,75.

Dverg-Vinter-Löfkoja.

Utmärkt för sin låga, men kraf-tiga växt.

I följande färger:

à port. 25 öre.

345. högröd.

346. rosenröd.

347. mörkblå.

Alla 3 sorterna, 70 öre.

348. blandade färger, à p. 20 ö.

pr ort rdr 3,75.

Lackbladig Vinter-Löfkoja.

Har store blommor i rena, klara färger och gröna, gyllenlack-liga blad.

I följande färger:

à p. 20 ö., pr ort rdr 3,50.

349. hvit.

350. carmosin.

351. rosa.

352. blekröd.

353. svavelf gul.

354. mörkblå.

355. violett.

- Alla 7 sorterna, rdr 1,20.

356. blandade färger à p. 15 ö.
pr ort rdr 2,75.

Dverg-Bukett-Vinter-Löfkoja.

Lågväxt med stora klasar af väl fylda blommor.

357. blandade färger, à p. 20 ö.

Om urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:

125 sortir Löfkoja, rdr 18,50.

100 " " 15,50.

50 " " 8,75.

25 vackra sortir " 4,50.

Gyllenlack; Lackvioler.

(*Cheiranthus Cheiri*)

(*Cruciferæ*)

Gyllenlacken tillhör samma fa-milj som löfkojan och växer i södra Europa temmeligen all-mänt vild på gamla murar o-dyl. Fröet sås i kall drifbänk, (ej djupt) och plantorna utsätts sedan i djupt arbetad, kraftig jord på 1 à 1½ fots af-ständ från hvarandra. Vid torr väderlek vattnas de tillräckligt. Mot hösten upptagas de starkaste plantorna och sättas i passande krukor uti god, kraftig drifbänkjord, blandad med hornspän. Övervintras som vinterlöfkojar.

Stång-Gyllenlack.

I följande färger:

à p. 15 ö., pr ort rdr 2,75.

358. kanariegul, dubbel.

359. mörkbrun, dubbel.

360. blå, dnbbel.

Alla 3 sorterna, 35 öre.

361. blandade färger, à p. 12 ö.

pr ort rdr 2,25.

Busk-Gyllenlack,

i följande färger:

à p. 15 ö., pr ort rdr 2,75.

362. gul, dubbel.

363. brun, dubbel.

364. brun, enkel.

Alla 3 sorterna, 35 öre.

365. blandade färger à p. 12 ö.

pr ort rdr 2,25.

Dverg-Gyllenlack,

i följande färger:

à p. 15 öre, pr ort rdr 3.

366. brun, extra, dubbel.

367. mörkbrun, enkel, storbl.

368. bronsfärgad.

369. blå, extra.

Alla 4 sorterna, 50 öre.

370. blandade färger, à p. 15 ö.

pr ort rdr 2,75.

Balsaminer.

(*Impatiens Balsamina; Balsamina hortensis.*)
(*Balsamineæ.*)

Fröet utsås antingen i krukor eller och fritt i en varm driftbänk. När hjertbladen utbildat sig, omskolas plantorna i annat förster på 5 à 6 tums avstånd från hystranda och obetydligt djupare än de stått förut. Der få de unga plantorna qvarstå så länge utrymmet tilläter, hvarefter de upptagas med vidhängande rotklipp och planteras i passande krukor i fet, halftummad gödseljord. Då plantrötterna uppstilla krukkorna gesives gödselvatten 2 à 3 gånger i veckan. Exemplären börja ej utflyttas på fritt land förr än de börjat blomma.

Rosen-Balsamin.

Har hög, trädlik, men föga' grena'ig växt samt stora, tätt sittande, starkt fyllda blommor.

I följande färger:

à port. 12 öre.

371. rent hvit.

372. hvit med rosa.

373. purpuröd.

374. granatröd.

375. rosenfärgad.

376. ljusgul.

377. chamois.

378. mörkblå.

379. lila.

380. äppleblomfärgad.

Alla 10 sorterna rdr 1 —

381. blandade färger, à p. 10 ö.
pr ort rdr 1,50.

Camellie-Balsamin.

(*Andrieux förbättrad.*)

Denna sorts blifver ej så hög; har tätt sittande, starkt fyllda, mer ändels fläckiga blommor.

I följande färger:

à port. 15 öre.

382. carmin med hvitt.

383. carmosinrosa.

384. rosa med hvitt.

385. skarlakan.

386. lila med hvitt.

387. violett.

Alla 6 sorterna, 75 öre.

388. blandade färger, à p. 12 ö.
pr ort rdr 1,50.

Dverg-Balsamin.

Betydligt lägre än förestående sorter; men ejest lik dessa.

I följande färger:

à port. 15 öre.

389. hvit med skarlakan.

390. purpur.

391. granatröd.

392. tegelröd med hvitt.

393. kötfärgad med hvitt.

394. trefärgad.

Alla 6 sorterna, 75 öre.

395. blandade färger, à p. 12 ö.
pr ort rdr 1,50.

396. Solierino-Balsamin, med

lila-, carmosin- och skarlakanröda strimmar; utmärkt nyhet, à port. 30 ö.

397. Atrosanguinea plenissima,

blodröd, mycket storblommig, dubbelt;

praktfull nyhet, à port. 30 ö.

Flamblomma.

(*Phlox Drummondii.*)

(Polemoniaceæ.)

Är en af de vackraste sommarblommor för sällv frid land, som för krukor. Fröet säs i driftbänk och hålls jemt fuktigt. Mot slutet af Maj planteras de i krukor eller på kall jord. Om man utsår frö i Juli och öfvervintrar plantorna vid + 4 à 6° Cels., så erhålls kraftiga exemplar, som blomma tidigt om våren.

I följande färger:

à p. 12 ö., pr ort rdr 1,50.

398. hvit.

399. purpuröd.

400. rosenröd.

401. eldröd.

402. Imperatrice Eugenie.

403. marmorata rosea.

404. marmorata violacea.

405. Prinz Leopold, högröd

med hvit stjerna.

406. Prinz Royal, lila med

hvita strimmar.

407. Radowitzii, röd, strimlig.

408. Wilhelm I, mörkröd.

409. Napoleon III.

410. chamois rosa.

411. rosea alba oculata.

412. skifferblå varieteter.

413. violetta varieteter, med

hvit stjerna i mitten.

414. Isabellina, gulaktig.

Alla 19 sorterna, rdr 1,95.

10 sorter " 1 —

415. blandade färger, à p. 10 ö.
pr ort 75 öre.

416. Phl. Dr. Heinholdii, ny

praktfull varietet med intensift skarlakanröda blommor; särdeles utmärkt till grupper, à port. 45 öre.

St. Jakobsblomma.

(*Senecio elegans*)

(*Senecionideæ.*)

Utsås och behandlas som flamblomman; kan äfven förökas genom steklingar; utmärkt gruppväxt.

Hög St. Jacobsblomma.

i följande färger och sorter :

à p. 6 ö., pr ort 85 öre.

417. alba plena, hvit.

418. atrocinereo pl., mörkbrnn.

419. atropurpurea pl., mörk-purpurfärgad.

420. lilacina pl., lilafärgad.

421. rosea pl., rosenröd.

422. rubra pl., röd.

423. purpurea pl. purp., extra.

Alla 7 sorterna, 35 öre

424. blandade färger, à p. 5 ö.
pr ort 50 öre.

Låg St. Jacobsblomma.

(*Sen. elegans nana*)

i följande färger och sorter :

à port. 12 öre.

425. alba plena, hvit.

426. atrocinereo pl., mörkbrnn.

427. coerulea pl., blå.

428. cuprea pl., kopparfärgad.

429. rubra pl., röd.

430. purpurea, purpuröd.

Alla 6 sorterna, 60 öre.

431. blandade färger, à p. 10 ö.

Lejongap.

(*Antirrhinum majus*)

(Personate.)

Fröet utsås om våren och hålls jemt fuktigt. Så tidigt som möjligt upplanteras man plantorna på deras platser på kall jord. En del planteras man äfven i krukor och öfvervintrar dem med frostfritt ställe, då de följannde våren blomma tidigt och vackert.

Höga Lejongap.

i följande färger och sorter :

à port. 5 öre, pr ort 40 ö.

432. alba, hvit.

433. Brillant, trefärgad.

434. Crescia, mörk skarlakan.

435. Delila, carmin med gult.

436. Etna.

437. Firefly, skarlakan med gult och hvit.

438. Galathée.

439. Ghestia, blodröd.

440. Henry IV, cinnoberröd.

441. nigrescens, mörk purpur, utmärkt.

442. *Papillionaceum*, purpur med hvitt.
 443. *striatum*, strimmig.
 Alla 12 sorterna, 50 öre.
 444. blandade färger, à p. 5 ö.
 pr ort 25 öre.

Låga Lejongap.*(Antirrh. maj. nanum.)**i följande färger och sorter:*

- à port. 8 öre, pr ort 50 ö.
 445. alba, hvit.
 446. aureum *striatum*, gul med hvitt.
 447. Brillant, trefärgad.
 448. Delila, carmin med gult och hvitt.
 449. Firefly, orange-skarlakan med gult och hvitt.
 450. Galathée, carmosin med hvitt.
 451. Henry IV, cinnober med gult.
 452. kermesina splendens, carmosin.
 453. luteum, ljusgul, utmärkt.
 454. *Papillionaceum*, purpur med hvitt.
 Alla 10 sorterna, 65 öre.
 455. blandade färger, à p. 8 ö.
 pr ort 40 öre.

Dvergartade Lejongap.*(Ant. maj. nanissimum.)**i följande färger och sorter:*

- à port. 15 öre.
 456. *album rubrum striatum*.
 hvit med röda strimmor.
 457. *Cinnabarium*.
 458. Delila, carmin med gult.
 459. Henry IV, cinnober med gult.
 460. *luteum rubrum, striatum*,
 gul med röda strimmor.
 Alla 5 sorterna, 60 öre.
 461. blandade färger, à p. 10 ö.

Neglikor.*(Dianthus caryophyllus.)**(Caryophylleæ.)*

Neglikorna är bland våra äldsta och bäst omtyckta trädgårdsblommor. Fröet säs antingen fritt i en ljum driftbänk eller i flata, s. k. fröfat. När plantorna blifvit ett par tum höga, planteras de på för dem iordningjorda sängar i fet, men ej nytödslad jord. Om vintern är täckningen endast nödvändig, när snön och ihållande barfrost är rådande. Under blomningstiden bör man skydda neglikorna mot starkt solsken och häftiga regnskurar.

De vackraste sorterna odlar man gerna i kruka. De trifvas väl i god grästorfjord, sådan som hemtats från någon äng, der talrika kreatur betat. Denna jord blandas med gammal kögdelsejord och sand. Krukorna böra ej vara för stora, 5 à 6 tunns vidd anses tillräcklig, helst nya och väl dränerade. Öfvervintras i en frostfri lokal, så torrt, kallt och luftigt, som möjligt.

I följande sorter:

462. *utmärkta sorten, 1:ma.*
 à p. 12 ö., pr ort rdr 1,50.
 463. *mångfärgade, dubbel, 2:a.*
 à p. 10 ö., pr ort 60 öre.
 464. *utfärgade dubbel, tid. blom.*
 à p. 10 ö., pr ort 60 öre.
 465. *remonterande, 30:k, 50 ö.*
 466. " 2:da, à port. 20 ö.
 467. *Chor-Negl.* Bizard i mängga färger, à p. 50 öre.
 468. " Picott, flammig, med hvit botten, à p. 30 ö.
 469. " Picott, flammig, med gul botten, à p. 30 ö.
 470. " 1:ma, à 12 korn 20 ö.
 471. " 2:da, à 15 korn 15 ö.
 472. *Dverg-Negl.*, à port. 15 ö.
 pr ort rdr 1,75.
 6 sköna sorter, rdr 1,80.

Kinesiska Neglikor.*(Dianthus chinensis.)**(Caryophylleæ.)*

Fröet utsätts i Mars och plantorna omskolas och värdas under glas tulds do i början av Juni kunnan utflyttas på kall jord. Till de exemplar, som man ämnar öfvintra säs fröet i Juli eller Augusti. Plantorna ställas under vintern i ett kallt växthus, nära glaset och vattnas sparsamt, men luftas så ofta vidret sådant tillåter. Räknas till våra alldrabästa sommarblommor.

I följande sorter:

473. fl. pl. . . à port. 5 öre.
 pr ort 30 öre.
 474. alba. . . à port. 8 öre.
 pr ort 50 öre.
 475. " *striata plena*, à p. 8 öre.
 pr ort 50 öre.
 476. *imperialis* fl. pl. à p. 8 öre.
 477. " fl. *atrosanguinea* pl.
 à p. 8 ö., pr ort 50 öre.
 478. " *compactus* fl. pl.
 à p. 10 ö., pr ort 50 öre.
 479. *rubra striata* pl. à p. 8 öre.
 pr ort 50 öre.
 480. *nanus* fl. *atrosanguinea* pl.
 à port. 20 öre.
 481. " fl. *cupreo* pl.
 à port. 20 öre.
 482. " fl. *roseo* pl. à p. 20 ö.

483. *nanus pumila nova var.*, till garnering, à p. 20 öre.

484. *Hedevigii (giganteus)*.
 à p. 10 ö., pr ort 80 ö.

485. " *alba grandiflora*.
 à port. 35 öre.

486. " *diadematus* fl. pl.,
 à port. 30 öre.

487. " *hybr.* fl. pl., à p. 15 ö.

488. *laciniatus*, à port. 10 öre.

489. " fl. pl., à port. 15 öre.

490. " *atropurpurea* pl.,
 à port. 25 öre.

Alla 18 sorterna, rdr 2,50.

12 sorter, " 1,70.

Borst-Neglikor.*(Dianthus barbatus.)**(Caryophylleæ.)*

De på senare tiderna erhållna, praktfulla varieteterna af horstneglikor, göra dessa fleråriga växter förtjenta af en mera allmän uppmärksamhet än som vanligtvis egnas dem. Utmärkt vackra till grupper och rabatter och ej på något sätt ömtäliga.

I följande sorter:

491. *flore pleno*, dubbla,
 à p. 10 öre, pr ort 90 ö.
 492. *Dunetii*, lysande carmin,
 à p. 8 öre, pr ort 40 ö.
 493. *sanguineus*, blodröd,
 à port. 8 öre.
 494. *nigricans*, svartröd, praktfull, . . . à port. 20 öre.
 495. *oculatus marginatus*, hvitt öga o. hvit kant, à p. 20 ö.
 pr ort rdr 1,75.

496. " *marg.*, mörkt öga och bred, hvit kant,
 à port. 20 öre.

497. " *plenissimus*, starkt fyllda, utm. à p. 25 ö.
 498. *auriculiflorus*, à p. 20 ö.

8 sorter, . . . rdr 1,—

499. blandade, à port. 8 öre,
 pr ort 75 öre.

De öfriga Dianthusarterna är upptagna bland fleråriga växter.

Petunier.*(Petunia.)**(Solaneæ.)*

Alla sorterna petunia är utmärkt vackra och mycket tacksamma prydnadsväxter. De kunna användas på mångahanda sätt, såsom till grupper, krukor, ampar, espalier o. s. v. De trifvas i all slags jord, blott den är närlande och löst. Fröet säs i krukor och de unga plantorna omskolas i fat, eller i ett affyldt driftbänkfonster, besugkas några dagar för solskenet, vattnas och luftas ordentligt samt upplanteras på fritt land

i början af Juni. Till exemplar, som skola öfvervintras, ut-sås fröet i Juli eller början af Augusti.

I följande sorter:

500. mirabilis, (*P. violacea; phoenicea*) mörk carmosinröda blommor, à p. 5 öre.
pr ort 40 öre
501. nyctageniflora, (*Nicotiana nyctag; Nic. axillaris*) stora, hvita blommor, à p. 5 öre.
pr ort 30 öre.

Varieteter af förestående,

(*Petunia hybrida*)

I följande sorter:

- à port. 15 öre.
502. Argentea, silverbright.
503. Corona, purpur carmosinröd med hvita strimmar.
504. Flore pleno, dubbblomma, i flera färger.
505. Countesse of Ellesmere, ljus rose med hvit pip.
506. Grandiflora, storblommig.
507. " carminea, storbl., carminröd.
508. Inimitable, atlas hvit, rödfläckig.
509. " marmorata, hvit rödstrimmig.
510. Kermesina grandifl., storblommig, carmosin röd.
511. Marginata, röd, med breda gröna kanter.
512. Multiflora, carmosinröd, rikt blommande.
513. Maxima purpurea, stor, purpur röd.
514. Picturata, mörk purpur carmosinröd, marmoreras med hvitt.
515. Reticulata, mörk carmosinröd, svartådrad.
516. " purpur röd, svartstrim.
517. " rosengräddig, ådrad med mörkrött.
518. " mörklila, svartstrim.
519. " rödviolett, brunstrim.
520. " ljusblå, svartstrimlig.
521. Venosa, strimlig.
Alla 22 sorterna, rdr 2,90.
12 sorter " 1,60.
6 " Reticulata 80 öre.
522. blandade, 1:ma, à p. 10 öre.
pr ort 95 öre.
523. blandade, 2:da, à p. 8 öre,
pr ort 60 öre.

Portlak.

(*Portulaca*)

(*Portulaceæ*)

Alla sorterna, utmärka sig för stora, ytterst briljant färgade

blommor. Fordra varmt, soligt läge och fet sandjord, något uppbländad med gammal kalk. Vill man ha blommmande portlak hela sommaren igenom, så bör fröet utsås 2 à 3 gånger, första gången i kruka eller drifbänk, men andra och tredje gången direkt på kalljord. De enkla sorterna forplanta sig ofta själva genom utfallande frö.

I följande sorter:

à port. 8 öre.

524. Gilliesii, carmosin och purpur rödt på hvitt.
525. grandifl., storbl., purpur carmosinröd.
526. " Thellsonii, cinnamon röd, präktig.
527. " alba striata, hvit, rödstrimlig.
528. " splendens, lysande röd.
529. " aurea, gul.
530. " incarnata, köttfärgad.
531. " rosea, rosenfärgad.
532. " Thorbumii.

Alla 9 sorterna, 65 öre.

533. blandade, à port. 5 öre,
pr ort 60 öre.

Dubbelblommande Portlak,

i följande sorter

à port. 40 öre.

534. grandiflora plenissima alba, rent hvit.
535. " pl. coccinea skarla kanröd.
536. " Kermesina, carmosinröd.
537. " aurea, guldgul.
538. " isabellina, gul.
539. " rosea, rosenröd.

Alla 6 sorterna rdr 2,20.

540. blandade, à port. 30 öre.

Riddarsporrar.

(*Delphinium*)

(*Ranunculaceæ*)

Riddarsporrar hör till de vackraste sommarväxterna. Bäst är att utså fröet om hösten på de ställen der växterna skola blomma, men man kan äfven göra sädden på våren. De förstnämnda sorterna blirva 2¹/₂ à 3 fot höga, de sistn., 1 à 1¹/₂ fot. Fordra god, väl arbetad jord.

Löfkojlik Riddarsporre;

(*Delphinium Consolida*)

i följande färger:

- à p. 8 öre, pr ort 40 ö.
541. snöhvit.
542. högrosa.
543. mörkrosa,
544. köttfärgad.

545. mörkblå.

546. ljusblå.

547. ljuslila.

548. brokig.

Alla 8 sorterna, 55 öre.

549. blandade färger, à p. 5 ö.

pr ort 20 öre.

Ranunkelik Riddarsporre.

(*Delph. Ajacis ranunculiflorus*)
Vackra, starkt fyllda, ranunkel lika blommor.

550. blandade färger, à p. 8 ö.
pr ort 50 öre.

Hyacinthlik Riddarsporre,

(*D. Ajac. var. hyacinthiflorum*)
i följande färger:

à p. 5 öre, pr ort 25 ö.

551. hvit.

552. tegelröd.

553. köttfärgad.

554. chamois.

555. ljusblå.

556. mörkblå.

557. ljusviolet.

558. vallmogrå.

559. rödaktig lila.

560. äppleblomfärgad.

Alla 10 sorterna, 45 öre.

561. blandade färger à p. 5 ö.

pr ort 15 öre.

Blomman för dagen.

(*Ipomea purpurea; Pharbitis hispida*)

(*Convolvulaceæ*)

Slingerväxt med mycket prydliga blommor. Fröet utsås i kruka eller bänk och de unga plantorna utsätts på varma, skyddade ställen på kall jord. Utmärkt användas tillbeklädnad af mindre espaler, pelare, korgar, höga törnrosor, o. s. v.

I följande färger:

à p. 8 öre, pr ort 20 öre.

562. hvit.

563. hvit, blårandig.

564. hvit, violettröd.

565. ljust rosenröd.

566. ljust inkarnatröd.

567. mörkblå.

568. violet.

569. lilafärgad.

570. spec. fr. Indien.

Alla 9 sorterna, 60 öre.

571. blandade färger, à p. 5 ö.

pr ort 10 öre.

De öfriga Ipomeasorterna finns upptagna bland slingerväxter.

Sammetsblomma.

(*Tarjetes*)

(*Senecioneæ*)

Utsås och behandlas som aster. Den sistnämnda sorten passar väl till infatningar.

I följande sorter:

572. erecta aurantiaca, orange
 573. " sulphurea, svavfvgul.
 574. " plenissima, mycket
 dubbel, blekgul.
 575. " nana, lågväxt.
 576. lucida, glänsande (egent-
 ligen flerårig)
 577. patula, utbredd.
 578. " nana, låg.
 579. " pulchra, gul med brunt.
 580. " pumila, lågväxt.
 581. " ranunculoides, ranun-
 kellik, mycket dubbel.
 582. signata, finbladig.
 583. " pumila, dvergartad,
 à port. 10 öre.
 Alla 12 sorterna, 50 öre.
 584. blandade, à port. 5 öre.
 pr ort 20 öre.

Stockrosor.

(Alcea rosea)

(Malvaceæ.)

I sitt numera betydligt förbättrade tillstånd hörta dessa stätliga blommor till trädgårdens vackraste prydnadsväxter. Fröet bör ej utsättas tidigare än i Juni eller Juli. De unga plantorna gallras eller omskolas på en sång i god jord. Om hösten upptagtas de och antingen insläs i sand i en tom driftbänk-låda, eller planteras i små krukor och överbrynnas frostfrött. Följande vår upplanteras de på den mest beständiga, djupt gräffade och gödslande stället på fritt land, hvareft de blomma, till dess de förstörtras af stark frost.

I följande färger:

585. hvit med cericerödt.
 586. hvit med violett.
 587. gulaktigt hvit.
 588. hvit med lila.
 589. purpur.
 590. mörkpurpur.
 591. skarlakan.
 592. ljus carmin.
 593. mörk carmin.
 594. rosa.
 595. mörk rosa.
 596. ljusröd.
 597. violettröd.
 598. köttfärgad.
 599. äppleblomfärgad.
 600. svavfvgul.
 601. blek svavfvgul.
 602. mörkgul.
 603. guldmalva.
 604. chamois.
 605. mörk chamois.
 606. chamoisrosa.
 607. carmosinviolett.

608. persikoblofmärgad.
 Alla 24 sorterna, rdr 3,30.
 12 sorter. " 1,70.
 609. blandade färger, 1:ma,
 à p. 15 öre, pr ort rdr 1.
 610. blandade färger, 2:da,
 à p. 8 öre, pr ort 50 öre.

Stjufmorsblomma.

(Viola tricolor)

(Violaceæ.)

De nu, under namn af V. tr. maxima eller V. tr. varietatis horrens, så allmänt omtyckta, storblommiga formerna af stjufmorsblomman eller penséen, harva uppkommit genom befruktning mellan den vanliga stjufmorsbl. (Viola tricolor) och altaiviolets (Viola altaica). De utmärka sig genom sina stora, skönt formade och kolorerade blommor, men urarita lätt om exemplaren blifvit gamla, eller få för länge qvarstå på samma ställe. Det är derföre bäst att hvarje år utsät frö till nya planter, eller uppdraga sådana genom sticklingar. Fröet säs heilst 2 gånger årligen, neml. en gång under sommaren, t. ex. i Juli, och en gång på våren. De som blifvit sådå året förra blomma alltid tidigare och rikare än de man sätter på våren. De fördra en fet, lucker, ej för lätt och något fuktig jord. Utmärkta sorten fortplantas särskilt genom sticklingar.

I följande färger och sorter:

- à p. 12 ö., pr ort rdr 1,50.
 611. hvit.
 612. hvitkantad, fantasipensé,
 blombladen omgivna af
 hvita kanter.
 613 carmosin- och purpurmar-
 moreras.
 614. brunröd, extra.
 615. aurikelfärgad.
 616. nigra, svart.
 617. gul.
 618. ljusblå.
 619. flammig.
 à port. 20 öre.
 620. Baron de Rothschild.
 621. pelargonieflora.
 622. coronata, utm. har en mörk
 fläck på hvarje blomblad.
 Alla 12 sorterna, rdr 1,45.
 623. blandade färger, 1:ma,
 à p. 15 ö., pr ort rdr 1,50.
 624. blandade färger, 2:da,
 à p. 8 ö., pr ort 50 öre.

Ärtblomma.

(Lathyrus odoratus)

(Leguminosæ.)

Blommorna, som framkomma talrik till sett på hösten, äro ut-
 märkt vackra och välvakta. Växten, som blifver 6 a 8 fot
 hög, kan begagnas till bekläd-

nad af väggar, plank, espalier.
 flätverk, o. s. v. Fröet utsäts
 på kalljord.

I följande färger:

- à p. 5 öre, pr ort 8 öre.
 625. hvit.
 626. svart purpur.
 627. svart purpur med ljusblått.
 628. mörkröd.
 629. röd, hvitstrimmig.
 630. rödspräcklig.
 631. svartbrun, flammig.
 632. Kapten Clarke, hvitstrim-
 mig.
 633. invincible searlet.

- Alla 9 sorterna, 35 öre.
 634. blandade, à port. 5 öre.
 pr ort 8 öre.
 Öfriga sorter Lathyrus återfinnas
 bland slingerväxter.

Trumpetblomma.(Salpiglossis variabilis; Salp. sinu-
 ata; S. straminea)

(Solanaceæ.)

En med petunian nära befryn-
 dad, 2 a 4 fot hög växt. Fröet
 utsäts tidigt om våren i krukor
 men får ej betäckas med jord,
 utan blott jemt nedtryckas,
 hvarefter krukorna täckas med
 glasskifvor och ställas i bänk.
 När plantorna uppnått erforderlig utveckling, omskolas de
 och upplanteras i början af Juni
 på grupper.

I följande sorter:

- à p. 8 ö., pr ort 85 öre.
 635. alba lutea, hvit med gult.
 636. azurea grandiflora, blå.
 637. coccinea, skarlakan.
 638. sulphurea, svavfvgul.
 639. nana, lågväxt.
 640. " atrovilacea, mörkviol.
 641. " azurea aurea venosa.
 642. " coccinea, skarlakan.
 643. " sulphurea, svavfvgul.
 Alla 9 sorterna, 65 öre.
 644. höga sorter blandade,
 à p. 5 ö.., pr ort 75 öre.
 645. låga sorter blandade,
 à p. 5 ö., pr ort 75 öre.
 646. var. grandiflorus.
 à port. 10 öre.

Tuppakam.

(Celosia cristata)

(Amarantaceæ.)

För att erhålla exemplar med
 stora och välbildade kammar,
 omskolas man plantorna, nyss
 efter det de uppkommit, i ett
 varmt driftbänkfönster i kraftig
 dyngjord. Sedan kammarne
 börjat bilda sig upptagas plan-
 torna med klump och inplanter-
 as i passande krukor, ställas
 åt i varm driftbänk och vatt-
 nas 1 a 2 gånger i veckan med
 starkt gödselvatte.

I följande färger och sorter:

- à p. 8 ö., pr ort 90 öre.
- 647. hvid.
- 648. carmosin.
- 649. ljas carmin.
- 650. mörkpurpur.
- 651. mörkröd.
- 652. mörkrosa.
- 653. eldröd.
- 654. cinnoberröd.
- 655. amaranthröd.
- 656. röd med chamois.
- 657. blek svavfuglul.
- 658. chamois.
- 659. ljas orange.
- 660. guldfärgad.
- 661. macrocephala gigantea.
- 662. pyramidalis aurea.
- 663. " coccinea
Alla 17 sorterna, rdr 1,25.
12 sorter " — 90.
- 664. blandade färger, à p. 5 ö.
pr ort 75 öre.
- 665. låga, blandade, à p. 8 ö.

Underblomman.*(Mirabilis jalappa.)**(Nyctagineæ.)*

Praktfull, 2 a 3 fot hög växt, som blommar till sent på hösten. Fröet sätts om värden och pl. sättas i 3 a 4 tums krukor, som ställas i ljum driftbänk samt vattnas och luftas ordentligt. Utpl. i Juli på fritt land i god, lös och närliggande jordmän.

I följande färger:

- à p. 5 öre, pr ort 10 öre.
- 666. hvid.
- 667. hvid med gult.
- 668. carmosin med hvidt.
- 669. carminröd.
- 670. rosa.
- 671. rosa med gult
- 672. högröd.
- 673. rent gul.
- 674. gul med rödt.
- 675. chamois.
- 676. lila.
Alla 11 sorterna, 45 öre.
- 677. blandade färger, à p. 5 ö.
pr ort 8 öre.

Wallmo.*(Papaver somniferum)**(Papaveraceæ.)*

Alla de anfördna vallmosorterna utm. sig för stora väl fylda blmr i lysande färger. Fröet sätts höst eller vår i fet, lös jord.

I följande färger:

- à port. 5 öre.
- 678. hvid.
- 679. hvid med purpur.
- 680. purpur på svart.
- 681. incarnatröd med violett.
- 682. askrå.

- 683. askgrå med rödt.
- 684. vallmogrå.
- 685. svartbrun med cinober.
- 686. nästan svart.
- 687. ljustblå med cinober.
- 688. mörklila.
- 689. mordorée på askgrått.
Alla 12 sorterna, 50 öre.
- 690. blandade färger, à p. 5 ö.
pr ort 10 öre.

(Pionlik Vallmo.)*(Pap. somnif. var. peoniflorum.)*

- I följande färger:*
à p. 5 ö, pr ort 15 öre.
- 691. hvid.
- 692. hvid med rosa sken.
- 693. purpur.
- 694. präktig skarlakan.
- 695. skarlakan med hvidt.
- 696. ljusrosa.
- 697. högrosa.
- 698. cinober på violett.
- 699. mörk mordorée.
Alla 9 sorterna, 35 öre.
- 700. blandade färger, à p. 5 ö,
pr ort 10 öre.
- 701. nanum, à port. 10 öre.

Fjäderlik Vallmo.*(P. somn. laciniatum Murselli.)*

- I följande sortter:*
à port. 5 öre.
- 702. fl. pl. dubbelt, utmärkt.
- 703. lilacina, lila med rödt.
- 704. splendens, rosa m. hvidt.
- 705. blandade, à port 5 öre.

Ranunkel-Vallmo.*(Papaver Rhocas.)**(Papaveraceæ.)*

- 706. blandade färger, à p. 5 ö.

Zinnia.*(Zinnia elegans)**(Senecioneæ.)*


Zinniaarterna harva lysande blommor och är särdeles användbara till grupper. Fröet utsås nägorlunda tidigt i bänk och planterna börja ej utplanteras förr än väderleken hunnit blixtvå nägorlundasommarlik. Fordra varma, skyddade ställen och kraftig, lös jordmän.

I följande färger och sortter:

- à p. 8 ö., pr ort 40 öre.
- 707. alba, hvid.
- 708. atroviolacea, mörkviolett.
- 709. aurea: guldfärgad.
- 710. coccinea, skarlakan.
- 711. purpurea, purpur.
- 712. sulphurea, svavfuglul.
Alla 6 sorterna, 40 öre.
- 713. blandade färger, à p. 5 ö.
pr ort 25 öre.

Dubbel Zinnia.*(Zinnia elegans fl. pleno.)**I följande sortter:*

- à port. 20 öre.
- 714. aurantiaca, orangeröd.
- 715. coccinea, skarlakan.
- 716. kermesina, carmosin.
- 717. violacea, violett.
- 718. blandade färger, à p. 15 ö.
pr ort 60 öre.



Zinnia elegans flora plena.

II. Dekorativa Bladväxter,

till större eller mindre grupper på fritt land:

	a Port. Ort.	a Port. Ort.
	Rmt Rd. ö. Rd. ö.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.
Acanthus; <i>Björnklö,</i> (<i>Acan-</i> <i>thaceæ</i>)		
719. „ latifolius, bredbladig . . . — 5 — 30		
720. „ longifolius, långbladig . . . — 8 — —		
721. „ mollis, mjukbladig . . . — 8' — 50 Praktfulla, omkring 1 fot höga växter med antika bladformer. Öfverv. frostfritt.		
Amaranthus; <i>Räffsvans,</i> (<i>Amarantaceæ</i>)		
722. „ bicolor fol. purpureis . . . — 20 — —		
723. „ melancholicus — 5 — 20		
724. „ tricolor — 5 — 35 De tvåne förstn. äro utmärkta för sina röda blad och särde- les användbara till bladväxt- och blomstergrupper. Den si- sta har trefärgade blad. Alla äro ettåriga, omkr. 1 a 1½ fot höga; fordras lös, närande jordmän och varma ställen. Fröet utsätts i driftbänk.		
Andropogon; <i>Skägg-gräs,</i> (<i>Gramineæ</i>)		
725. „ argenteum, (<i>Erianthus sac-</i> <i>charoides; Saccharum ar-</i> <i>gentium</i>) silverbäddad . . . — 10 — —		
Vacker gräsväxt; öfvervin- tras vid + 15° C.		
Aralia; <i>Aralia,</i> (<i>Aralieæ</i>)		
726. „ japonica — 50 — —		
727. „ racemosa — 30 — —		
728. „ spinosa — 40 — — Alla tre utm. bladvy., som un- der beteckn. uthärdas vintern på kalljord.		
Artemisia; <i>Gråbo;</i> <i>Malört,</i> (<i>Eupatorineæ</i>)		
729. „ annua, ettårig — 5 — 30		
730. „ argentea, silverbladig . . . — 25 — —		
731. „ gracilis (sp. S:t Petersburg) ettårig, vacker — 10 — —		
732. „ Stelleriana, silverbäddig . . . — 30 — — A. annua & gracilis blifv under sommaren omkring 6 fot höga och hafva ett pyrami- dalt växtsätt. De öfriga blif- va lägre och kunna användas till markerade garneringar o. s. v. samt böra öfverv. vid + 5 a 6° C. och fortplanternas genom sticklingar. Fröet af alla sorterna sås i krukor el- ler bänk.		
Atriplex; <i>Mell; Molla,</i> (<i>Atri-</i> <i>pliceæ</i>)		
733. „ hortensis — 5 — 10 En 6 a 8 fot hög växt med mörkröda blad, som fortplan- tar sig genom sjelfsädd.		
Balsamita; <i>Frunynta,</i> (<i>Co-</i> <i>rymatifereæ</i>)		
734. „ grandiflora, storblommig — 12 — — Storbladig, 6 fot hög växt med		
	gula, kokardlikla blommor; tål vintern ute.	tål
Bambusa; <i>Bamburör,</i> (<i>Gra-</i> <i>mineæ</i>)		
735. „ Metake — 30 — — Vacker, 3 a 5 fot hög gräs- växt; öfvervintr. vid + 5° C.		
Barbaria; (<i>Cruciferæ</i>)		
736. „ vulgaris fol. var. . . . — 8 — 40 En tvåårig växt, som första året den utsås på kalljord är rätt vacker till infattn. Blom- mar och sätter frö andra året, men blir då oduglig som in- fattningsväxt, och bör derföre sås hvarje år.		
Beta; <i>Beta; Mangold,</i> (<i>Atri-</i> <i>pliceæ</i>)		
737. „ vulgaris var. <i>brasiliensis</i> . — 5 — 8 Behandlas som vanl. rödbe- tor. Bladstjälkar varierar i flera färger. Kan om hösten imp. i krukor och anv. till de- korationer i boningsrum och kalla växthus.		
Bocconia; <i>Bockonia,</i> (<i>Papa-</i> <i>veraceæ</i>)		
738. „ cordata — 20 — —		
739. „ frutescens — 15 — —		
740. „ japonica — 20 — — Alla tre utmärkta växter med prydliga, eburu smä blommor; öfverv. frostfritt.		
Boehmeria; <i>Bömeria,</i> (<i>Urti-</i> <i>caceæ</i>)		
741. „ macrophylla, storbladig . — 20 — — Vacker blad. Öfverv. vid + 12 a 15° C.		
Bonapartia; <i>Bonapartia,</i> (<i>Asphodelæe</i>)		
742. „ juncea (<i>Agave geminiflora</i>) — 30 — — Statlig dekorationsväxt med långa, smala blad.		
Brassica; <i>Kål,</i> (<i>Cruciferæ</i>)		
743. „ oleracea variegata, bland. — 8 — 20 Palmträd. jätte- och fjäder- kål, användas till prydnads- växter för sina vackra bro- kiga blad.		
Canna; <i>Blomsterrör,</i> (<i>Can-</i> <i>naceæ</i>)		
744. „ Anneii, m. skinande blad. — 8 — 30		
745. „ rubra — 12 — 80 Bladen mörkt grågröna med brun metallglans.		
746. „ Anneii superba — 10 — 50 Bladen lifligt gröna; blommor na ljust skarlanröda, med gula punkter och streck.		
747. „ bicolor de Java — 8 — 30		
748. „ Bonetii major — 10 — 50 Mycket hög; bladen blågröna, med bläktig metallglans.		
749. „ Bonetii semperflorens, v. — 12 — 80 Bladen mörkgröna, med stark metallglans.		

	å Port. Ort.		å Port. Ort.
	Rmt Rd. ö. Rd. ö.		Rmt Rd. ö. Rd. ö.
750. <i>Canna, coccinea vera</i>	— 5 — 20		
751. " <i>compacta elegantissima</i>	— 8 — 40		
752. " <i>discolor floribunda</i>	— 12 — 80		
Bladen bruna; blomna skar-lakanröda, vackra.			
753. " <i>discolor violacea</i>	— 40 —		
754. " <i>elegantissima rustica</i>	— 30 —		
Bladen gröna, med fina, mörk-bruna kanter.			
755. " <i>floribunda</i>	— 8 — 30		
756. " <i>heliconiaefolia</i>	— 10 — 50		
757. " <i>Hosteii</i>	— 12 — 80		
Eu af de vackraste arter af detta rika släkte.			
758. " <i>indica</i>	— 5 — 12		
759. " <i>superba</i>	— 15 —		
760. " <i>lutea picta</i>	— 5 — 20		
761. " <i>maculata</i> , v.	— 20 —		
762. " <i>museifolia hybrida</i> , v.	— 8 — 40		
763. " <i>nepalense</i>	— 8 — 30		
764. " <i>grandiflora</i>	— 10 — 50		
765. " <i>patens</i>	— 8 — 30		
766. " <i>purpurea hybrida</i>	— 10 — 60		
767. " <i>spectabilis</i>	— 10 — 50		
768. " <i>Sellowii</i>	— 8 — 30		
Myccket blomsterrik; blom-morna skarlanröda.			
769. " <i>speciosa</i>	— 5 — 20		
770. " <i>spectabilis</i>	— 5 — 20		
771. " <i>Warscewiczii</i>	— 5 — 20		
772. " <i>Warscewiczoides nobilis</i>	— 20 —		
Breda, brunaktiga blad.			
25 sorter, . . . rdr 2,80.			
12 vackra sorter, . . . 1 —			
773. " alla sorter blandade . . . — 15 — 50			
Cannarterna hära till de vackraste och tacksammaste blad-växter vi ega och utmärka sig dessutom äfven för rätt vackra blommor. De äro mycket lättskötta och kunna öfverv. vid + 10 a 12° C.			
Cannabis; Hampa, (Urticaceæ)			
774. " <i>sativus var. gigantea</i>	— 5 — 8		
Ettårig, 6 a 8 fot hög, vacker bladväxt.			
Centaurea; Klint, Compositæ-Cynareae)			
775. " <i>candidissima</i>	— 25 —		
776. " <i>gymnacarpa</i>	— 15 —		
Båda arterna hafta rent silf-verhyta, vackert formadeblad. Att på en fin gräsmatta hafta små, runda sängar, planterade med endast dessa växter, är utmärkt vackert.			
Ceratium; Cerast, (Alsinæ)			
777. " <i>Biebersteinii</i>	— 20 —		
778. " <i>tomentosum</i>	— 25 —		
Flerår. låga, krypande, silf-verhyta växter, till bildande, at gärlanger, infattn. o. s. v.			
Tåla vintern ute,			
Chamæpeunse, (Cichoraceæ)			
779. " <i>Cassebonæ</i>	— 12 — 80		
780. " <i>diacantha</i>	— 50 —		
Tvemne tistolartade växter,			

hvars lidet äro ställda rosett-ligt och prydda med systematiskt sittande, livaktiga taggar. Öfverv. i temp. hus och uppl. om vären i god jord.

Chenopodium; Gåsfot, (Atripliceeæ)

781. " <i>atriplicis</i>	— 5 — 60
Ettårig, 1½ fot hög, rödblädig växt. Utsås i bänk och utplanteras sedan.	
Cineraria; Askört, (Senecionideæ)	
782. " <i>candidissima</i>	— 25 —
783. " <i>maritima</i> (Senecio cineraria)	— 8 — 40
Båda utm. för vackert forma-de gråhvitा blad; särdeles an-vändbara i blad- och blomstergrupper. Öfverv. i temp. hus.	
Entelea; Entelea, (Tiliaceæ)	
784. " <i>arborescens</i> , trädartad . . . — 30 —	
Har stora, ljusgröna, vackra blad; öfverv. i temp. hus; fortpl. genom sticklingar.	
Erianthus; Uligräs, (Gramineæ)	
785. " <i>Ravennæ</i>	— 10 — 80
Ett flerårigt, storväxt, vackert gräs med prydliga blomvippor. Betäck. und. sträng köld.	



Eucalyptus globulus.

à Port. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

Eucalyptus; *Praktmössa,*
(Myrtaceæ)


786. "	gigantea	— 20 —
787. "	globulus	— 25 —
788. "	robusta	— 20 —

Eucalyptusarterna blifva i sitt hemland, Australien, ofta över 400 fot höga och räknas derföre till verldens största träd. Ofvann. arter, synnerligen E. glob. kunnna med fördel användas i stora bladväxtgrupper, der de naturl. ställas i bakgrunden eller midten, allt-eftersom gruppen är belägen. Ofverv. i temp. växthus. Tåla ej att beskäras. Se afbildn.

Ferdinanda; (Senecionideæ.)

789. "	eminens (Cosmophyllum caliegolium)	— 25 —
	Uppnär betydlig höjd; bladen stora, ljusgröna, välvaktande	

Ofverv. i temp. växthus.



Foucroya rigida.

Foucroya; (Asphodeloideæ)

790. "	rigida	— 40 —
	Praktig dekorationsväxt med långa, tjocka, agavolika blad.	

Ofverv. vid vanl. boningsväxter. Se afbildningen.

Gunnera; (Urticaceæ)

791. "	seabra	— 20 —
	Stätilig dekorationsväxt med stora, antikt formade blad.	

Planteras bäst i korgar, hylka om sommaren nedslänktas i lös, fet jord och om hösten åter upptagas för att frost-fritt förvaras.

Gynnerium; *Pampasgräs;*
Prairiegräs, (Gramineæ)

792. "	argenteum	— 15 —
793. "	" fol. var.	— 25 —
794. "	" kermesinum	— 25 —
795. "	" violaceum	— 25 —

Obestridligt de stätiligaste och vackraste af alla bekanta grässlag. De tre sistn. äro nya, ytterst praktif. Kunnna behandlas som Gunnera.

Helianthus; *Solsros,* (Sene-cionideæ)

796. "	argyrophyllus, silfverbladig . . .	— 5 — 30
797. "	macrophyllus gigant., stor . . .	— 8 — 40

Ettåriga växter. Den sista.

är 10 a 15 fot hög och har

à Port. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

ofantligt stora blommor. Fröer sås direkt på fritt land.

Heracleum; *Björnflocka;*

(Herkulesört (Umbelliferæ)

798. "	eminens	— 15 —
799. "	giganteum	— 5 —

Jättelik växter med ofantligt stora, antika blad och vilda, hyvta blomflockar. Blifva ofta 10 a 12 fot höga. Fröet liggar ofta ett år i jorden innan det gror.

Holcus; *Hirs,* (Gramineæ)

800. "	saccharatus; Sockerhirs . . .	— 5 — 8
	5 a 6 fot hög. Vacker i bladgrupper. Behandl. som mays; se vidare ekonomiväxter.	

Inula; *Ålandssrot,* (Asteroidæ)

801. "	Helenium, äkta	— 10 —
	Flerårig, 6 a 8 fot hög växt med stora ljusgröna blad och gula blommor.	

Knautia; (Dipsacæ)

802. "	montana	— 30 —
	Flerårig, 10 a 12 fot hög växt med gula skabiosalika blommor. Vacker såsom midtstående i bladgrupper.	

Lavatera; *Poppelros,* (Malvaceæ)

803. "	arborea, trädartad	— 10 —
	6 a 12 fot hög växt med talarika röda blommor; ofverv. fr.	

Melianthus; *Honungsblomster,* (Rutaceæ)

804. "	major, stor	— 10 — 80
805. "	minor, mindre	— 20 —

Vackra bladväxter, som under sommaren kunna uptr. i det fria; ofverv. vid + 6 a 8° C. Fordra kraftig jord och riklig vattning.

Nicotiana; *Tobak,* (Solanaceæ)

806. "	glauca	— 8 — 40
807. "	glutinosa	— 10 — 60
808. "	macrophylla var. gigantea . . .	— 8 — 40
809. "	sanguinea	— 5 — 20
810. "	Tabacum var. Salonicum . . .	— 5 — 8

811. "	" purpurea grandiflora . . .	— 5 — 20
	Alla 6 sorterna, 35 öre.	

Alla sorterna är ettåriga och taga sig väl ut bland bladgrupper; synnerligen utm. är o macroph. och purp. grandifl. Fröet utsätts i bänk och plantornas utsättas sedan på fritt land, i lös, god, kraftig jordmän. Se vidare ekonomiväxter.

Onopordon; *Ulltistel,* (Cynaro-naceæ)

812. "	aculea	— 20 —
813. "	arabicum	— 10 — 80
814. "	virens var. tauricum . . .	— 5 — 20

Höga, tistellikväxter, som är väl passande att pl. ensamt, eller nägra tillsammans, på fina gräsmattor. Alla är 2-åriga och uthårda vintern.

	à Port. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.	à Port. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.
Perilla; Perilla, (Labiateæ)				
815. " arguta (nankinensis)	— 10 —			
Ettärig, 1½ fot hög växt, med bruna, metallglänsande blad. Fröet säs i drifbänk.				
Rheum; Rhabarber, (Poly-				
goneæ)				
816. " Emodi (australe)	— 5 —	6		
817. " crassinervium	— 10 —			
818. " hybridum	— 10 —			
819. " oleraceum	— 10 —			
820. " undulatum	— 5 —	6		
821. " Queen Victoria.	— 5 —	10		
Alla 6 sorterna, 40 öre.				
Alla särdeles vackra, i synnerhet som fristående eller gruppvis förenade på vackra gräsmattor.				
Ricinus; Underträd, (Eu-				
phorbiateæ)				
822. " africanus	— 5 —	20		
823. " bourboniensis arboreus . .	— 8 —	40		
824. " communis	— 5 —	10		
825. " minor	— 5 —	10		
826. " purpureus, major	— 5 —	20		
827. " minor	— 5 —	20		
828. " roseus, ny, rosenröd	— 30 —			
829. " sanguineus	— 5 —	20		
830. " rubricaulis	— 15 —			
831. " minor	— 10 —	50		
832. " tricolor	— 5 —	20		
833. " sp. fr. Philippinerna	— 20 —			
Alla 12 sorterna, 1 rdr.				
Alla arterna äro ettäriga och blifva 5 a 8 fot höga. Böra utsås i Mars eller början af April. Odla i bänk, växthus eller boningsrum, hvarest de småning. Väntas vid den ytre luften. Utpl. i Juni på varma ställen i fet jord. Höra till de tacksammaste och stäthiga bladv. för fritt land.				
Rumex; Syra, (Polygoneæ)				
834. " vessicarius	— 8 —	50		
Ettärig, vacker dekorationsväxt; fröet säs i bänk eller kruka.				
Salvia; Salvia, (Labiateæ)				
835. " argentea (S. atropurpurea atlantica; candidissima)	— 5 —	30		
Vacker; har stora hylta blad; öfverv. frostfritt.				
Selinum, (Umbelliferæ)				
836. " decipiens (Melanoselinum)	— 20 —			
En präktig, palmlik växt. Öfverv. vid + 5° C. Fröet gror stundom först ett år efter såningen.				
Silphium, (Senecionedieæ)				
837. " perfoliatum	— 8 —	50		
838. " therebinthaceum	— 12 —	80		
Flerärliga, 8 a 10 fot höga växter med rikt löfverk och gula blommor. Passa förtr. såväl i stora bladgrupper, som i kantern af buskpartier. Täta yntern ute.				
Solanum; Trollbär, (Solanaceæ)				
839. " atropurpureum	— 8 —	40		
840. " Balbisii (S. viscosum; enflatum; decurrens).	— 8 —	40		
841. " Canariense	— 10 —			
842. " citrullifolium, (Violaceum)	— 5 —	20		
843. " corniculum	— 12 —	80		
844. " eriitrichum	— 12 —			
845. " Fontanesianum	— 12 —			
846. " giganteum, (niveum)	— 15 —			
847. " laciniatum, (pinnatifidum) . .	— 8 —	40		
848. " marginatum	— 15 —			
849. " reclinatum	— 12 —	80		
850. " robustum, praktfull	— 20 —			
Obeströdigt vackra i släktet.				
" sisymbriifolium (Balbisii).				
851. " verbascofifolium (bahamense) .	— 30 —			
12 sorter, rdr 1,35.				
De här anförda sorterna af detta intressanta och högst talrika släkte utm. sig alla, såväl för sitt bladverk och sitt egendomliga växtsätt, som för sina prydliga blommor. I bladväxtsamlingar äro de af stor nyta. De flesta af dessa sortter knnna fortl. gen. stekl. och öfverv. vid vanlig kammarvärme. På fritt land fordras de varma, skyddade ställen och god jord.				
Sorghum, se Holeus.				
Stachys; Stinknässa, (Labiateæ)				
852. " lanata	— 20 —			
Flerärlig frilandsväxt med hvitaktiga blad; andvändbar till infatn.; blomstängerne böra afskäras.				
Teleckia; Buphtalmum;				
Oxöga, (Corymbiferæ)				
853. " cordifolia, hjertbladig . . .	— 8 —			
854. " speciosa, vacker	— 10 —			
Flerärliga, 6 a 8 fot höga med stora, ljusgröna blad och gula blommor.				
Wigandia; Vigandia, (Convolvulaceæ)				
855. " caracassana	— 30 —			
856. " Vigieria	— 30 —			
Praktf. bladv. Fröet säs i krukor och böckes föga eller allsintet. Planteras uppdragas i bänk; öfverv. vid + 12 a 15° C. nära glaset.				
Zea; Turkiskt hweete; Mays,				
(Gramineæ)				
857. " Mays var. caraguana	— 10 —	15		
858. " fol. var. (Z. japonica) . .	— 10 —	15		
859. " gracilima, <i>Miniatyr-</i>				
<i>Mays</i> , utmärkt vacker	— 35 —			
Mays användes allmänt såväl i större som mindre bladgrupper. Den första, uppnår en höjd af 6 a 7 fot; den sistn. deremot endast omkring 2 fot,				

å Port. Ort.
Rmt Rd. ö. Rd. ö.

men är utm. för sina vackra,
hviträndiga blad. Fröet utsäs
någorlunda tidigt i kruka,
hvärefter pl. omskolas och hvär-
das under glas i en ljum bänk,
till dess de skola planteras
på fritt land.

å Port. Ort.
Rmt Rd. ö. Rd. ö.

Då urvalet oinskränkt an-
förtros åt oss, lemnas:

50 sorter bladväxter,	7,50
25 " "	4 —
12 " "	3 —

III. Dekorationsgräs:

(Gramineæ.)

Nedannämnde gräsarter kunna användas i blomstergrupper, som garneringsväxter, som fristående
på gräspaneler, i buketter, o. s. v. De flesta fordra en något fuktig, god jordmän och mot den star-
kaste solhettan skyddade stället.

å Port. Ort.
Rmt Rd. ö. Rd. ö.

A. Ettåriga Gräsarter:

Agrostis; Hven,

860. " dulcis	— 5 — 30
861. " nebula	— 10 — 70
862. " pulchella	— 5 — 30

Till garnering, plantering i
småkrukor o. s. v.

Anthoxanthum; Vårbrodd,

863. " gracilis	— 5 — 20
---------------------------	----------

Vackert garneringsgräs.

Aristida; Hårgräs,

864. " coerulescens	— 20 — —
-------------------------------	----------

Avena; Hafre,

865. " sterilis, intressant gräs.	— 5 — 20
---	----------

Brachypodium; Axsvingel,

866. " distachyrum	— 10 — 75
------------------------------	-----------

867. " platystachyrum	— 8 — 50
---------------------------------	----------

Briza; Darrgräs.

868. " geniculata	— 5 — 30
-----------------------------	----------

869. " maxima	— 5 — 15
-------------------------	----------

870. " minima	— 5 — 20
-------------------------	----------

Alla sörterna vackra i buketter.

Brizopyrum; Darrax.

871. " siculum	— 5 — 20
--------------------------	----------

Vacker till infattningar.

Bromus; Losta,

872. " brizaformis	— 5 — 20
------------------------------	----------

873. " lanuginosus	— 8 — 50
------------------------------	----------

874. " patulus	— 8 — 25
--------------------------	----------

875. " purpureus	— 5 — 20
----------------------------	----------

876. " rubens	— 10 — —
-------------------------	----------

Allesamman utm. vackra i bu-

ketter, o. s. v.

Chloris; Strågräs,

877. " cucullata	— 8 — 40
----------------------------	----------

878. " elegans	— 8 — 40
--------------------------	----------

879. " gracilis	— 10 — 75
---------------------------	-----------

880. " polystachya	— 10 — 75
------------------------------	-----------

881. " submutica	— 5 — 30
----------------------------	----------

Vackra och egendouliga gräs-

arter; för fröts groning er-

fordras mycken värme och fuk-

tighet.

Chrysurus; Guldsvans,

882. " cynosuroides (Cynosurus aur.)	— 5 — 25
--------------------------------------	----------

Coix; Tårgräs,

883. " chinensis	— 8 — 40
----------------------------	----------

å Port. Ort.
Rmt Rd. ö. Rd. ö.

884. Coix, exaltata	— 5 — 20
-------------------------------	----------

885. " Laeryma, Jobs tårar	— 5 — 20
--------------------------------------	----------

Digitaria; Fingergräs,

886. " aegyptiaca	— 15 — —
-----------------------------	----------

887. " fimbriata	— 5 — 30
----------------------------	----------

Eleusine; Eleusingräs,

888. " coracana (Cynosurus)	— 5 — 30
---------------------------------------	----------

889. " indica (Chloris repens; Cy- nosurus pectinatus)	— 5 — 35
---	----------

890. " oligostachya	— 5 — 30
-------------------------------	----------

891. " Toussia	— 5 — 30
--------------------------	----------

Eragrostis; Kärleksgräs,

892. " amabilis	— 20 — —
---------------------------	----------

893. " cylindrica (Poa cylindr.)	— 10 — 75
--	-----------

894. " elegans	— 5 — 10
--------------------------	----------

895. " namaquensis	— 10 — 75
------------------------------	-----------

896. " nigrians	— 20 — —
---------------------------	----------

897. " plumosa (Poa pl.; decipiens)	— 5 — 30
---	----------

898. " Purshii (Eragr. diandra)	— 8 — 50
---	----------

899. " tephrosanthes	— 10 — 75
--------------------------------	-----------

Utm. fina, vackra gräs, som
äfven kunna odlas i krukor
och anv. till prydnad på blom-
sterbord o. s. v.

Hordeum; Korn,

900. " jubatum	— 5 — 30
--------------------------	----------

Lagurus; Harsvans,

901. " ovatus	— 5 — 20
-------------------------	----------

902. " compactus	— 8 — 50
----------------------------	----------

Panicum; Åkerhirs,

903. " altissimum	— 8 — 40
-----------------------------	----------

904. " aspernum	— 5 — 30
---------------------------	----------

905. " colonum	— 5 — 30
--------------------------	----------

906. " cruscarvi	— 5 — 30
----------------------------	----------

907. " italicum	— 5 — —
---------------------------	---------

908. " oryzoides	— 8 — —
----------------------------	---------

De båda förstn. arterna äro

högväxta och passa väl till

grupper. Öfriga arter, se blad-

& ekonomiväxter.

Penisetum; Fjädergräs,

909. " longistylum	— 5 — 30
------------------------------	----------

910. " Piptatherum Thomasii	— 5 — 25
---------------------------------------	----------

	à Port. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.	à Port. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.
Poa; Gröe,				
911. " pilosa	— 10 —			
912. " salina	— 10 —	75		
Polypogon; Polypogongräs,				
913. " interruptus	— 10 —			
914. " monspeliensis	— 8 —	50		
Båda sorterna särdeles vackra till infattningar.				
Setaria; Setaria,				
915. " macrochaeta	— 5 —	20		
916. " persica	— 8 —	40		
Vackra till större grupper.				
Sorghum saccharatum (Hol- eus saccharat.) se bladväxter & ekonomiväxter.				
Zea, Mays, se blad- & ekono- miväxter.				
B. Fleråriga gräsarter:				
Agrostis; Hven,				
917. " argentea	— 10 —	50		
Aira; Tåtel,				
918. " coerulea fol. var.; Blåtåtel — 10 —				
Andropogon; Skägg-gräs, " argenteum; se bladväxter.				
919. " giganteus	— 12 —			
920. " provincialis	— 15 —			
Arundo; Rör,				
921. " Donax; Jätterör.	— 25 —			
922. " festucoides aurea var.	— 20 —			
Den förstnämnda uppnår, om den planteras fritt i ett kallt växthus, 14 a 18 fot höjd.				
Bambusa Metake, se bladv.				
Briza; Darrgräs,				
923. " media, vacker i buketter. — 5 —	10			
Bromus; Losta,				
924. " Gussonii	— 5 —	20		
925. " longiflorus, 4 fot hög	— 5 —	35		
926. " maximus	— 5 —	20		
927. " pendulinus	— 10 —	70		
928. " secalinus giganteus	— 5 —	10		
Högväxta gräsarter, hvars blomvippor är särdeles vack- ra i buketter.				
Ceratochloa pendula, se Bro- mus pendulinus.				
Cyperus; Cypergräs,				
929. " Paramatta	— 8 —	50		
Diplachne; Diplachne,				
930. " fascicularis (Leptochloa po- lystachya)	— 8 —	40		
Elymus; Elm,				
931. " arenarius; Sandelm.	— 5 —	10		
932. " canadensis	— 5 —	15		
933. " Caput Medusæ	— 8 —	50		
934. " erinitus	— 10 —			
935. " giganteus	— 5 —	30		
936. " glaucifolius	— 8 —	50		
937. " Hystric	— 8 —	40		
Storväxta gräs till grupper.	12			
Erianthus; Ullgräs,				
" Ravennae; se bladväxter.				
938. " violascens	— 15 —			
Imposanta gräsarter; betäckas under stark frost.				
Festuca; Svingel,				
939. " decolorans, hög och vacker — 10 —				
940. " Fenæ, prydlig	— 15 —			
941. " glauca, vackra	— 10 —	60		
942. " heterophylla, smalbladig . . .	— 5 —	10		
943. " stipoides	— 5 —	15		
944. " viridis	— 5 —	30		
Vackra gräsarter. De trenne sistnämnda egna sig särdeles väl till infattningar, säs på kalljord.				
Gynnerium, se bladväxter.				
Lasiagrostis argenteus. — 8 —				
Särdeles vacker; har silverb- lvita blomvippor.				
Melica; Perlgräs,				
946. " altissima, silvärhvit	— 25 —			
947. " exasperata		5 —	30	
948. " pyramidalis		12 —		
Utm. vackra i buketter o. s. v.				
Molinia, se Aira.				
Panicum; Åkerhirs,				
949. " palmifolium	— 25 —			
950. " plicatum	— 15 —			
951. " sulcatum	— 10 —	75		
Utm. sköna, tropiska gräsarter med breda, veckade, palmika blad. Odlas i krukor och öf- verv. vid + 10 a 15° C. För- träffl. till dekorering på blom- sterbord o. s. v. Öfriga, se blad- & ekonomiväxter.				
Paspalum; Paspalum,				
952. " elegans		8 —		
Öfverv. som förestående; kan utpl. i det fria under somma- ren.				
Poa; Gröe,				
953. " cenisia, prydlig		— 10 —		
954. " concinna, utmärkt.		— 10 —		
955. " trivialis fol. arg. var.		— 20 —		
Fina gräsarter; den sistn. är mycket omtyckt till garnering.				
Stipa; Fjädergräs,				
956. " capillata		— 5 —	25	
957. " filiculmis		— 15 —		
958. " gigantea		— 5 —	30	
959. " pennata		— 8 —	50	
960. " splendens		— 10 —	75	
961. " tortilis		— 8 —	50	
Alla stipa-arterna hörta till de vackraste grässlagen.				
Då urvalet oinskränkt an- förtros åt oss, lemnas:				
25 sorter ettåriga gräsarter			2 —	
12 " fleråriga "			1,25	
25 " fleråriga "			2 —	
12 " " "			1,25	

II. Slingerväxter:

Af nedannämnde växter böra alla de, hvarom ej annorlunda föreskrifves, först utsäs i kruka eller drifbänk och i Juni utplaateras på de för dem afsedda platserna på kalljord.

	a Port.	Ort	Rmt Rd.	ö.	Rd. ö.	a Port.	Ort	Rmt Rd.	ö.	Rd. ö.
Abobra; <i>Spaltrefva, (Cucurbitaceæ.)</i>										
962. „ <i>viridiflora</i>	10	— 60				974. <i>Clematis, coerulea var. Sopphie,</i> stora ljusblå blmr.	15	—		
Bladen glänsande, mörkgröna, djupt inskurna; blomerna gröna, välluktande; frukterna röda. Passar till bekl. af mindre spalier, flätverk o. s. v. Öfvervid + 6 a 8° C.						975. „ <i>cylindrica</i> , klockformiga, ljusblå blommor	20	—		
Ampelopsis; <i>Jungfruvin, Vildvin, (Vitiferæ.)</i>						976. „ <i>Flamimula</i> , 4 à 6 fot hög m. talrika, hvita blommor	25	—		
963. „ <i>hederacea</i>	5	— 15				977. „ <i>Standishii</i> , stora mörkblå blommor	40	—		
Hastigt växande, omtyckt slingerväxt. Praktig till bekl. af lusthus, espalier, murar o. s. v. Täl vintern och fortpl. genom stickningar.						978. „ <i>virginiana</i> , talrika, hvita, välluktande blommor	10	—	75	
Bignonia, Tecoma; <i>Trumpetblomster, (Bignoniaceæ.)</i>						979. „ <i>Vitalba</i> , bekant; har talrika hvita blommor	15	—		
964. „ <i>radicans</i>	20	—				980. „ <i>Viticella</i> , klockformiga, blå eller violetta blommor	15	—		
Snabbwäxande med praktfulla, orangegula blmr. Uthållar vintern i södra Sverige och bör planteras vid en mot solsidan liggande mur. I kallt växt- husr bär den pl. fritt, för att trivvas väl.						Alla 10 sorterna, rdr 1,75.				
Bryonia; <i>Hundrofva, (Cucurbitaceæ.)</i>						Samtliga dessa växter är verkliggen praktfulla, passande till beklädnad af pelare, murar, plank, lusthus o. s. v. De förstn. i sorterna och Standis hii bärta för säkerhets skull öfver frostfritt; de öförriga fåla vintern. Fröet liggar stundom öfver ett år i jorden innan det gror.				
965. „ <i>alba</i>	5	— 30				Cobaea, (Bignoniaceæ)				
Bekant slingerv. Förräffl. att beklädda större föremål. Täl vintern; fortpl. ofta genom utfallande frö.						981. „ <i>scandens</i>	15	—		
Bryonopsis; <i>(Cucurbitaceæ.)</i>						Hastigt växande, vacker med klockform, stora, viol. blmr. Odias i temp. växthus, men kan under sommaren uppl. i det fria.				
966. „ <i>erythrocarpa</i>	15	—				Coccinia; <i>Rödrefva, (Cucurbitaceæ)</i>				
Vacker m. skarlakanröda frukter, af ett körsbärsl. storlek.						982. „ <i>indica</i> (Bryonia grandis)	15	—		
Cajophora; <i>Packelbörbare, (Loasaceæ.)</i>						983. „ <i>Mac Kennii</i>	35	—		
967. „ <i>lateritia</i> (Loasa lat.)	20	—				Hastigt växande, till bekl. af murar och andra större föremål utm. väl passande växter m. mörkgröna blad och hvita blmr. Förökas lätt med stickl., hvilka öfver i växthus eller boningsrum. Den sistn. har röda hvitstrimmiga frukter.				
968. „ <i>Herbertii</i>	20	—				Cucumis; <i>Gurka, (Cucurbitaceæ)</i>				
Ettåriga medelhöga slingerv. m. märkvärdiga orange- eller skarlakanröda blmr.						984. „ <i>grossularia</i>	15	—		
Calampelis, (Bignoniaceæ.)						985. „ <i>prophetarum</i> , <i>Prophetgurka</i>	15	—		
969. „ <i>scaber</i>	8	—				Ettåriga, gurkartade växter.				
Praktf. skarlakanröda blmr. Passar till bekl. af mindre espalier, korgar o. s. v. Förvaras torr öfver vintern.						Cucurbita; <i>Pumpa; Gräskar; Kurbits, (Cucurbitaceæ)</i>				
Celastrus; <i>Celaster, (Celastrinæ.)</i>						986. „ <i>Anguriepumpa</i>	10	—	85	
970. „ <i>scandens</i>	15	—				987. „ <i>Courge goufré</i>	15	—		
Trädartad växt; användbar till beklädnad af pelare, o. s. v. Täl vintern och kan förökas genom affäggare.						988. „ <i>gul jätte-melonpumpa</i>	10	—		
Clematis; <i>Skogsrefva, (Ranunculaceæ.)</i>						989. „ <i>Herkulesklubba</i>	10	—		
971. „ <i>aristata</i> , talr. hvita blmr.	20	—				990. „ <i>Centnerpumpa</i>	10	—		
972. „ <i>cirrhosa</i> , vällukt., hvita bl.	8	— 50				991. „ <i>Flaskpumpa</i>	10	—		
973. „ <i>coerulea var. Helene</i> , stora, gulhvita blommor	30	—				992. „ <i>Apelsinpumpa</i>	10	—	30	

	ा Port.	Ort.	
Rmt	Rd. ö.	Rd. ö.	
997. Cucurbita Valparaisopumpa	— 10	— 30	
998. " digitata	— 15	— —	
999. " perennis	— 25	— —	
1000. " bländade sorter	— 5	— 8	
12 " 1 —			
Den sistn. täl vintern ute endast under god betäckning; se vidare bland köksväxterna, under rubriken gurkade växter.			
Cyclanthera; <i>Flikrefva,</i> (Cucurbitaceæ)			
1001. " <i>explodens</i>	— 10	— —	
1002. " <i>pedata</i>	— 5	— 25	
Ettåriga, mycket hastigtväxande m. vackert lövverk och intressanta frukter, af hvilka den förstn. vid hindrigaste befröning öppnar sig och väldigt utökstar kärnor. Säs på kall jord.			
Echinocystis, (Cucurbitaceæ)			
1003. " <i>lobata</i>	— 20	— —	
Utm. slingery, hva med man på kort tid kan öfverläcka lusthus, staket, murar o. s. v. Har femfingiga blad och talr. hvita, välvulkt. blmr. Fruktens är af ett duftäggs störlek. Fröet säs på kalljord.			
Glycine, (Papilionaceæ)			
1004. " <i>chinensis</i> , 4 st. frö	— 60	— —	
Praktfull trädartad slingery, för kalljord. Har ljusbla, utmärkt vackra, i rika klasar hängande blmr. Fordrar ett varmt, skyddadt läge, god jord och betäckning under vintern.			
Gronovia, (Cucurbitaceæ)			
1005. " <i>Humboldtii</i>	— 45	— —	
Vacker, mycket snabbt växande; prydligt löfverk och en mängd gula blmr.			
Ipomea; <i>Blomman för dagen,</i> (Convolvulaceæ)			
A. Ettåriga:			
1006. " <i>bona nox</i> (Calonyction speciosum)	— 5	— 20	
1007. " <i>coccinea</i> (Quamoclit cocc.)	— 5	— 20	
1008. " <i>hederacea atroviolacea</i> (Pharbitis; Ip. barbata)	— 5	— 30	
1009. " <i>superba</i>	— 5	— 30	
1010. " <i>limbata</i> (Pharbitis limb.)	— 5	— 20	
1011. " <i>mexicana</i> (violacea vera)	— 10	— —	
1012. " Nil (Pharb; Ip. coerulea; Ip. triloba; Pharb. scabra & punctata)	— 5	— 20	
" <i>purpurea</i> , se modeblomir.			
B. Fleråriga:			
1013. " <i>digitata</i> (Convolvulus dig.)			
purprröda blommor	— 10	— 75	
1014. " <i>ficifolia</i> (Ip. bonariensis; Conv. Hookerianum) praktfulla, purprröda blmr.	— 15	— —	
1015. " <i>Hardingii</i> , stora lilaf. bl.	— 25	— —	

	ा Port.	Ort.	
Rmt	Rd. ö.	Rd. ö.	
1016. Ipomea <i>Learii</i> (Pharbitis) purpröd	— 25	— —	
1017. " <i>tuberosa</i> (Conv. Batatas)	— 12	— —	
Gula, klocklikta blommor, 7 sorter ettåriga, 35 öre.			
5 " fleråriga, 80 öre.			
Alla dessa arter hafta praktfulla blmr, hvilka merändels öppna sig om mo gnarne och vara endast för en dag. I bona nox gör dock härifrån ett undantag enrä dess stora, praktf. blmr öppna sig mot aftonen.			
Alla de ettåriga arterna odlas ute, hvaremot de fleråriga, som härtämma från tropiska trakter, bora öfverv. vid + 10 a 15° C. och höra till växthusens skönaste slin-gerväxter.			
Lagenaria; <i>Flashkurbits,</i> (Cucurbitaceæ)			
1018. " <i>longissima</i>	— 10	— —	
Har flera fot länga, 1 fot tjocka frukter; fordrar fet jord och en varm plats.			
Lapageria; (Philesieæ)			
1019. " <i>rosea</i>	— 60	— —	
En af de vackraste rankv. för växthus eller boningsrum; har sköna, rosen- eller carmosinröda, hlijelika blmr.			
Lathyrus; <i>Ärtblomster,</i> (Leguminosæ)			
A. Ettåriga:			
1020. " <i>azureus</i> , blå	— 5	— 10	
1021. " <i>clymenum</i> , röd, hvit & blå	— 5	— 20	
1022. " <i>luteus</i> , gul	— 5	— 20	
1023. " <i>mauritanicus</i> (Napoleonicus)			
mörkröd	— 5	— 10	
" <i>odoratus</i> , se modeblmr.			
1024. " <i>speciosus</i> , röd	— 5	— 20	
1025. " <i>tingitanns</i> , mörkröd	— 5	— 8	
1026. " bländade	— 5	— 8	
B. Fleråriga:			
1027. " <i>grandiflorus</i> , röd, stor	— 10	— —	
1028. " <i>splendens</i> , lysande	— 12	— —	
1029. " <i>latifolius</i> , röd	— 5	— 25	
1030. " <i>albus</i> , hvit	— 10	— —	
1031. " <i>roseus</i> , rosenröd	— 8	— 40	
1032. " <i>splendens</i> , lysande	— 10	— 75	
1033. " bländade	— 8	— 50	
6 sorter ettåriga, 25 öre.			
6 fleråriga, 55 öre.			
Säväl de ett- som fleråriga sorterna är mycket vackra och tacksamma slingrar.			
Lophospermum; <i>Kamfrö,</i> (Scrophularineæ)			
1034. " <i>grandiflorum</i>	— 15	— —	
1035. " <i>Hendersonii</i>	— 10	— —	
1036. " <i>scandens</i>	— 20	— —	
Särdeles vackra blmr, som trifvis väl äfven i bonings. De köttiga rotknöllarne bira ej vattnas under vintern. Om			

- à Port. Ort.
Rmt Rd. ö. Rd. ö.
- vären kunna de ompl. i frisk
jord och begagnas till att be-
kläda mindre föremål.
- Maurandia; (Sorophulari-
næ)**
1037. " antirrhiniflora, blå m. hvitt — 15 —
1038. " Barclayana, violett . . . 15 —
1039. " Laceyana, bläcktig, ro-
senröd 20 —
1040. " purpurea grandifl., stor-
blimig, purpuröd, utmärkt — 20 —
1041. " semperflor. bläcktigt röd — 15 —
1042. " fl. alba, hvit 30 —
- Alla 6 sorterna, 1 rdr.
1043. " blandade 15 —
Dessa utm. nätt och prydl.
växter egena sig fört till
amplar, infattningsflätor,
blomstérkorgar, o. s. d. De äro
lätt att odla och blomma
mycket tacksamt. Öfverv.
i boningsrum eller tempor.
växthus.
- Melothria; (Cucurbitaceæ)**
1044. " cucumerina 20 —
1045. " pendula 30 —
Slinger. m. små, prydliga
svartgröna frukter och vackra
blad. Passa väl till bekl. af
höga törnrosstamar, hänn-
gande givlande o. s. v.
- Menispermum; (Menispermeæ)**
1046. " canadense 25 —
Vacker till bildande af löf-
salar, bekl. af väggar, plank
o. s. v. Täl vintern ut. Om
man utspänner stark mes-
singtråd i form af ett tält
och läter den hastigt växande
rankan löpa uppå trädarne,
så bildas ett utm. vackert,
grönskande tält.
- Momordica; Balsamgurka,
(Cucurbitaceæ)**
1047. " Balsamina 5 — 40
1848. " Charantia 5 — 40
Vackra, intressanta slinger.
för varma växthus och bo-
ningsrum; ha vackra skarla-
kanröda frukter.
- Mukia; (Cucurbitaceæ)**
1049. " scabrella 15 —
Praktig m. bjerntform. flikiga
blad och röda frukter.
- Periploca; (Asclepiadæ)**
1050. " græca 15 —
Trädärtad slingerv. för fritt
land.
- Phaeolus; Böna; (Legu-
minosæ.)**
1051. " multiflorus, rödblomm. . . . 5 — 5
1052. " bicolor, röd m. hvitt — 5 — 5
Fröet sås på kalljord.
- Pilogyne; Hårgriffel, (Cu-
curbitaceæ.)**
1053. " lucida, pr 2 st. frö 50 —
Utm. nätt till bekl. af små
espaler etc. Bladen mörka,
- à Port. Ort.
Rmt Rd. ö. Rd. ö.
- glinsande; frukterna små,
röda.
- Rhyncoecarpa; (Cucurbi-
taceæ.)**
1054. " dissecta 15 —
1055. " foetida 15 —
1056. " Gerardii 30 —
Smärra slinger. v. med inskur-
na, nätt blad och skarlakan-
röda frukter. Passa till små
flätsverk, korgar o. s. v.
- Scotanthus; Tubrefva; (Cu-
curbitaceæ.)**
1057. " tubiflorus 35 —
Praktfull; rikt löfwerk, vack-
ra, hvita blommor och små
skarlakanröda frukter.
- Syphanthus; Skälbloomster,
(Loasæ.)**
1058. " elegans (Grammatocarpus
vulobilis) 20 —
Vacker ettårig växt med skö-
na, underbart formade blom-
mor. Fordrar varma och lug-
na ställen på kalljord.
- Sicyos; Hårgurka; (Cucur-
bitaceæ.)**
1059. " angulata 5 — 20
Ettårig; avv. att bekl. större
föremål.
- Sicyosperma; Skärmrefva,
(Cucurbitaceæ.)**
1060. " gracile 15 —
Som föregående; bladen 3-ö-
flikiga; hvitaktiga blommor
och svarta frukter; försök
sig ofta genom sjelfsädd.
- Thladianta; Gulrefva; (Cu-
curbitaceæ.)**
1061. " dubia 50 —
Mycket praktf. slingerv. för
kalljord; har talrika gula nä-
got klocklikla blmr. Fordrar
god jord, varmt läge och löf-
betäckning under barfrost.
- Thunbergia; (Acanthaceæ.)**
1062. " alata, blekgul med svart — 10 —
1063. " " alba, hvit med svart — 10 —
1064. " " aurantiaca, guldgul m.
svart svalg 10 —
1065. " " Barkerii, rent hvit 10 —
1066. " " coccinea, skarlakanr. — 50 —
Praktf., för mindre espaler,
amplar och blomstérkorgar;
böra ej uppl. i det fria förr
än sommarvärmene är pålitlig
på lugna, skuggiga platser.
Den sistn. sorten är flerårig
och öfverv. vid + 15° C.
- Trichosanthes; Ormgurka,
(Cucurbitaceæ.)**
1067. " anguinea 10 —
1068. " colubrina vera 10 —
Odlas som drifgurkor; de små-
la, ornolika frukterna blifva
ofta 1 1/2 à 2 fot långa, se
köksväxter.

	à Port. Ort. Rmt Rd. ö. Rd. ö.	à Port. Ort. Rmt Rd. ö. Rd. ö.	
Tropæolum; Krasse; (Tropæoleæ.)			
1069. " canariense	20 — —	1098. Tropæolum majus nanum purpureum Cattles	10 — 75
1070. " Lobbianum Brillant	10 — 60	1099. " majus nanum spotted	8 — 50
1071. " Due de Vivence	— 10 — 75	1100. " Scherianum	5 — 25
1072. " Caroline Schmidt	— 10 — 75	1101. " Schillingii	5 — 25
1073. " coccineum multifl.	10 — 60	1102. " minus	5 — 30
1074. " flammula grandiflora	— 12 — —	1103. " coccineus 25 sorter Tropæolum rdr 2,10. 17 " T. lobbianum	8 — 50 1,90
1075. " geant des batailles	— 12 — —	14 " T. majus	— 75.
1076. " glabrum variegatum	— 20 — —	7 " T. " nanum	— 45.
1077. " glory, skarlakan	— 10 — 60	1104. " låga, blandade sorter	8 — 75
1078. " Hookerii	— 30 — —	Alla krassearterna frambringa under sommaren och hösten en otalig mängd lysande blmr, växa fort och är ej omvänta för väderleksförhållanden. Om man odar T. Lobb. i krukor och inställer dem i temp. hus, nära glaset, så blomma de flesta sorterna nästan hela vintern.	
1079. " Kotchianum multifl.	— 10 — 75		
1080. " Lili Schmidt.	— 8 — 50		
1081. " Mr Colmet	— 12 — —		
1082. " Napoleon III	— 15 — —		
1083. " Queen Victoria	— 15 — —		
1084. " Triomphe de Hyeres	— 12 — —		
1085. " " de Gand	— 12 — —		
1086. " " du Prado	— 15 — —		
1087. " " blandade	— 10 — 75		
1088. " majus. Spansk Krasse	— 5 — 4		
	Pr fl. rdr 2,50.		
1089. " atropurpureum	— 5 — 10		
1090. " coccineum	— 5 — 15		
1091. " Eduard Otto	— 8 — 50		
1092. " luteum, gul	— 5 — 20		
1093. " nanum atrococcineum	— 5 — 30		
1094. " " Beauty	— 5 — 30		
1095. " " Crystal Palace Gem.	— 5 — 30		
1096. " " King of the Tom Thumb	— 15 — —		
1097. " " King Theodore	— 8 — 40	Då urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:	
		50 sorter vackra slingerväxter	rdr 5,50
		25 " " " " "	3 —
		12 " " " " "	1,50
		12 " höga slingerväxter	1 —
		12 " medelhöga " " " " "	1,25
		12 " låga " " " " "	1,50

V. Ettåriga (Annuella) Blomsterväxter:

Fröet till de med en * betecknade sorterna bör utsås i krukor, drivbänk eller lädor. Då * står framför slägtnamnet, är meningen att alla arterna böra så behandlas. Planterna utplanteras sedan i slutet af Maj eller början af Juni på fritt land. Alla de övriga, obetecknade sorterna sås på kalljord så tidigt som möjligt och på de platser, hvareft de framdeles skola blomma.

	à Port. Ort. Rmt Rd. ö. Rd. ö.	à Port. Ort. Rmt Rd. ö. Rd. ö.	
* Abronia; (Nyctagineæ.)			
1108. " umbellata, med gult svalg	8 — 50	1113. Adonis Cupaniana, tidig	12 — 90
Välvaktande; kan användas till amplar, blomsterkorgar, m. m. Ar. omvänt för rätt och fuktigt väder.		Vackert, fint löfverk och skarlakanröda blommor.	
* Acroclinium; (Senecionideæ.)		Aethionéma; (Cruciferæ.)	
1109. " roseum, rosenröd	5 — 20	1114. Buxbaumii, lågv.; infattn.	5 — 50
1110. " fl. alba, hvit	— 5 — 30	* Ageratum; Lefverbalsam, (Eupatoriaceæ.)	
Vackra immorteller; fordra sol och en varm, sandbländad jordmånen.		1115. " mexicanum, blå	5 — 20
Adonis; Gossen i det gröna, (Ranunculaceæ.)		1116. " albifl. nanum, hvit, låg	10 — 50
1111. " aestivalis, tidig	5 — 8	1117. " " nanum, lågväxt	8 — 50
1112. " autumnalis, sen	5 — 8	Vackra för krukor och i grupper; fordra kraftig jord och mycket sol.	
		Agrostemma; Klätt; Åkerkrans, (Caryophylleæ.)	
		1118. coeli rosa, Himmelrosen	5 — 20

ù Port. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

1119. *Agrostemma coeli rosa fimbriata nana*, låg, vacker — 15 — 95
1120. „ *coeli rosa fl. pl.*, dubbel, utmärkt — 25 — 25
Små nättä växter m. vackra, röda & hyvta blmr. Fröet af den sistn. lemnar omkr. 6 a 10 % väl tyllda, sköna blmr.

* *Alonsoa*, (Scrophularineæ.)

1121. „ *incisifolia* var. *grandifl.* (Hemimeris). — 8 — 50
1122. „ *Warscewiczii* — 10 —
Vackra skarlakröda blmr. Kunna ifven odlas i kruka och öfverv. vid + 5 à 8° C. Utplanterade i det fria, lemnar de här sommaren en mängd blmr och få moget frö.

Althea; *Stockros*, (Malvaceæ.)

1123. „ *chinensis*, kinesisk, bladade — 10 — 1
Är egentligen fierärig; men blommar redan första året om den säs nägorlunda tidigt.

Amaranthus; *Röfsvans*, (Amarantaceæ.)

- * „ *bicolor* fol. atropurpureis, se bladväxter. — 5 — 10
1124. „ *caudatus* — 5 — 10
1125. „ *viridis*, grön — 5 — 10
1126. „ *cruentus*, mörk — 5 — 10
* „ *melanchol*, se bladväxter.
1127. „ *monstrosus* — 5 — 10
1128. „ *sanguineus*, blodröd — 5 — 10
* „ *tricolor*, se bladväxter.

Alla 5 sorterna, 20 öre.
Dessa egendoml. växter kunna alla användas äfven i bladgrupper. Fröet kan utsås om hösten.

Ammobium, (Senecioniææ.)

1129. „ *alatum* — 5 — 15
Eternell m. hvita blommor, som användes till buketter, kransar o. d. Blurna bura aftagas medan de ännu är halftprucken.

Ampherephis, (Eupatoriaceæ.)

1130. *intermedia*, gula blomm. — 8 — 50

* *Anagallis*; *Arve*, (Primulaceæ.)

1131. „ *coerulea*, blå — 10 —
1132. „ *latifolia*, blå — 5 — 15
1133. „ *grandiflora*, storblommig — 10 —
1134. „ *carnea*, kötfärgad — 10 —
1135. „ *coccinea*, skarlakan. — 10 —
1136. „ *coerulea*, blå — 10 —
1137. „ *cuprea* *sanguinea*, kopparfärgad, vacker. — 10 —
1138. „ *Eugenie*, blå — 10 —
1139. „ *lilacina*, gredelin — 10 —
1140. „ *Napoleon III*, brunröd — 10 —

Alla 10 sorterna, 80 öre.

ù Port. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

Allensamman, med undantag af de båda förstn., ärö hybrider af *A. collina* & *Monnelli*. De utmärka sig förtalrika, vackra blmr och ärö särdeles passande för rumssödling. Ömpl. om våren i god, lätt jord.

* *Anthemis*; *Åkerkulla*, (Senecioniææ.)

1141. „ *arabica* (*Cladanthus prolifera*) — 5 — 20
2 à 3 fot hög grupp- eller rabattväxt med gula, vackra blommor.

Antirrhinum majus, se mödebloommor.

* *Arctotis*; *Björnöra*, (Cynareae.)

1142. „ *breviscapa* — 8 — 65
Något trädartad m. vackra, gula blmr. Kan öfverv. inombus och förtpl. med stielkl. Utpl. om våren på soliga rabatter, i mager jord.

Argemone; *Tuggelallo*, (Papaveraceæ.)

1143. „ *ochroleuca*, gul — 8 — 60
1144. „ *platyceros grandifl.*, vit — 5 — 50
Omkr. 1 fot höga för rabatter anyständbara växter.

Artemisia, se bladväxter.

* *Asperula*; *Madra*, (Rubiaceæ.)

1145. „ *setosa* — 8 — 40
Praktig, länge blommmande, välvaktande gruppväxt m. blå blommor.

* *Aster*; *Aster*; *Stjärnbłomster*, (Asteroideæ.)

1146. „ *tanacetifolius* (*chrysanthemoides*; *Macheranthera tanacetifolia*) — 10 — 60

1147. „ *tenellus* (*Felicia*; *Kaulfussia ciliata*) — 5 — 30
Båda skilja sig betydligt från de vanliga, bland modeblommorna anfördra asterformerna; blomrna ärö violetta m. gul disk; passa till små grupper och infattningar.

Athanasia, (Senecioniææ.)

1148. „ *annua* (*Lonas inodora*) — 5 — 35
Blomrna guldgula; odlas jämte andra sommarbl. på grupper & rabatter.

Atriplex, se bladväxter.

Beria, (Senecioniææ.)

1149. „ *chrysostoma*, guldgul — 10 — 60
Passar till stora infattn. 8 à 12 tum hög, grenig m. pryd. blommor.

* *Bartonia*, (Loaseæ.)

1150. „ *aurea* — 5 — 15
Vacker, 1 à 2 fot hög dekorationsv. m. guldgula, af 5 orangef. fläckar prydda blmr. Ömtillig för starka regnskurar, hvarföre några ex. böra odlas i krukor.

	ù Port. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.
Beta, se bladväxter.		
* Bidens; Brunskära, (Senecionideæ).		
1151. " atrosanguinea (Dahlia Zimapani) 12 — —		
1 à 1½ fot hög m. vackra svartröda blommor; användbar för rabatter. Växten bildar rotknölar, som kunna överv. i sand, torrt och frostfritt samt om våren utpl.		
Blitum; Smultronspenat, (Chenopodiaceæ).		
1152. " capitatum. 5 — 25		
Denna växt är av värde endast för sina, i bladvinklarna sittande, smultronl. frukter.		
* Brachycome, (Asteroideæ.)		
1153. " iberidifolia, blå 8 — 60		
1154. " " alba grandifl., hvit 10 — 75		
1 à 1½ fot höga, till infattningar passande växter med cinerarieartiga blommor.		
* Brovallia; (Scrophularineæ.)		
1155. " Czerviajoffskyi. 10 — —		
1156. " demissa. 10 — —		
1157. " elata 10 — —		
Omkring 1 à 1½ fot höga, isynnerhet för krukodl. passande växter m. blå, inuti stundom gulaktiga blommor.		
* Cacalia, (Senecionideæ.)		
1158. " sonchifolia (Emilia sonchifolia) 5 — 35		
1159. " lutea, orangefärgad 5 — 35		
1½ à 2 fot höga, till grupper & rabatter passande växter, som även är vackra i buketter.		
Cajophora (Loasa), se slimgerväxter.		
* Calandrinia, (Portulacæ.)		
1160. " Buridgei 5 — 20		
1161. " grandiflora 8 — 40		
1162. " speciosa 5 — 55		
1163. " umbellata (Talinum; Portulaca prostrata) 8 — 50		
Ha fina, pyrdliga, roseonöda blmr. Den förstn. är synnerligen användbar på mycket soliga blomstergrupper. C. grandiflora & umbellata kunna med fördel odlas i bondesrum och öfverallt frostrfri.		
* Calceolaria; Toffelblomster, (Scrophularineæ.)		
" hybrida, se krukväxter.		
1164. " pinnata 20 — —		
1165. " seabiosafolia 10 — 80		
1166. " californica 8 — 40		
Variera mellan 1½ à 2½ fots höjd. Blmrna gula, talarika; vackra till grupper och rabatter.		

	ù Port. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.
Calendula; Ringblomster; Solsicka, (Cynareæ.)		
1167. " hybrida 5 — 15		
1168. " officinalis ranunculoides 5 — 8		
1169. " " superba 8 — 30		
1170. " pluvialis, Regnvisaren 5 — 20		
1171. " Pongeii fl. pl., dubbel C. hybr. & pluvialis ha hvita blmr. De nya formerna af C. off. utm. sig för vacker byggnad och litliga, i gult och orange varierande färger. Förtjonta af uppmärksamhet.		
Calliopsis; Coreopsis; Skönhetssöga, (Senecionideæ.)		
1172. " bicolor (Coreops. tinctoria) 5 — 20		
1173. " fistulosa 5 — 25		
1174. " maculata 5 — 25		
1175. " nana, låg 5 — 35		
1176. " " marmorata 8 — 40		
1177. " " Purpurea 8 — 45		
1178. " " nigra speciosa 5 — 20		
1179. " " splendens 8 — 40		
1180.* " cardaminifolia 5 — 30		
1181.* " coronata 8 — 40		
1182.* " Drummondii 5 — 30		
Alla 11 sorterna, 50 öre.		
Alla sorterna är ovanmärkta praktblmr, väl förtjenta af att odlas på grupper, rabatter och i krukor. De talrika, på långt afstånd lysande blmrna variera i gult och brunt. De låga sorterna blifva 2 à 3, de högv. 3 à 4 fot höga.		
* Callirhoe; Nuttallia, (Malvaceæ.)		
1183. " pedata 10 — 60		
1184. " " nana 10 — 80		
1185. " verticillata 20 1 —		
Vackra gruppv. m. talrika, lila, rosentröda blommor.		
Campanula; Klockblomster; Blåklocka, (Campanulaceæ.)		
1186.* " attica, låg, blå, rikbl. 15 — —		
1187. " celtidifolia, låg, blå, storblommig 25 — —		
1188.* " Loreyii, blå och hvit 10 — 70		
119. " speculum, <i>Venuspegl</i> 5 — 15		
1190. " fl. albo, hvit 5 — 15		
1191. " " fl. lilacino, gredelin 5 — 15		
1192. " " grandiflora, blå 5 — 15		
1193. " " alba, hvit 5 — 15		
1194.* " stricta, ljusblå 8 — 75		
Alla 9 sorterna, 65 öre.		
Ettåriga; mycket vackra till kantblmr kring störe och mindre grupper. Fröet till en del sorten är mycket fint, hvarföre man vid såningen bör vara försiktig, att det ej kommer djupt.		
Cannabis, se bladväxter.		
* Capsicum; Spansk peppar, (Solanaceæ.)		

	å Port. Ort. Rmt Rd. ö. Rd. ö.	å Port. Ort. Rmt Rd. ö. Rd. ö.
1195. <i>Capsicum annuum</i> med mörk- röd, påsformig frukt — 5 — 30		Omkr. 1 fot hög, grenig växt, som trivs i mager, sandbl. jord och är en omtyckt kant- blomma. Öfriga sorter, se modeblommor.
1196. " <i>annuum</i> gul, påsform frukt — 5 — 30		
1197. " röd, lieformig frukt — 5 — 30		
1198. " " gul, lieformig frukt — 5 — 30		
1199. " " röd, bärformig frukt — 5 — 30		
1200. " " gul, bärformig frukt — 5 — 30		
1201. " " svart frukt — 5 — 80		
Alla 7 sorterna, 30 öre.		
1202. " blandade — 5 — 30		
Odlat för dess yackra och i hushållet användbara frukter.		
<i>Celosia</i> , se modeblommor.		
Cenia; (<i>Senecionideæ</i>)		
1203. " <i>turbinata</i> — 5 — —		
Hög infattn. v. m. gula blmr.		
Centaurea; <i>Klint</i> , (<i>Cyna- reeæ</i>)		
1204.* " <i>americana</i> — 8 — 70		
1205. " <i>cyanus</i> , <i>Blåklint</i> , <i>Korn- blomster</i> , blandade — 5 — 15		
1206.* " <i>depressa</i> , vacker, blå — 5 — 15		
1207.* " <i>involucrata</i> , gul — 5 — 15		
1208.* " <i>moschata</i> ; <i>Bisamblomster</i> , — 5 — 15		
1209.* " <i>alba</i> , <i>Bisambl.</i> , hvit — 5 — 15		
1210.* " <i>suaveolens</i> , gul välvkt. . . . — 5 — 30		
Alla 7 sorterna, 30 öre.		
Pyrdigla, för rabatter pas- sande blommor.		
Centauridium , (<i>Cynareæ</i>)		
1211. " <i>Drummondii</i> — 5 — 50		
2 a 3 fot hög rabatty. v. m. gula blomhufvuden.		
* Centranthus; <i>Baldrian</i> , (<i>Valerianææ</i>)		
1212. " <i>macroziphon</i> , röd — 5 — 20		
1213. " fl. albo, hvit — 5 — 25		
1314. " fl. carneo, köttfärgad — 5 — 20		
1215. " " <i>nanum</i> , lågväxt — 5 — 25		
Vackra, 1½ fot till höga pyd- nadsväxter.		
Cerinthe; <i>Vaxblomster</i> , (<i>Bo- ragineæ</i>)		
1216. " <i>aspera</i> , utm. vacker — 10 — 50		
1217. " <i>aureiculata</i> — 5 — 25		
1218. " <i>gymnandra</i> — 5 — 25		
1219. " <i>major</i> — 5 — 20		
1220. " fl. luteo — 5 — 25		
1221. " <i>retortum</i> , brokiga blad — 8 — 40		
Alla 6 sorterna, 35 öre.		
Samtliga sorterna 1 a 2 fot höga, passande till rabatter.		
* Chenostoma , (<i>Scrophu- lariaceæ</i>)		
1222. " <i>fastigiata</i> , gredelin — 8 — 50		
1223. " <i>polyantha</i> , hvit eller röd — 8 — 40		
Rätt vackra, synnerligen till odling i krukor. På fritt land fordra de ett varmt, skyddadt ställe.		
Cheiranthus; <i>Löfkoja</i> , (<i>Cru- ciferæ</i>)		
1224. " <i>maritimus</i> , <i>Strandlöfkoja</i> — 5 — 15		
1225. " fl. alba, hvit — 5 — 15		
	kantad — 5 — 20	
	" fl. pl., dubbel — 20 — —	

		à Port. Ort.		à Port. Ort.
	Rmt Rd. ö.		Rd. ö.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.
1256.	Clarkia pulchella, nana (Tom Thumb) låg	— 5 — 30		
1257.	" pulchella pulcherrima, carmin	— 5 — 20		
	Alla 16 sorterna, 95 öre.			
	10 vackra sorter, 65 "			
1258.	" blandade sorter	— 5 — 20		
	Alla Clarkia, och isymeriet varieteterna af C. pulchella, äro verkliga prydnadsväxter, förtjenta af att allmänt omhuldas. De festla blifva $1\frac{1}{2}$ a 2 fot höga, mycket rikblomniga och förr, att plantera på grupper. De dubbla sorterna äro lättvändes mycket vackra.			
*	Cleome, (Capparideæ.)			
1259.	" speciosissima	8		
1260.	" spinosa	10		
	3 a 4 fot höga, till blomsterbord båst passande växter m. egendoml., rätt vackra blmr. Odlas helst i krukor,			
*	Chianthus; Prakticka, (Papilionaceæ.)			
1261.	" Dampieri, (Dionia formosa) — 50	—		
	Är egentligen flerårig, men emedan den är kinkig att öfvervintra och dessutom blommor lättast och rikast om den behandlas såsom ettårig, hafva vi upptagit den här. Fordrar god, kraftig, sandbl. löf- och ljuvgjord, samt en sval, luftig plats i kast eller driftbänk. Vid vattningen bör nog tillses att strålen ej kommer för nära stammen, emedan växten deraf vaurtrives. De i rika klasar hängande blmrna äro stora, präktigt skarlakansröda.			
*	Clintonia, (Lobeliaceæ.)			
1262.	" elegans, blå	— 10 — 1		
1263.	" pulchella, blå	— 10 — 1,75		
1264.	" " alba, hvit	— 10 — 1,75		
1265.	" " atrocinerea, rödaktig. — 10	1,50		
	Smånätta växter m. vackra blmr; odlas och användas som den allm. kända blå lobelian, men äro ömtäligare än den, för otjänlig väderlek.			
Coccinea, se slingerväxter.				
Coix, se dekorationsgräs.				
Collinsia, (Scrophularineæ.)				
1266.	" bartoniaefolia, rosebröd . . .	— 5 — 15		
1267.	" fl. alba, hvit	— 5 — 25		
1268.	" bicolor, violett och hvit. — 5	— 10		
	Pr $\#$. 5 rdr.			
1269.	" candidissima, hvit. . .	— 5 — 20		
1270.	" fl. alba, hvit.	— 5 — 15		
1271.	" " carnea, kötfärgad. — 5	— 15		
1272.	" major, stor	— 5 — 10		
1273.	" grandiflora, blå, stor . . .	— 5 — 10		
	Pr $\#$. 5 rdr.			
1274.	" multicolor, mångfärgad . . .	— 5 — 20		
1275.	" marmorata	— 5 — 20		
	Användbara på rabatter.			
Cucurbita & Cucumis, se köks- trädgårds- & slingerväxter.				

a Port. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

* **Cuphea**, (Lythrariæ.)

1298. " miniatia, högröd 15 1 —

1299. " purpurea, i flera färger 8 — 50

1300. " silenoides, purpuröd 5 — 40

Förda god jord och solrika
platser, kunna användas till
grupper och infatningar.**Cyclanthera**, se koksträdgård,

gurkartade & slingerväxter.

Cynoglossum; **Hundtunga**, (Boragineæ.)1301. " linifolium, *Hvit förgätl-**mig ej*, . . Pr. fl. 6 rdr. 5 — 10

Känd, omtyckt; 1 a 1½ fot

högt kantblma.

* **Datura**; **Spikklubba**, (Solanaceæ.)

1302. " ceratocaula, 3 a 4 fot hög 8 — 40

1303. " fastuosa, 2 a 3 fot 5 — 20

1304. " " Huberiana, dubbelt 20 — —

1305. " " alba, hvit, dubbelt 20 — —

1306. " humilis flava fl. pl. gul 8 — 50

1307. " guajacuensis, hvit 15 — —

1308. " Metel, hvit 5 — 20

1309. " meteloides, hvit m. violett 5 — 20

Alla 8 sorterna, 75 öre

Dessa utm. prydningsblomr.

kunna lika fördelaktigt an-

vändas på rabatter, som i

blomster- och bladgrupper.

Om man i Juni sår fröet och

öfverv. pl. vid + 12 a 15°

C., så erhålls sköna, blom-

sterrika exempl., som föl-

jande vår kunna uppl. på frött

land i fet jord, på varma,

lugna ställen, der de full-

koml. utvecklas och ofta gif-

va mycket frö.

Delphinium; **Riddarsporre**,

(Ranunculaceæ.)

1310. " cardiopetalum (peregrinum). 5 — 30

Läg garneringssv. m. vackra,

blå blmr. Öfriga Delph. ar-

arter, se modeblmr. och fier-

riga växter.

* **Dianthus**; **Neglika**, (Caryophyllæ.)

1311. " Gardnerianus 8 — 40

1312. " superbus hybr. grandifl. 15 — —

1313. " " hybr. fl. pl. 40 — —

Den första, är en bekant och

omtyckt prydningsväxt. De

tvonne sistn., som är bastar-

der af D. superb. & D. chin.

Hedwigii, hafvastora, egen-

domligt förmade blmr. m. bril-

jants färger. Öfriga sorter se

modeblmr. & fierig växter.

* **Dolichos**, (Papilionaceæ.)

1314. " atrosanguineus 8 — 50

1315. " giganteus (D. altissimus) 8 — 45

1316. " Lablab (Lablab vulgaris) 5 — 25

Slingerväxter; forda soliga,

lugna platser.

Dracocephalum; **Drak-****hufvud**, (Labiataeæ.)

a Port. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

1317. **Dracocephalum mexicanum**,

röd 15 — —

1318. " moldavicum album 5 — 10

1319. " coeruleum 5 — 10

Småhätte växter in. kran-

sformigt sittande röda; hvita

eller blå blmr.

Echinocystis, se slingerv.

Eleusine, se dekorationsgräs.

* **Echium**; **Blåkunt**; **Ormhus-****vud**, (Boragineæ.)

1320. " creticum 10 — 75

Rätt vacker gruppv. m. röd-

violetta blommor.

Erodium; **Kamnäfva**, (Ge-**raniaceæ.)**

1321. " gruinum 8 — 25

Har intet värde som blom-

sterväxt, men är egendomlig

derföre att fröhusens spröt

vid fuktig väderlek böja sig

ifrån hvarandra och då inf-

ten är torr åter sluta sig

samman. Användas derföre

till hygrometer.

Erysimum, (Cruciferæ.)

1322. " arkansum, ljustgul 8 — 50

1323. " Perowskianum, mörkgul. 5 — 15

Omkring 1 fot höga, till kant-

blmr på grupper väl passande

växter.

Eschscholzia, (Papave-**raceæ.)**

1324. " californica, gul 5 — 15

1325. " " fl. alba, hvitaktig 5 — 15

1326. " " fl. rosea, rödaktig 8 — 40

1327. " crocea, mörk saffransgul. 5 — 15

1328. " striata, strimmig 8 — 35

1329. " dentata sulphurea, gul 8 — 40

1330. " tenuifolia 5 — 35

Alla 7 sorterna, 40 öre.

Kända, vackra växter till

grupper, rabatter och breddare

infattn. Försök sig sjelf-

va genom utfallande frö.

* **Ethulia**, (Vernoniaceæ.)

1331. " corymbosa 8 — 15

2 a 3 fot hög m. rosenv. blom-

hufynden. Säs i Maj eller

Juni; öfvervintras i tempe-

rerat hus och uppl. om vä-

ren på kalljord.

Eucharidium, (Onagra-**riæ.)**

1332. " concinnum 5 — 30

1333. " , grandiflorum 8 — 30

1334. " flora alba 8 — 40

Väckra, med Clarkia nära

besläktade, 1 a 1½ fot höga

grupper; beh. som Clarkia.

* **Eucide**, (Loasæ.)

1335. " bartonioides 10 — 15

Utm. väcker m. invändigt

mörk- och utv. ljusgula blmr.

Odlas helst i krukor under

glas och begagnas till deko-

rationer.

Euphorbia; **Röfjölk**; **Varg-****mjölk**, (Euphorbiaceæ.)

	à Port. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.	à Port. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.
1336. <i>Euphorbia variegata</i> (marginalis). — 15 — 75			Dessa praktfulla gruppväxter förtjena blomsterälskares synnerliga uppmärksamhet. De stora blomma varierar i rosoröd och hvitt med mörkare fläckar. De flesta arterna fortl. genom utfallande frö.	
— Utm. för sinarent hvita blom-skärmars.			* Gomphrena; Klotamarant, (Amarantaceæ.)	
1337. <i>Eutoca</i> , (<i>Hydrophyllæa</i>).			1365. " <i>globosa</i> , purpuröd — 5 — 35	
1338. " <i>multiflora</i> , mångblommig — 5 — 20			1366. " <i>carnea</i> , köttfärg. — 5 — 25	
1339. " <i>viscida</i> , blå — 5 — 15			1367. " <i>alba</i> , hvit — 5 — 25	
1340. " " <i>flora alba</i> , hvit. — 5 — 30			1368. " <i>variegata</i> , brokig — 5 — 25	
1341. " <i>Wrangeliana</i> — 5 — 10			1369. " <i>Haageana</i> (<i>aaurantiaca</i>). — 8 — 50	
Låga, med Nemophilan nära besl., till infattn. tjenliga växter.			Kända och omtyckta evighetsblomster, som passa till vinterbuketter o s v. Som gruppv. på kall jord ärde de äfven vackra, men bura ej utpl. förr än de blomma.	
* Fenzlia , (<i>Polemoniacæa</i> .)			* Gramanthes; Skriffliblomster, (Crassulaceæ.)	
1341. " <i>dianthoides</i> (<i>Gilia dianthi-flora</i>). — 10 —			1370. " <i>gentianoides</i> (Crassula) — 10 —	
2 a $2\frac{1}{2}$ tum hög m. rödaktiga, i svagalt gula blmr; lämpar sig bäst för odl. i kruka i kall driftbänk.			1 1/2-2 tum hög, till infattn. af mindre, starkt solbelysta grupper, passande växt m. talrika, lysande röda blmr. Fordrar mager jord.	
* Gaillardia , (<i>Senecionideæ</i> .)			Gronovia, se slingerväxter.	
1342. " <i>Drummondii</i> (G. bicolor).			Gypsophila; Gipsblomster, (Caryophyllæa.)	
var. <i>Drummondii</i> ; G. <i>picta</i>) — 5 — 30			1371. " <i>elegans</i> — 5 — 10	
1343. " <i>Drummondii coccinea</i> — 8 — 40			1372. " " <i>flore roseo</i> — 5 — 10	
1344. " " <i>Josephus</i> — 5 — 30			1373. " <i>muralis</i> — 5 — 30	
1345. " " <i>marginata</i> — 5 — 30			1374. " <i>Saxifraga</i> (<i>Tunica</i> ; <i>Dianthus</i>). — 8 — 40	
1346. " " <i>nana sulphurea</i> — 15 —			Små, men mycket prydl. växter. Ränkt. till kantb och särdeles vackra i buketter.	
1347. " " <i>semiplena</i> — 10 — 75			Helianthus; Solros; Sol-vändare, (<i>Senecionideæ</i> .)	
Alla 6 sorterna, 40 öre.			1375. " <i>annuus</i> fl. pl. dubbel. — 5 — 15	
Praktfulla, till grupper särdeles passande växter m. sköna, i gult, rött och hvitt varierande blmr.			1376. " " <i>grandifl. plenissimum</i> — 15 —	
* Gamolepis , (<i>Senecionideæ</i> .)			1377. " " <i>nanus</i> , låg — 8 — 50	
1348. " <i>Tagetes</i> (G. <i>annua</i>). — 8 — 50			1378. " <i>californicus</i> fl. pl. — 5 — 20	
6 a 8 tum hög infattn. växt m. gula blmr.			1379. " " <i>nanus</i> , lågväxt — 8 — 50	
* Gaura , (<i>Oenagrariæ</i> .)			Fordra mycket näring och bura ej pl. tillsammans med mindre växter, som deraf skulle kunna skadas.	
1349. " <i>Lindheimeri</i> — 5 — 30			* Helichrysum; Strålblomster; Fregghetsblomster, (Senecionideæ)	
Prydlig, 3 a 4 fot hög grupp-och rabattväxter m. talrika, hvin- eller rödhyvata blmr. Blommar första året, men kan of- verv. under torr beteckning.			1380. " <i>brachyrrhynchum</i> — 5 — 30	
Gilia , (<i>Polemoniacæa</i> .)			1381. " <i>bracteatum</i> (H. <i>lucidum</i> ; Elichrysum) gul. — 5 — 20	
1350. " <i>achilleifolia</i> , blå — 5 — 10			1382. " " <i>album</i> , hvit — 5 — 20	
1351. " " fl. alba, hvit — 5 — 10			1383. " " <i>nanum album</i> , låg — 8 — 60	
1352. " <i>capitata</i> , blå. — 5 — 10			1384. " " <i>luteum</i> , låg, gul. — 8 — 60	
1353. " <i>nivalis</i> , hvit — 5 — 10			1385. " <i>compositum</i> (<i>monstr.</i>) <i>album</i> — 5 — 40	
1354. " <i>tricolor</i> , trefärgad — 5 — 10			1386. " " <i>atroroseum</i> , mörkröd. — 10 — 70	
1355. " " alba, hvit — 5 — 10			1387. " " <i>atrosanguineum</i> , mörk — 15 —	
1356. " " <i>rubra</i> , rödaktig — 5 — 10			1388. " " <i>Borussorum Rex</i> , hvit — 10 — 75	
Alla 7 sorterna, 30 öre.			1389. " " <i>brunneus</i> , brun — 10 — 75	
Småhätta, till garneringar tjevliga växter m. talrika, små blmr. Fortplantas genom utfallande frö.			1390. " " <i>nanum atrococcineum</i> — 15 —	
Godetia , (<i>Onagrariæ</i> .)			1391. " " <i>minimum album</i> — 15 —	
1357. " <i>Lindleyana</i> (<i>Oenothera</i>). — 5 — 30			1392. " " <i>aureum</i> — 15 —	
1358. " " fl. pl., dubbel. — 8 — 40				
1259. " " <i>purpurea</i> (<i>Oenoth. humilis</i>). — 5 — 20				
1360. " " <i>rosea alba</i> (<i>O. amoena</i>). — 5 — 20				
1361. " " <i>alba Tom Thumb</i> — 5 — 30				
1362. " " <i>rubicunda</i> (<i>Oenothera</i>). — 5 — 20				
1363. " " <i>The Bride</i> — 5 — 30				
1364. " " <i>tennifolia</i> — 5 — 30				
Alla 8 sorterna, 40 öre.				

à Port. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

1393. Helichrysum compositum mi-		
nimum roseum	— 15	—
1394. „ compositum minimum ru-		
brum	— 15	—
1395. „ capitatum	— 10	— 90
1396. „ elegans (Morna elegans). — 10	— 90	
„ strictum, se Chrysoccephalum		
Alla 17 sorterna, rdr 1,50.		
10 vackra sorter, „ 1,10.		
1397. „ höga sorter, blandade . .	— 8	— 50
1398. „ låga sorter, blandade . .	— 8	— 50
Fordra soliga platser och en god lucker jord. Allesamman höra till de vackraste eternellerna och böra odlas i hvarje trädgård. Isynnerhet ärö varieteterna af H. comp. utmärkta. H. comp. minimum ärö omkr. 2 fot höga m. talrika, små, klotform., mycket dubbla blmr, som synnerligen egna sig till vinterbuketter.		

* *Heliophila*; *Solvän*, (Cru-*ciferæ.)*

1399. „ araboides	— 8	— 40
1400. „ dissecta	— 10	1 —
Dessa växter öppna sina prydliga, blå blommor endast då de belysas af solen, hvarföre de böra pl. på soliga ställen. Odlas säkrast under glas i en kall driftbänk och uppl. då de börja blomma.		

* *Helipterum*; *Solvinge*, (Se-*necionideæ.)*

1401. „ corymbiforum	— 15	1 —
1402. „ Sandfordia	— 20	1,50

Gula Evgighetsblomster; for-
dra sandb. jord och varma
soliga ställen.**Hibiscus**; *Ibisblomster*,

(Malvaceæ.)

1403. „ calisurus	— 5	— 15
1404. „ triunum	— 5	— 15

Tacksamt bl, 1½ fot höga
rabattv.* *Hunnuemannia*, (Papave-*raceæ.)*

1405. „ fumarifolia	— 10	1 —
Egentl. tvåårig, men blommar första året, om fröet ut-säss t ex. i Mars. Man kan även se senare, öfverv. pl. frostfritt och om våren ut-sätta dem på kaljord. Växten är 2 a 3 fot hög och har vackra, gula, tulpanlikna blmr.		

Iberis; *Flipkrage*, (Crucifereæ.)

1406. „ amara, hvit, pr. fl. 4 rdr	— 5	— 8
1407. „ grandiflora, storbl. . .	— 5	— 20
1408. „ hesperidifolia, rent hvit	— 10	— 60
1409. „ odorata, hvit välluktande	— 5	— 10
pr. fl. 5 rdr.		
1410. „ pectinata nana alba, låg	— 15	1,25
1411. „ umbellata, violet, pr. fl.		
5 rdr.	— 5	— 10
1412. „ „ alba, hvit, pr. fl. 5 rdr	— 5	— 10

1413. *Iberis umbellata carnea*, kött-

färgad — 5 — 20

1414. „ *umbellata purpurea*, pur-

purröd — 5 — 20

1415. „ *Dunetti*, mörk purp. — 5 — 15

Alla 10 sorterna, 60 öre.

1416. blandade, pr. fl. 7 rdr . . . — 5 — 15

De här anförla *Iberis* äroalla mycket vackra och tack-
samma, grupp- och infat-
ningsväxter. Den 2 a 3 tum
h. *I. pectinata* är i synnerhet
lämplig till infattning. De röda,
hvita och violetta sorterna,
blandade om hyarandra, bildar
mycket vackra grupper. För-
ka sig genom utfallande frö.**Impatiens**; *Balsamin*, (Bal-*samineæ.)*1417. „ glanduligera; *Jättebalsamin* — 10 — 75

1418. „ fl. albo, hvit — 15 1,50

5 a 6 fot hög, mycket gre-
nig rabattväxtIpomea, se modeblommor &
slingerväxter.* *Ipomopsis*, (Polemoniaceæ.)1419. „ *Beyrichiana*. (Gilia B.) . — 5 — 751420. „ *coronopifolia*. (Gilia;Ipom. picta; *Cantua pin-**natif*; *Polem. rubrum*) . — 5 — 351421. „ *elegans* (Gilia elegans). — 5 — 351422. „ *aurantiaca*, guldgul . — 5 — 351423. „ *cuprea*, kopparröd . — 8 — 501424. „ *lutea*, gul — 5 — 35

Alla 6 sorterna, 25 öre.

1425. „ blandade sorter — 5 — 35

Dessa utm. pryd: växter ly-
kas bäst, om de behandlas
såsom tvååriga. Plantorna
sättas i så fall i kruka och
öfverv. i temp. växthus helt
nära glaset. Vintertiden äro
de mycket känsliga för fuk-
tighet, isynnerhet om sådan
samlar sig på bladen, hvarför
man vid vattning måste an-
vända all möjlig försigtighet.
Om våren uppl. de på fritt
land, men måste äfven der
skyddas mot rå och fuktig
vädlek.* *Isotoma*, (Lobeliaceæ.)1426. „ *axillaris*, (Lobelia sene-*cioïdes)* — 12 — 80Updrages i kruka i kall
bänk. Blommor första året
sparsamt, m. andra året ri-
kare; vackra hvita blommor.**Jonopsisidium**, (Cruciferæ.)1427. „ *acaulis*, (Cochlearia ac.) . — 10 — 70

1 a 2 tum hög, till infattn.

af mindre grupper mycket
fördelaktig växt m. talrika,
små, poröslnhvita blommor.* *Kaulfussia*, (Asteroideæ.)1428. „ *amelloides*, blå. — 5 — 301429. „ *rosea*, violet — 5 — 30

Inf. växter; 1 a 1½ fot höga.

Lagenaria, se slingerväxter.

Lasthenia, (Senecionideæ.)1430. „ *californica* (glaberrima) . — 5 — 30

	<i>Port.</i>	<i>Ort.</i>		<i>Port.</i>	<i>Ort.</i>
	Rmt	Rd.	ö.	Rd.	ö.
1 fot hög infattn. växt med gula blommor.					
Lathyrus, se modeblommor & slingerväxter.					
Lavatera; Poppelros, (Mal- vaceæ.)					
1431. " trimestris, röd	5	—	10		
1432. " fl. alba, hvit	5	—	10		
1433. " blandad	5	—	10		
Allmänt kända, omtyckta, omkr. 3 fot höga växter m. stora ljusröda och hylta blmr.					
* Leptosiphon, (Polemo- niaceæ.)					
1434. " androsaceus, rödaktig	5	—	15		
1435. " densiflorus, roseröd	5	—	20		
1436. " hybridus, fl. vackra färger —	8	—	50		
1437. " luteus, gul	8	—	40		
1438. " aureus, mörkgul	8	—	40		
Nätta, tacksamt och länge bl. växter; användbara på rabatter och mindre grupper m. god, men ej fet jord. L. andros. blifva 6 a 8, luteus 8 a 10 och densifl. 10 a 12 tum hög.					
Limnanthus; Stumpblomster, (Limnantheæ.)					
1439. " Douglasii	5	—	30		
Infattn. växt m. gula, rätt vackra blommor.					
Linaria; Flugblomster, (Scro- phulariææ.)					
1440. " bipartita (elegans; speciosa) blå violett	5	—	25		
1441. " alba, hvit	5	—	25		
1442. " splendens, violett	5	—	30		
1443.* <i>Cymbalaria; Aarons slägg</i> —	5	—	40		
1444. " macroura (Antirrh. linif) —	5	—	20		
1445. " Perezii, gul	5	—	25		
1446. " triornithophora (lusita- nica) violett	10	—	75		
Alla 7 sorterna 35 öre.					
Med undantag af L. Cymb., som är omtyckt till amplar och klippanlägggn. samt L. triornithoph., som är en 3 a 6 fot hög, förtäfflig, rabattväxt, är dessa växter blott 8 a 12 tum höga och passa ypper- ligt till garneringsblmr. De flesta fortl. sig gen. utfr. frö.					
Linum; Lin; Hör, (Lineæ)					
1447. " grandiflorum, mörkröd	8	—	50		
1448. " roseum, roseörn	50	—			
1449. " luteum, gul	8	—	60		
1450. " usitatissimum grandifl. blå —	5	—	20		
1451. " album, hvit	5	—	20		
1452. " blandade	5	—	35		
Allesamman, men isynnerhet L. grandifl., som är en af de allra bästa sommarblmr, är utm. prydnadsväxter för grup- per. Brokiga, vackra grupper erhållas om alla sorterna sammanblandas.					
Loasa (Cajophora) se slim- gerväxter.					

å Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

1487.	Lupinus <i>Moritzianus</i> , 2 à 3 f., blå m. hvitt och gult —	5 — 10
1488.	" <i>mutabilis</i> , 4 à 6 fot, hvit med gult, välluktande —	5 — 8
1489.	" " <i>roseus splendens</i> , lysande rosentröd . . .	5 — 10
1490.	" " <i>Cruikshankii</i> , varierar i blått, viol. o. purpur —	5 — 10
1491.	" " <i>variecolor</i> , mångfärgad —	5 — 10
1492.	" <i>nanus</i> , 1 à 1½ fot, blå —	5 — 15
1493.	" fl. albo, 1 à 1½ f., hvit —	5 — 20
1494.	" <i>pilosus</i> , 2 à 3 fot, röd —	5 — 10
1495.	" <i>coeruleus</i> , 2 à 3 f, blå —	5 — 10
1496.	" <i>albus</i> , 2 à 3 fot, hvit —	5 — 10
1497.	" <i>pubescens</i> , 1½ à 2 fot, violett med hvitt . . .	5 — 10
1498.	" " <i>elegans</i>	5 — 10
1499.	" <i>subcernosus</i> (<i>texensis</i>) blå med hvitt	10 — 30
1500.	" <i>venustus</i> , violettblå	5 — 10
1501.	" <i>tricolor</i> , trefärgad	5 — 10 30 sorter. rdr 1,45. 12 — 60.
1502.	" höga sorten, blandade	5 — 10
1503.	" medelhöga, blandade	5 — 15
1504.	" låga, blandade	5 — 25 Aliessammanfört. grupp- och rabattv. L. affines, Menziezii och nanus kunnna användas som infatn. kring de högre sorterna, se även Ekonomiväxter.

Lycopersicum; Kärleksäpple,
se kryddväxter.*Madia*; (*Asteroideæ*)

1505.	" <i>elegans</i>	5 — 20
	3 à 4 fot hög, gulbl. rabattv.	
1506.	" <i>bicolor</i>	10 — 60
1507.	" <i>incrassata</i>	10 — 60
	Dessa med Strandlökkojan (<i>Cheiranthus maritimus</i>) nära beslägtade växter blifva omkring 6 à 8 tum h. m. röda blmr. Trifivas bäst i sandbl. något mager jord och passa till garneringar.	

Malope; Praktmalva, (*Malvaceæ*)

1508.	" <i>trifida grandiflora</i>	5 — 10
1509.	" " <i>grandiflora</i> fl. alba	5 — 10
1510.	" " blandade	5 — 10

Vackra gruppv. med stora, lysande, röda och hvita blmr.

Malva; Kattost, (*Malvaceæ*)

1511.	" <i>crispa</i> , 6 à 8 fot, krusbl. —	5 — 10
1512.	" <i>mauritiana</i> , 6 à 8 f, röd —	5 — 10
1513.	" <i>minima</i> , 2 à 3 fot, röd —	5 — 35
1514.	" <i>zebrina</i> (maur. <i>zebrina</i>) 4 à 5 fot, strimlig . . .	5 — 20
	Vackra rabattväxter.	

** Manoea; Handblomster*, (*Serophularineæ*)

1515.	" <i>violacea</i>	10 1 —
	Plant. öfvervintras i temp.	

å Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

å Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

växthus och uppl. om våren
i god löjfjord.** Martynia*; (*Elefantsnabel*,
(*Personateæ*)

1516.	" <i>Craniolaria</i> (<i>Cr. annua</i>)	8 — 40
1517.	" <i>formosa</i> (<i>fragrans</i>)	8 — 40
1518.	" <i>lutea</i>	5 — 30
1519.	" <i>Proboscidea</i>	8 — 40
	Från 1½ till 3 à 4 fot höga, vackert blommade växter, som passar till dekorationer på blomsterbord etc. Fröet bör, innan det sätts, uppmyk- tas i varmt vatten eller för- siktigigt afsilas, ejlest gör det långsamt och osäkert. Plan- torna värds i varm driftbänk tills de blomma	

Mathiola; (*Ljuskaja*, (*Cruci-
feræ*))

1520.	" <i>bicornis</i>	15 — —
1521.	" <i>tricuspidata</i>	20 — —
	Havfa ytterst talrika, välluk- tande, men till utseendet obe- tydliga blmr., som framkom- ma till sent på hösten. Tjänl. till infatningar. Öfriga sor- ter se Modeblommor.	

Matricaria; (*Sötblomster*,
(*Senecionideæ*))

1522.	" <i>capsensis</i>	8 — 40
1523.	" " <i>alba plenissima</i>	20 — —
1524.	" <i>eximia</i>	8 — 40
	Omkr. 1½ fot höga växter med en mängd, hvita dubbla blmr. Mycket passande till grupper. Fortpl. sig ofta ge- nom sjelfsädd.	

Maurandia, se slingerväxter.

Medicago; (*Luzern*, Snäck-
klipper, (*Leguminosæ*))

1525.	" <i>intertexta</i>	5 — 25
	Rabattväxt m. egend. fröhus.	

Metholthria, se slingerväxter.

** Mesembryanthemum*; (*Isplanta*, (*Ficoideæ*))

1526.	" <i>crystallinum</i> , vanlig	8 — 40
1527.	" <i>pommeridianum</i> , gul	10 — 70
1528.	" <i>tricolor</i> , trefärgad	10 — 70
1529.	" fl. albo, hvit	10 — 60
	Den första. användes äfven till spenat. M. tricol. är utm. vacker till infatningar och grupper. Blimna äro stora, röda eller hvita och lysa på långt afstånd, men öppna sig blott då solen skiner, hyar- före de böra pl. på solrika platser.	

** Mimosa*; (*Sensitiva*, (*Mi-
moseæ*))

1530.	" <i>pudica</i>	10 — 60
	En allmänt känd växt, hvars blad äro så känsliga att de vid ringaste beröring sluta sig tillsammans. Odlas bäst i en halvårm kast- eller drift- bänk. Kan öfver i bonings- rum, men fordrar mycket ljus och bör vattnas försiktig.	

	à Port. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.	à Port. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.
* Mimulus; <i>Muskusblomster;</i> <i>Gyckelblomster,</i> (<i>Scrophu-</i> <i>larineæ</i>)				
1531. " <i>cardinalis</i>	10 — 75			
1532. " " <i>Fortunatus</i>	10 — —			
1533. " " <i>grandiflora</i> , storbl.	10 — —			
1534. " <i>cupreatus</i> , låg	15 — —			
1535. " " fl. pl., dubbobl.	25 — —			
1536. " " <i>tigrioides</i>	15 — —			
1537. " " <i>tigrinus</i> (<i>pardinus</i>)	25 — —			
1538. " " <i>brunneus</i>	25 — —			
1539. " " fl. pl.	25 — —			
1540. " <i>luteus</i> , gul	15 — —			
1541. " " <i>quinquevulnerus maxi-</i> mus	15 — —			
1542. " " <i>rubiginosus</i>	10 — —			
1543. " " <i>rivularis</i>	10 — —			
1544. " " <i>robustus punctatus</i>	10 — —			
1545. " " <i>moschatus</i> , gul	10 — —			
Alla 15 sorterna, rdr 2 —				
10 vackra sorter, " 1,60				
Varieteterna af <i>M. cardin-</i> blifva 2 a 3 fot höga med skarlananröda blmr och äro förr. rabattiv. <i>M. cupreatus</i> med dess variet. hafva utm. blmr och äro vackra grupper- eller infattna växter; likaså alla <i>M. luteus</i> .				
De bästa och vackraste variet. fortpl. bäst genom stickl. el- ler delning; de planteras i kruka och öfverv. frostfritt. Om man tidigt på våren ompl. dem och ställer dem nära glaset i ett temp. växthus, så kan man redan i April hafva rika, vackra blommmande ex- empl. af dessa praktväxter.				
* Mirabilis; <i>Underblomster,</i> (<i>Nyctagineæ</i>)				
" <i>jalappa</i> , se <i>Modeblommor</i> .				
1546. " <i>longiflora</i>	5 — 20			
1547. " " <i>violacea</i>	5 — 20			
2 a 4 fot höga rabattväxter m. hvita och violetta blmr. Rötterna kunna om hösten uppt. och förvaras som dår- tierötter.				
Momordica; <i>Springgurka,</i> (<i>Cucurbitaceæ</i>)				
1548. " <i>elatiorum</i> (<i>Ecbalium off.</i>) —	8 — 40			
Är ej vacker, men intressant, deröf att dess mognade fruk- ter vid beröring öppna sig och väldsamt utkasta frö och saft. De öfriga sorterna fin- nas uppt. bland slingerv.				
Nemesia; (<i>Scrophulariaceæ</i>)				
1549. " <i>floribunda</i>	10 — 70			
1550. " <i>versicolor</i>	10 — 70			
1551. " <i>compacta alba</i>	10 — 80			
1552. " " <i>coerulea</i>	10 — 80			
1553. " " <i>rosea</i>	10 — 80			
Dessa smånättiga växter blifva 1 a $1\frac{1}{2}$ fot höga. De fyra sistna är hybrider Blmrna är talrika och vackra, blå, hvita och violetta; använd-				
bära till grupper och som kantblommor. Kunna äfven odlas i kruka.				
Nemophila; <i>Kärleksblom-</i> ster. (<i>Hydrophyllæ</i>)				
1554. " <i>atomaria</i> , hvit med svarta punkter	5 — 10			
1555. " <i>cramboidea</i> , himmelsblå, med svarta punkter	5 — 10			
1556. " " <i>oculata</i> , himmelsblå med hvitt	5 — 10			
1557. " <i>discoidalis</i> , nästan svart	5 — 10			
1558. " " <i>elegans</i> , brun m. hvitt	5 — 20			
1559. " " <i>marmorata</i> , marmorl.	5 — 20			
1560. " " <i>vittata</i> , svart m. hvitt	5 — 10			
1561. " <i>insignis</i> , blå, pr $\text{fl}.$ 6 rdr	5 — 10			
1562. " " <i>alba</i> , hvit, pr $\text{fl}.$ 6 rdr	5 — 10			
1563. " " <i>marginata</i> , blå med hvit rand	5 — 10			
1564. " <i>maculata</i> , hvit med violett	5 — 10			
1565. " " <i>grandiflora</i> , storbl.	8 — 30			
1566. " " <i>purpurea</i> , mörkviolett	5 — 10			
Alla 13 sorterna, 65 öre.				
1567. " <i>blandade</i> , pr $\text{fl}.$ 6 rdr	5 — 10			
Allmänt omtyckta till grupper och infattningar. För att ständigt hafta blommende exemplar, bör man sätta om hösten, i April och i slutet af Maj. Fortpl. sig ofta ge- nom sjelfsädd. Öfverv. pl. blomma, om de tidigt på vä- ren ompl. och ställas nära glaset i temp. växthus, redan i April och Maj.				
Nicandra; (<i>Solanaceæ</i>)				
1568. " <i>physaloides</i>	5 — 20			
4 a 5 fot hög rabattiv. m. blå blommor.				
<i>Nicotiana</i> , se bladväxter.				
Nigella; <i>Jungfrun i det</i> <i>gröna</i> , (<i>Ranunculaceæ</i>)				
1569. " <i>damascena</i>	5 — 10			
1570. " " <i>nana fl pl</i> , låg	5 — 10			
1571. " <i>Fontanesiana</i>	8 — 50			
1572. " <i>hispanica</i>	5 — 20			
1573. " " <i>alba</i>	5 — 20			
1574. " " <i>atropurpurea</i>	8 — 30			
1575. " <i>orientalis</i>	5 — 20			
Alla 7 sorterna, 35 öre.				
Utm. vackra. N. dam. är omkr. $1\frac{1}{2}$ fot hög, de öfri- ga arterna lägre, passande till kantblmr. Allesamman vackra i buketter.				
Nolana; <i>Cymbalblomster.</i> (<i>Solanaceæ</i>)				
1576. " <i>atriplicifolia</i> (<i>grandifl</i>)	5 — 20			
1577. " <i>paradoxa</i>	5 — 20			
1578. " <i>prostrata</i>	5 — 20			
Låga, krypande, till kant- blmr eller till bildande af grupper användera växter, med nägorlunda stora, rätt vackra blå blommor.				
Nuttallia; se <i>Callirhoe</i> .				

	å Port.	Ort.	Rmt Rd.	ö.	Rd. ö.	å Port.	Ort.	Rmt Rd.	ö.	Rd. ö.
* Nyctarine; <i>Honungsblomster</i> , (Serophulariaceæ)										
1579. " <i>capensis</i>	12	1,50				1600. <i>Oxalis Valdiviana</i> , gul . . .	— 15 —			
1580. " <i>selaginoides</i>	8	— 50	Sminätta m. vackra, fint doftande blmr. Fordra varma, skyddade ställen på kalljord; odlas äfven i kruka.			Den förstn. är en af de bästa ettåriga infärtningsv. som genom sina mörka blad gör ett vackert afbrott mot den omg. gräsmattan. <i>O. rosea</i> & <i>Valdiv.</i> ha utmärkt vackra blmr och kunna pl. i krukor för att användas till dekorationer i växthus och boningsr.				
* Obeliscaria; <i>Obeliskblomster</i> , (Senecionideæ)						Oxyura; <i>Spetsvans</i> , (Senecionideæ)				
1581. " <i>(Monodonta) pulcherrima</i> . . .	5	— 20	Vacker m. lysande gula och bruna blmr. Pl. i krukor, öfverv. i temp. växthus och utpl. följ. vår på kalljord.			1601. " <i>chrysanthemoides</i>	— 8 —	40		
* Ocymum; <i>Basilika</i> (Labiataeæ)						1 fot hög m. vackra, gulhvita blmr; användbar till grupper, rab. och bredare infärt.				
1582. " <i>Basilicum var. crispum</i> . . .	5	— 30				* Palava, (Malvaceæ)				
1583. " <i>melissodorum</i>	10	— 90				1602. " <i>flexuosa</i>	— 20 —			
1584. " <i>mexicanum</i>	10	— 75	Odias, såväl i krukor som på fritt land, hufvdusakl. för deras utmärkta välukt.			1 a 1½ fot hög gruppv. m. talr. vackra, lilaf. blommor.				
Oenothera; <i>Nattljus</i> , (Onagraceæ)						Papaver; <i>Vallmo</i> , (Papaveraceæ)				
1585.* " <i>acaulis</i> , hvit och purpur . . .	10	60				1603. " <i>giganteum</i>	— 5 —	15		
1586. " <i>bistorta Veitchiana</i> , gul, lågväxt	8	— 50				1604. " <i>monstrosum</i>	— 5 —	10		
1587. " <i>Drummondii</i> , 2 à 3 f., gul . . .	8	— 40				" öfriiga sorter, se modeblmr & fleråriga bladv.				
1588. " <i>Lamarkiana</i> , 4 à 5 f., gul . . .	5	— 20	Perilla, se bladväxter.							
1589. " <i>longiflora</i> , 2 à 3 fot, gul . . .	5	— 20	Petunia, se modeblommor.							
1590. " <i>macrantha</i> , storbl.	10	— 80	* Pentapetes; <i>Skarlakan-malva</i> , (Byttneriacæ)							
1591. " <i>mollissima</i> , 2 à 3 fot, gul . . .	10	— 60	1605. " <i>phoenicea</i>	— 10 —	80					
1592. " <i>odorata</i> , 2 à 3 fot, gul . . .	5	— 15	2 a 2½ fot hög, mycket vacker växt m mörkt skarl. röda blmr. Ofverv. i boningsrum eller varmt växthus och utpl. följ. sommar i god jord på varmt beläggna platser.							
1593. " <i>Sellovii</i> , 4 à 5 fot, gul . . .	5	— 20	Phacelia, (Hydrophyllæ)							
1594. " <i>taraxacifolia</i> , låg, storbl., hvit med rosa	10	— 60	1606. " <i>congesta</i> , blå	— 5 —	10					
1595. " <i>tetraptera</i> , krypande, hvit och purpröd	5	— 30	1 ½ fot hög; tjenl. till grupper, rab. eller bredare infärt.							
" öfriiga sorter, se <i>Godetia</i> . Alla 11 sorter, 70 öre. Dessa vackra växter förtje- na mera uppmärksamhet än som vanl. skänkandes dem. Läm- pa sig fört. till plantering på råbatter. <i>E. acaulis</i> , <i>Drum- mondii</i> , <i>Lamarkiana</i> , <i>odorata</i> , <i>Sellovii</i> & <i>taraxacifolia</i> . Äro två- och fleråriga, men blomma redan första året. De blif- va störst och vackrast om de säs och behandlas som två- åriga. <i>O. longifl.</i> , <i>moll.</i> , <i>odo- rata</i> och <i>Sellovii</i> är valluk- tande. Några sorter fortpl. sig genom sjelfsådd.			1607. " <i>coelestina</i>	— 8 —	40					
Onopordon, se bladväxter.			1608. " " <i>nana</i> (Tom Tumb) . . .	— 10 —	60					
Orobus; <i>Skogsärt</i> , (Papionaceæ)			1609. " <i>Wendlandii</i> , praktfull	— 25 —						
1596. " <i>atropurpureus</i> , mörkröd . . .	5	— 30	Utmärkt vackra m. blå blmr. Odilade i krukor och under sommaren några gånger omlant. och toppade, blomma de rikl. under höst- och de första vinternämnader. Unga, öfverv. pl. kunna med fördel användas om våren till grupper; <i>Ph. nana</i> till infärt. Kunna försökas ge- nom stöcklingar.							
1597. " <i>Fischerii</i> , mörkröd	8	— 45	Phaceolus, se slingerväxter.							
1 ½ a 2 fot höga, prydliga			Phlox, se modeblommor och fleråriga blomsterväxter.							
* Oxalis; <i>Härklöver</i> ; <i>Gök- mat</i> , (Oxalidæ)			Phytalis; <i>Judekörs</i> , (Solanaceæ)							
1598. " <i>corniculatus</i> fol. purpu- reis, brunbladig	10	1 —	1610. " <i>Alkekengii</i>	— 5 —	20					
1599. " <i>rosea</i> , rosenröd	15	—	1611. " <i>edulis</i>	— 10 —	75					

	å Port.	Ort.	å Port.	Ort.
1613. <i>Podolepis affinis</i> — 5 — 20	Rmt Rd. ö. Rd. ö.		Rmt Rd. ö. Rd. ö.	
1614. " <i>auriculata</i> — 10 — 75			Salpiglossis, se modeblommor.	
1615. " <i>chrysanthia</i> — 10 — 75			* <i>Salvia</i> , (Labiatae)	
1616. " <i>gracilis</i> — 8 — 50			1635. " <i>coccinea</i> , skarlakanröd — 10 — 75	
1617. " <i>alba</i> — 8 — 50	Värdas i krukor under glas. I Juni kunna de uppl. på so- liga ställen å kalljörd. Al- ska sol, men skadas lätt af längv. regn. Blurna är rö- da, gula eller hvita.		1636. " <i>nana compacta</i> , låg — 10 — 90	
* Polycolumna , (Senecio- nideæ)			1637. " <i>pumila</i> , liten — 10 — 90	
1618. " <i>Stuartii</i> — 8 — 40			1638. " <i>superba</i> (Pseudococ- cinea) — 10 — 90	
	Immortell in. hvita blmr.		1639. " <i>splendens</i> , lysande — 10 — 90	
Polygonum ; <i>Bohvete</i> , (Po- lygonæ)			1640. " <i>graciliflora</i> , rosebröd — 8 — 50	
1619. " <i>elegans</i> , ljusröd — 8 — 40			1641. " <i>Horminum</i> — 5 — 20	
1620. " <i>orientale</i> , mörkröd — 5 — 20			1642. " <i>Roemeriana</i> , skarlakanf. 10 — —	
1621. " <i>album</i> , hvit — 5 — 30	Vackra prydnadsv. för grupper och rabatter. Den förstn. kan öfverv. i krukor och uppl. om våren. P. orient. blifver 6 a 8 fot hög; kan med för- del användas åfven bland bladv., hvarav dess mörkrö- da blmr göra god effekt.		Alla 8 sorterna, 65 öre. S. coccinea med dess variete- ter är mycket vackra grupp- växter. De kunna öfverv. uti temp. växthus eller bo- ningsrum och blomma, när de på våren nptl. mycket tacksamt. S. gracilifl. är låg- växt, används till int. S. Horn. är utm. för sina i fler nyancker skiftande blom- skärmar och kan, liksom S. Roemeriana, användas på grupper.	
Portulaca, se modeblommor.				
Reseda , (Resedaceæ)			Sanvitalia , (Senecionideæ)	
1622. " <i>alba</i> — 5 — 15			1643. " <i>procumbens</i> , gul — 5 — 35	
1623. " <i>crystallina</i> — 5 — 30			1644. " fl. pl., gul, dubbelt — 10 — 80	
1624. " <i>myriophylla</i> — 5 — 15			Låga, krypande växter med tafl. blmr. Särdeles passan- d til infattningsar.	
1625. " <i>odorata</i> , pr. 4,50 rdr — 5 — 8				
1626. " <i>arborea</i> — 5 — 30			Saponaria ; <i>Såpört</i> , (Ca- ryophylleæ)	
1627. " <i>grandiflora</i> , p. 5 rdr — 5 — 10			1645. " <i>multifl.</i> , hvit och röd — 5 — 20	
1628. " <i>ameliorata</i> (perfecta) — 30 — —	Alla 7 sorterna, 55 öre. De trene första sorterna sakna vällukt och odlas blott för bukettfabrikation. R. ar- borea läter lätt forma sig till småräckta träd och R. ameli- orata är en ny, utm. sort m. större blmr och kraftiga- re växt än de andra arterna.		1646. " <i>alba</i> , hvit — 5 — 20	
* Rhodanthe ; <i>Rosenblomster</i> , (Senecionideæ)			1647. " <i>rosea</i> , rosebröd — 5 — 20	
1629. " <i>atrosanguinea</i> , mörkröd — 25 — —			Begagnas till infattn o. s. v.	
1630. " <i>maculata</i> , fläckig — 10 — 1,25				
1631. " <i>alba</i> , rent hvit — 15 — —			* Scabiosa ; <i>Ångsvadd</i> , Enke- blomster, (Dipsacæ)	
1632. " <i>Manglesii</i> , rosenbröd — 10 — 90			1648. " <i>atropurpurea</i> (Asteroce- phalus) i flera färger — 5 — 20	
1633. " <i>major</i> , stor — 20 — —	Dessa sköna evighetsblmr blifva omkr. 1 fot höga och böra, om de odlas på kall- jörd, skyddas mot fuktighet och kall väderlek.		1649. " <i>candidissima</i> , hvit — 5 — 20	
Rhynchosarpa, se slingerväxt.			1650. " <i>grandiflora</i> (major) flera färger — 5 — 20	
Ricinus, se bladväxter.			1651. " <i>miniatia</i> , mönjeröd — 5 — 30	
Rumex, se bladväxter.			1652. " <i>nana</i> , låg — 5 — 20	
* Sabbatia , (Gentianææ)			1653. " <i>plena</i> , dubbelt — 10 — 50	
1634. " <i>campestris</i> — 15 — —	En liten mycket täck växt m. talrika vackert rosebröda blmr; är tyvärr för bräcklig att odlas på kalljörd. Trif- ves bäst under glas i kall drifbänk.		Alla 6 sorterna, 30 öre. Mycket vackra blmr för grupper och buketter. Odlas även i kruka för decörering af blomsterbord o. s. v.	
			Schizanthus ; <i>Sitsblomster</i> ; <i>Spaltbl.</i> (Serophulariacæ)	
			1654.* <i>Grahamii</i> . lila; rosenbröd — 5 — 25	
			1655. " <i>grandifl. oculatus</i> , storbl. — 5 — 30	
			1656. " <i>pinnatum</i> , hvit med lila — 5 — 20	
			1657. " <i>humilis</i> , låg — 5 — 20	
			1658.* <i>retusus</i> , carmin med gult — 8 — 20	
			2 a 4 fot höga, pryd., myc- ket tacksamt bl. grupp- och rabatty. Den sistn. sorten odlas bäst i kruka under glas i kall drifbänk eller kast.	
			Schizopetalum ; <i>Spaltblad</i> , (Cruciferae)	
			1659. " <i>Walkerii</i> — 8 — 60	

	å Port.	Ort.	å Port.	Ort.
	Rmt	Rd.	Rd.	Rd.
1 1/2 a 2 fot hög rabattv. med grönvitा, välvaktande, morgon och aften öppna blommor.				
Scyphanthus, se slingerväxter.				
Scotanthus, se slingerväxter.				
* Sedum; <i>Fetört; Fetknoppar,</i> (Crassulaceæ)				
1660. „ <i>coeruleum</i> (azureum)	10	—		
4 a 5 tum hög m. blekblå blmr. Kan användas som infattn. kring soligt belägna blomstergrupper.				
Senecio, se modeblommor.				
Sicyos, se slingerväxter.				
Sieyosperma, se slingerv.				
Silene, (Caryophylleæ)				
1661. „ <i>Armeria</i> , mörkröd, blekröd och hvit, 1 à 1 1/2 f. — 5 — 15				
1662. „ „ fl. albo, hv., 1 à 1 1/2 f. — 5 — 15				
1663. „ „ fl. carneo, blekröd, 1 à 1 1/2 fot	5	— 15		
1664. „ „ fl. rubro, röd, 1 à 1 1/2 f. — 5 — 15				
1665. „ <i>Atocion</i> , blekr. 8 à 10 tum — 5 — 20				
1666. „ <i>Bergerii</i> , (<i>Regia</i>) carmosinröd, 2 à 5 fot	5	— 20		
1667. „ <i>compacta</i> , carmin, 1 à 2 f. — 5 — 30				
1668. „ „ <i>grandifl.</i> , storblommig carmosinröd	10	— 90		
1669. „ <i>orientalis</i> , röd, 2 à 2 1/2 f. — 10 — 75				
1670. „ <i>ornata</i> , brunröd, 1 à 1 1/2 f. — 10 — 75				
1671. „ <i>pendula</i> (<i>rosea graeca</i> ; <i>scabrifolia</i>) rosentröd, hängande, 8 à 12 tum	5	— 10		
1672. „ „ fl. alba, hvit, 8 à 12 t. — 5 — 20				
1673. „ „ <i>ruberrima</i> , carm., blad och stjälkar brunr. — 5 — 20				
1674. „ „ fl. pl., omkr. 5 % af blimerna blifiva dubbla — 50 —				
1675. „ <i>procumbens</i> , röd, 6 à 8 t. — 5 — 20				
1676. „ <i>Pseudo-Atocion</i> , ljusr., 1 f. — 5 — 10				
1677. „ <i>reticulata</i> , carmosin, 2 f. — 5 — 10				
1678. „ <i>rubella</i> , röd, 1 1/2 à 2 fot	5	— 20		
1679. „ „ alba, hvit, 2 fot hög — 5 — 20				
Alla 19 sorterna, rdr 1,40.				
12 vackra sortér, 1,05.				
Alla här anförda Silene äro vackra, rikblommiga grupp- och rabattväxter. S. comp. & orient., som egentligen äro tvååriga, äro verkliga praktväxter. S. Atoe. pend. & proc. passa väl till infattn.				
* Solanum; <i>Trollbär</i> , (Solanaceæ)				
1680. „ <i>corniculatum</i>	10	— 75		
1681. „ <i>Gilo</i>	5	— 30		
1682. „ <i>heterogonium</i>	25	—		
1683. „ <i>Lycopersicum racemige-</i> rum	30	—		
1684. „ <i>Melongena</i> ; (<i>Äggplantan</i>) — 5 — 10				
1685. „ „ <i>fructo violaceo</i>	5	— 15		
Alla 6 sorterna, 75 öre.				
Dessa växter utm sig för sinnora, vackra frukter. Odlas i fet jord, antingen i kru-				
kor eller på varma ställen å fritt land.				
Öföra sorter, se bladväxter.				
Sorghum, se bladväxter				
* Sphaenogyne, (<i>Senecio-</i> nideæ)				
1686. „ <i>anthemoides</i> (<i>Arctotis cer-</i> nua, <i>pinnata</i> & <i>paradoxa</i>) — 10 — 75				
1687. „ <i>speciosa</i>	5	— 30		
Nätta växter m. vackra, nankinguala och violetta blmr, men mycket spensliga och ömtåliga för regn, hvarföre man bör odla några exempl. i krukor.				
* Spilanthes; <i>Fläckblomster</i> ; <i>Husarknopp</i> , (<i>Senecionideæ</i>)				
1688. „ <i>oleracea</i>	10	— 75		
Blommorna af denna växt Blommorna af denna växt lemnas den mot tandvärt begagnade paratincturen.				
* Statice; <i>Ornrot</i> , (<i>Plumba-</i> gineæ)				
1689. <i>Bonduellii</i> , gul	5	— 20		
1690. <i>Thouinii</i> , porslinblå	5	— 20		
Vackra växter, hvars afskurna och torkade blmr kunna användas till vinterbuketter, kransar o. s. v.				
Tagetes, se modeblommor.				
Thunbergia, se slingerväxter.				
* Tithonia, (<i>Senecionideæ</i>)				
1691. „ <i>helianthiflora</i>	8	— 60		
1692. „ <i>tagetiflora</i>	8	— 60		
6 a 8 fot höga växter med orangef. blomr. Plantorna ööra, eftersom de växa, flera gånger ompl. i större krukor, öfverv. i temp. växthus och om sommaren uppl. i god, fet jord på varma, lugna platser. Blifiva, om de väl behandlas, verkliga praktväxter.				
Tolpis, se Crepis.				
* Trachymene, (<i>Umbelli-feræ</i>)				
1693. „ <i>cocculaea</i> (<i>Didiscus coeruleus</i>) — 10 — 75				
2 a 3 fot hög m. blå blmr; odlas bäst under glas i kruka; anv. till dekorationer.				
Trifolium; <i>Klöver</i> , (<i>Leguminosæ</i>)				
1694. „ <i>incarnatum</i>	5	— 8		
1695. „ <i>suaveoleens</i>	5	— 25		
Den förstn. anv. till grupper, den sistn. till bredare inf.				
Trichosanthes, se gurkartade växter och slingerväxter.				
Tropaeolum, se sallydväxter och slingerväxter.				
Tunica, se Gypsophila Saxifr.				
* Verbena; <i>Jernört</i> , (<i>Verbenaceæ</i>)				
1696. „ <i>Aubletia</i>	10	— 60		
1697. „ „ <i>Drummondii</i>	10	— 60		
1698. „ <i>pulebella</i>	8	— 50		
1699. „ <i>pulcherima</i>	5	— 30		
1 à 3 fot höga växter m. carmosinröda, sundom hvitröda				

	à Port. Ort. Rmt Rd. ö. ö. Rd.	à Port. Ort. Rmt Rd. ö. ö. Rd.
blmr. Om de sås tidigt, blomma de första året. Man kan äfven så senare, sätta pl. i krukor, öfverv. dem i temp. bus och följ. vår utpl. dem på kalljord. De blomma mycket rikt och är särdeles vackra till grupper.		
* Veronica; Årenpris, (Scrophulariaceæ)		
1700. " glauca — 10 — 75		
1701. " alba — 10 — 75		
1702. " syriaca — 10 — 75		
Vicia; Vicka, (Papilionaceæ)		
1703. " Gerrardii — 5 — 30		
1704. " Pseudocracca — 5 — 30		
1705. " tricolor — 5 — 40		
Passa till att bekläda mindre fläckverk o. s. v.		
Viola, se modeblommor & fleråriga blomsterväxter.		
Viscaria; Tjärblomster, (Caryophyllæ)		
1706. " oculata, rosenröd. — 5 — 20		
1707. " Burdigii, hvit — 5 — 30		
1708. " Dunetti, lilafärgad — 5 — 40		
1709. " elegans pieta, purpurf. — 10 — 90		
1710. " splendens, lysande, röd — 8 — 50		
Utm. vackra, omkr. 1 fot höga, m. talrika, ganska stora, lifligt färgade blmr. Använtas till grupper & infatt.		
* Waltzia, (Senecionideæ)		
1711. " aurea — 35 — —		
1712. " corymbosa — 45 — —		
Vackra, gula evighetsblommor. Odlas bäst i kall drif-bänk; fordra sol och sandbl. jord.		

— et Cello —

VI. Två- och Fleråriga (Bienna och Perenna) Blomsterväxter:

De **tvååriga** blomsterväxterna, som äro betecknade med ett †, blixta störst och vackrast om de få blomma andra året, hvarför fröet ej bör sås för tidigt. Det utsås antingen i krukor, drifbänk eller på kall jord och enir de flesta tvååriga växter hafva tjocka, djupt gående rötter, hvilka vanligtvis tida men af att blixta stampade, måste de planteras, innan plantorna blixtat för stora, i god, djupt arbetad jord. De flesta af dem tåla ej vätta eller barfrost, hvarför de deremot böra skyddas. För dem, som väl tycka om blommor i sin trädgårdar, men ej äro i tillfälle att derut egena mycken tid, äro de **mångåriga** blomsterväxterna af stort värde, emedan de i det närmaste skräta sig sjelfva. Dock böra de hvar tredje, fjerde eller femte år upptagas och omplanteras, hvarvid man genom delning förökar de sorter, af hvilka man önskar flera exemplar. De flesta fleråriga växter fordrar djup, lös och god, men ej fet jord samt fria och öppna platser. De ömtåligare sorterna beträckas om vintern med torrt löf och granris, myrstack, granbarr eller löjung, men ej förr, än frosten nedsträngt några tum i jorden. Fröet af alla fleråriga växter utsås helst i krukor eller fat och plantorna utsättas sedan på kalljord. Fröet af vissa arter, t. ex. flera Umbelliferæ och Ranunculaceæ m. fl. ligger ofta ett helt år och ännu längre i jorden innan det gror, hvarför man ej bör för tidigt uttömma de med sådant frö besädda krukorna, eller antaga att fröet är odugligt.

- à Port. Ort.
Rmt Rd. ö. Rd. ö.
- Acanthus, se bladväxter.
- Achillea;** *Röleka, (Senecionideæ.)*
1726. „ *filipendula* (tanacetifolia)
2 à 3 fot hög, gul — 15 —
1727. „ *millefolium rubrum*, 2 fot
hög, röd — 10 — 75
1728. „ *nobilis (hispanica)* 1 à 2 f.
hög, hvit, välluktande — 20 —
1729. „ *tomentosa*, 8 à 16 tum hög,
guldgul — 15 —
- Rabattväxter, sou starkt ut-
breda sig genom iotskott,
hvarföre man hvarje år bör
med en spade afsticka och
bortrenna det överflödiga.
- Aconitum;** *Stormhatt; Jungfru Maria sko; Blåskor,*
(Ranunculaceæ.)
1730. „ *Cammarium* (Kusnezowii)
3 à 4 fot hög, ljusbla — 15 —
1731. „ *album*, 3 à 4 fot, hvit — 15 —
1732. „ *Lycoctonum*, 2 à 4 fot
hög, ljusgul — 15 —
1733. „ *Napellus*, 3 fot hög, blå — 10 —
- Allm. kända blommor till pl.
på rabatter eller i kanten af
buskpartiér. Fröet ligger of-
ta, ofven ett är i jorden in-
nan den gror.
- Actaea;** *Paddbär; Christoffers-
ört, (Ranunculaceæ.)*
1734. „ *spicata*, 1 fot hög, hvit. — 8 — 50
- Adenophora,** (Campanu-
laceæ.)
1735. „ *latifolia*, 2 f. h., blå — 15 —
1736. „ *stylosa*, 2 à 4 f., ljusbla — 12 —
- Vackra rabattv. m. hängan-
de, klocklikta blommor.
- Adonis;** *Gossen i det gröna,*
(Ranunculaceæ)
1737. „ *vernalis*, 6 tum h., guldgul — 5 — 20
- Särdeles vacker. Blommar
tidigt på våren. Fröet gror
långsamt.
- Ethionema,** (Cruciferae.)
1738. „ *persica*, rosenröd — 25 —
- Särdeles vacker infattningsv.
- Agrostemma;** *Åkerkrans;*
Klätt, (Caryophyllea.)
1739. †, *coronaria*, *Studentnejlikta*, — 5 — 20
1740. †, „ *fl. alba*, hvit — 5 — 20
1741. †, „ „ *bicolor*, tvärfärgad — 5 — 20
1742. †, „ „ *carminea splen-
dens*, lysande car-
minröd — 15 —
1743. †, „ *Flos Jovis*, *Jupiters-
blomster*, 1½ f. h., röd — 5 —
- Präktiga grupp- och rabattv.
Den förstn. bör skyddas mot
barfrost och fukt.
- Allium;** *Lök, (Asphodelæ.)*
1744. „ *magicum*, *Trollök*, hvit — 15 —
1745. „ *Moly*, 1 fot h., guldgul — 8 — 50
1746. „ *narcissæflorum*, hvit — 8 — 50
- à Port. Ort.
Rmt Rd. ö. Rd. ö.
1747. *Allium Victorialis*, *Ormlök*,
1 f. hög, grön; hvitgrön — 15 —
- Althea;** *Stockros, (Malvaceæ.)*
1848. †, *ficifolia*, *Guldmalva* — 10 — 90
- 5 à 6 fot hög rabattväxt. Öf-
riga sorter, se modeblmr &
ettäriga växter.
- Alyssum;** *Gräddädra; Sten-
ört, (Cruciferæ.)*
1749. „ *argenteum*, 2 à 3 fot hög,
silfverhvit — 8 — 50
1750. †, *Benthamii*, 1 f., hvit — 8 — 50
1751. „ *Wierzbickii*, 1 f., gul — 5 — 30
- Den förstn. bör öfverv. frost-
fritt och om våren uppl. A.
Benth. egnar sig till infattn.
och kan beh. som ettärig;
den sistn. är en vacker ra-
battväxt.
- Ammobium**, se ettäriga blmr.
- Amsonia,** (Apocynæ.)
1752. „ *angustifolia* (Tabernemon-
tana) — 10 — 90
1753. „ *salicifolia* — 10 — 75
- 1 à 2 fot h. rabattv. m. pryd.,
ljusbla blmr och till buket-
ter passande grönt. Betäck-
kas mot sträng köld.
- Anchusa;** *Oxtunga, (Bora-
gineæ.)*
1754. †, *italica (paniculata)* 4 à 6
f. h., blå — 5 — 30
1755. †, *sempervirens*, 1 à 1½ f. h. — 10 — 75
- Egna sig fört. till rabatter.
Blommor mycket rikt m. blå
blommor till sent på hösten.
- Anemone;** *Sippa; Anemon,*
(Ranunculaceæ.)
1756. „ *alba*, hvit — 15 —
1757. „ *albana*, violett — 15 —
1758. „ *coronaria*, i skönaste färger — 20 —
1759. „ *japonica* (Atragene jap.)
rödaktig — 25 —
1760. „ „ *alba (Honorie Jobert)*
hvit, vacker — 30 —
1761. „ *narcissæflora*, hvit — 20 —
1762. „ *Pulsatilla* (Pulsat. vulga-
ris) *Gökskulla* — 8 — 50
1763. „ *sylvestris*, hvit — 10 — 75
- Alla 8 sorterna, rdr 1,25.
Allesamman tidigt bl. ra-
batty. A. albana är vacker
till infattn. och blommor i
Maj; äfven A. alba och sylv.
kunna användas till bredare
infattn. Rotknölarne af A.
coronaria böra förvaras torra
öfver vintern och uppl. om
våren, sedan de fått svilla
i vatten.
- Anterium;** *Sandlilja,*
(Asphodelæ.)
1764. „ *Liliago* (Phalangium) — 10 — 90
1765. „ *Liliastrum* (Czackia) — 10 — 75
1766. „ *ramosum* (Phalangium) — 12 1 —
- 1½ à 2 fot höga rabattv.
som bl. i Maj och Juni med
hvita, vackra blommor.

- à Port. Ort.
Rmt Rd. ö. Rd. ö.
- Antirrhinum;** *Lejongap,*
(*Serophulariaceæ.*)
1767. " *Azarina,* (*Orontium; Azaria procumbens.*) 15 — —
- 1768 †, *multiforum.* 15 — —
Den förstn. har bruna blmr
och är särdeles passande till
amplar och klippanläggna.
Blommar i Juni och Juli.
- Apocynum;** *Flugfälta,*
(*Apocyneæ.*)
1769. " *androsaemifolium.* 15 — —
De små, blommorna hafva
retigla ståndare, hvilka sam-
mansluta sig och fasthålla de
inseckter, som vilja hemta ho-
nung ur blomman. Trives
igo trädgårdssjörd och fortpl.
sig ofta genom rotskott.
- Aquilegia;** *Akeleja,* (*Ranunculaceæ.*)
1770. " *atropurpurea, mörk.* 8 — 50
1771. " *canadensis, gul och röd.* 12 — 80
1772. " " *elatior, hög.* 12 — 80
1773. " *formosa fl. pl., dubbel.* 8 — 50
1774. " " *rosa pl., rosenf.* 8 — 50
1775. " " *rubra pl., röd.* 8 — 50
1776. " " *coelestina, blå.* 10 — —
1777. " *glandulosa, blåhvít, stor-*
blommig 15 — —
1778. " *jueunda, blå och hvit.* 15 — —
1779. " *leptoceros, blå med gult* 10 — 75
1780. " *lutea, gulaktig.* 10 — —
1781. " *pubiflora, blå eller hvit.* 10 — —
1782. " *Skinnerii, gul med rödt.* 20 — —
1783. " *sibirica, blå eller hvit.* 12 — 80
1784. " " *compacta violacea pl.*
 " " *rödviolett, dubbel.* 20 — —
1785. " " *fl. pl., dubbel.* 15 — —
1786. " *specabilis, mörkblå med*
 gult och grönt. 20 — —
1787. " *Vervæncana, blom. obet.,*
 men bladen brokiga, utm. 25 — —
1788. " *Wittmanniana unicolor, blå.* 10 — 60
1789. " " *carminea pl., röd, dubb.* 25 — —
1790. " " *coerulea corolla elba,*
 blå med hvitt. 30 — —
1791. " *vulgaris, i flera färger.* 5 — 10
1792. " " *fl. pl. dubbla i fl. färg.* 5 — 30
1793. " " *caryophylloides pl.,*
 neglikartad. 12 — 85
1794. " " *plenissima, i fl. färger.* 15 — —
1795. " " *Durandii pl. i fl. färger.* 10 — 80
1796. " " *stellata fl. pl., stjernlik,*
 flera färger. 8 — 50
1797. " " " *alba pl., hvit.* 15 — —
1798. " " " *carminea pl., röd.* 15 — —
Alla 29 sorterna, rdr 3,50.
15 vackra sorter, " 2,25.
8 " " 1,45.
Dessa utmärkt vackra, 1, 2 a
 $2\frac{1}{2}$, fot höga, i Juni blom-
mande grupp- och rabattv.
böra ej saknas i någon träd.
- gård. Alla arterna med un-
dantag af A. canadensis &
Skinnerii, som behöva en
tunn granatsbet. mot barfrost,
är mycket hårdiga och tåla
de strängaste vintrar.
- Arabis;** *Gåsört;* *Glis,* (*Cru-
ciferæ.)*
1799. " *albida, hvit.* 15 — —
1800. " *blepharophylla, röd.* 30 — —
Blomma redan i April eller
Maj och passa till bredare
infattn. Mycket eftersökta
af bien.
- Aralia;** se bladväxter.
- Armeria;** *Gräsnejliko, Trift,*
(*Plumbagineæ.)*
1801. " *cephalotes* (A. formosa;
latifol.; Statice cephal;
formosa; Pseudo-Armeria)
2 fot hög, rose nröd. 20 — —
1802. " *dianthoides, 1 f. h., ljusröd* 8 — 40
1803. " *maritima; Engelskt gräs,*
låg, ljusröd. 10 — 75
1804. " " *alba, hvit.* 12 — —
1805. " " *pinifolia, 1 f. hög, ljusröd* 10 — 75
1806. " " *plantaginea, ljusröd.* 10 — 75
- Alla 6 sorterna, 60 öre.
Den förstn. är en verklig
praktbl., som dock ej tål vä-
ra vintrar, utan bör öfver-
froströf och om värden uppl.
A. maritima är mycket om-
tyckt till infattn. och använ-
des äfven till grupper. De
öfriga äro vackra rabattv.
- Artemisia, se bladväxter.
- Asclepias;** *Svalrot,* (*Ascle-
piadæ.)*
1807. " *Douglasii (speciosa) 1 1/2*
f. h., hvit m. rödt och grönt — 12 — 90
1808. " " *incarnata, 3 à 4 f., röd* — 5 — 50
1809. " " *syriaca, 4 à 5 f., ljusröd* — 12 — 90
Vackra rabattv. Den förstn.
bör betäckas om vintern el-
ler förvaras inne. A. syri-
aca sprider sig mycket ge-
nom rotskott; bör därför
helst pl. så att den ej ska-
dar spädare växter.
- Asphodelus;** *Afodill,* (*As-
phodelæ.)*
1810. " *albus, hvit.* 15 — —
1811. " *luteus, gul.* 10 — 80
Praktfulla rabattv. m knip-
pevis hängande blmr. Be-
täckas mot sträng frost.
- Aster;** *Stjärnblomlster;* *Aster,*
(*Asteroidæ.)*
1812. " *alpinus, 4 à 6 tum h., blå.* 15 — —
1813. " *Amellus, 2 à 3 fot, blå.* 20 — —
1814. " *Nova Anglica, 6 à 10 fot,*
purpurviolet med gult. — 10 — —
1815. " *specabilis (elegans; spe-
ciosus) 2 à 3 fot, blå.* 12 — 90
Den förstn. blommar redan i
Maj och Juni; är en af de
vackraste flerfärgiga infattn. v.
De öfriga sorterna blomma
till långt in på hösten; äro

	<i>à Port.</i>	<i>Ort.</i>	<i>à Port.</i>	<i>Ort.</i>		
	Rmt	Rd. ö.	Rd. ö.	Rmt	Rd. ö.	Rd. ö.
mycket vackra på rabatter eller i kanten af buskpartier.						
Astragalus; Klöörter, (Leguminosæ.)						
1816 „ galegiformis, 5 à 8 fot	5	— 20	1835. <i>Campanula lactiflora</i> , 2 à 3 fot hög, blåvitt	12	— 90	
Vacker rabattv.; blmr i Juni & Juli.			1836. „ <i>latifolia</i> , 3 à 4 f. h., blå, violett eller hvit	10	— —	
Astrantia; Stjärnblomma, (Umbelliferæ.)			1837.† <i>Medium</i> ; <i>Marielklocka</i> , 2 à 3 f., ljusblå eller hvit	5	— 30	
1817. „ <i>helleborifolia</i>	15	— —	1838.† „ <i>fl. alba</i> , hvit	5	— 20	
1818. „ <i>major</i>	10	— 60	1839.† „ <i>fl. pl.</i> , dubbelt	15	— —	
1 à 2 fot höga rabattv. med fina, vackra blommor i Juni och Juli.			1840. „ <i>nitida</i> , 1½ f., skön, blå — 12 —			
Aubrieta, (Cruciferæ.)			1841. „ <i>nobilis</i> , 1½ à 2 fot, pur- röröd, vacker	15	— —	
1819. „ <i>deltoides</i> (<i>Alyssum</i> ; For- setia)	15	— —	1842. „ <i>persicifolia</i> , 2 à 3 fot, skön, blå	10	— 75	
1820. „ <i>græca</i> , storblommig	20	— —	1843. „ <i>alba</i> , 2 à 3 f., hvit	12	— 90	
Lägga; blomma i April, Maj & Juni; passa till infattn och att plantera på stenpartier.			1844. „ <i>pyramidalis</i> , 6 à 8 f., blå — 8 —			
Balsamita, se bladväxter.			1845. „ <i>alba</i> , 6 à 8 fot, hvit	10	— —	
Baptisia, (Papilionaceæ.)			1846. „ <i>rhomboidea</i> , 1 fot, blå	15	— —	
1821. „ <i>australis</i> , blå	10	— 75	1847. „ <i>fl. pl.</i> , dubbelt, blå	30	— —	
1822. „ <i>leucantha</i> , hvit	12	— 90	1848. „ <i>soldanelliciflora</i> , pl., 1 f.	40	— —	
2 à 3 fot höga rabattv. m. vackra blad och blommor.			1849. „ <i>rotundifolia</i> , 1 fot, blå eller hvit	10	— —	
Barbara, se bladväxter.			1850. „ <i>Trachelium</i> (<i>urticæfol.</i>) 2 à 3 fot, violblå	12	— —	
Bellis; Tusensköna, (Aster- oideæ.)			1851. „ <i>fl. alba</i> pl., 2 f., hvit	20	— —	
1823. „ <i>perennis</i>	25	— —	Alla 25 sorterna, rdr 2,85.			
Fröet, samladt af de bästa dubbla sorter lemnar omkr. 50 % utmärkta blommor.			6 vackra sorter, „ 1,60.			
Betonica; (Labiateæ.)			Alla dessa i Juni, Juli & Aug. blommande växter, iöro sär- deles vackra på rabatter. Till infattn, att större grupper är C. carpat., rhomb. m. dess varieteter & C. rotundif. väl passande. C. medium är praktfulla på grupper; kunna äfven med fördel odlas i kru- kor för dekorat. C. pyram. är, om den väl behandles, en af våra bättre praktväx- ter och borde användas mera än som sker. Om den odlas i krukor, som hos oss är bäst, bör den i mån af behof ompl. i större kärn. Tycker om lös och fet jord, mycket vatten, emellanåt gödselvatten, un- der sommaren en öppen plats i det fria och om vintern en frostfri, ej för fuktig lokal. Andra sorter, se ettåriga blomsterväxter.			
1824. „ <i>grandiflora</i> 1½ f. fot, röd	—	—	Catananche; Rasselblomster, (Cichoraceæ.)			
Rabattv. m. stora blommor i Juli & Augusti.			1852. „ <i>coerulea</i> , 3 fot h., blå	5	— 20	
Bocconia, se bladväxter.			1853. „ <i>bicolor</i> , 3 f. h., tväfärg. 5 — —			
Bryonia, se slingerväxter.			Pryddliga rabatt- och krukv., som blomma i Juli & Aug. Säckrast är att odlas nägra st. i krukor, öfverv. dem frostfr. och om vintern utpl. dem. På fritt land böra de betäckas väl öfver vintern.			
Buphthalmum; Öxöga, (Asteroideæ.)			Cedronella; Cedronell, (La- biateæ.)			
1825. „ <i>cordifol.</i> (<i>Teleckia</i>) se bladv.			1854. „ <i>cana</i> , 3 fot hög, röd	10	— —	
„ <i>salicifolium</i> , 1 à 2 fot, gul	10	— 75	Vacker rabattv. som blom- mar i Juli. Bladen innehålla en etherisk olja och sprida om de gnuggas en svag, aro- matisk vällukt.			
Vacker, 1 Augusti och Sep- tember blommande rabattv.						
Calamintha; Hartimjan, (Labiateæ.)						
1826. „ <i>grandifl.</i> (<i>Melissa</i> ; <i>Thymus</i>)	10	— —				
1 fot hög rabattv. m. långa, vackra, purpurröda blmr i Juli & Augusti. Betäckas.						
Campanula; Klockblomster, (Campanulaceæ.)						
1827. „ <i>alliariifolia</i> (<i>lamifolia</i>) 2						
fot hög, hvit	10	— —				
1828.† <i>americana</i> (<i>acuminata</i> ; <i>asteroides obliqua</i>) 3 à 5						
fot hög, blå; betäckas.	10	— —				
1829. „ <i>carpathica</i> , 1 fot hög, blå	8	— 60				
1830. „ <i>alba</i> , 1 fot h., hvit	10	— —				
1831.† <i>eximia</i> , 1½ fot, violblå	8	— 65				
1832. „ <i>grandis</i> , 2 à 3 f., ljusblå	10	— —				
1833. „ <i>fl. alba</i> , 2 à 3 f., hvit	15	— —				
1834. „ <i>gummifera</i> (<i>betonicafol.</i> ; <i>sarmatica</i>) 2 fot, ljusblå	12	— 90				

	à Port. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.	à Port. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.
Centaurea; Klint, (Cynareæ.)				
1855. " dealbata, 11½ fot, röd . — 20 —			1874.† Cynogl. glochidiatum, 3 f. h. — 5 — 30	
1856. " macrocephala, 1 à 3 f., gul — 10 — 75			Rabattv. m. himmelsblå blmtr, från Juni till hösten.	
1857. " montana, 1½ fot, him- melsblå — 10 —			Dahlia. se Georgina.	
1858. " Vackra, i Juli & Aug. blom- mande rabattväxter.			Delphinium; Riddersporre, (Ranunculaceæ.)	
Cerastium, se bladväxter.			1875. " bicolor, 8 à 10 tum h, blå — 10 — 75	
Chelone; Sköldblomster, (Scrophulariaceæ.)			1876. " chinensis, 1 f. h., fl. färger — 5 — 30	
1858. " barbata, 2 à 3 fot, röd . — 5 — 35			1877. " " album grandifl. 1 fot, — 8 — 40	
1859. " Toreyii, 3 à 4 f., skarl. — 15 —			1878. " " pumilum, låg, fl. färger — 5 — 30	
1860. " glabra, 2 à 3 fot, hvit . — 15 —			1879. " " album, låg, hvit . — 8 — 50	
1861. " Vackra, i Aug. & Sept blom- mande rabattv. Böra väl be- täckas om vintern, eller öf- vervintras i en frostfri lokal.			1880. " " atrocoeruleum, mörk — 8 — 50	
Clematis, se slingerväxter.			1881. " elatum, 4 à 5 fot, blå . — 8 — 40	
Cole hic um; Tidlösa; Nalna <i>Jungfrun, (Melanthaceæ.)</i>			1882. " formosum, 2 f. h., mörkblå — 8 — 50	
1861. " autunnale, roseoröd . . . — 5 — 25			1883. " " coelestinum, 2 f. hög, ljusblå — 20 —	
Bildar stora rotknölar och, om våren, stora, breda blad, som vissa om sommaren. Mot hösten framkomma de vackra, krokuslikta blmerna. Fröet gror ejentl & långsamt.			1884. " " album cocroleum, porslinblå — 25 —	
Commelina, se ettåriga växter.			1885. " hybridum, 2 à 5 f., många olika nyanser — 10 — 75	
Convallaria; Liljekonvalje, (Smilacineæ.)			1886. " " cheiranthiflorum, dub- bel, utmärkt — 25 —	
1862. " bifolia (Majanthem. bif.)			1887. " fl. pl., dubb., fl. färger — 15 —	
Ekorrebär — 15 —			1888. " Dagobert — 20 —	
1863. " japonica, 1 à 2 fot, . . . — 5 — 30			1889. " Gerard Leigh — 15 —	
1864. " majalis, vanlig — 8 — 50			1890. " Herman Stenger, dubb. — 20 —	
1865. " major, stor — 15 —			1891. " Nancyanum, dubbel — 20 —	
1866. " " rosea, roseoröd . . . — 15 —			1892. " " hyacinthiflorum, dub- bel, flera färger — 20 —	
1867. " Polygonatum, 2 fot hög — 5 — 30			1893. " Luigi Orloff, dubb., blå — 25 —	
C. bifol. & maj. är mycket vackra till infattn. af orm- bunkgrupper. C. japon & polyg. pl. på rabatter och i kanterna af buskpartier.			1894. " speciosum, 5 à 7 fot, blå — 15 —	
Coreopsis, (Senecionideæ.)			Alla 20 sorterna, rdr 2,75.	
1868. " (Calliopsis) Atkinsonii, 3 à 4 fot, gul med brunt . — 5 — 20			10 vackra sorter, " 1,75.	
1869. " grandifl. 2 à 4 fot, gul . — 10 —			Allesamma härstil de vack- raste grupp- och rabattv. D. chin. kunnna alla behandlas som ettåriga, men blifva då ej så kraftfulla och vackra, som dä pl. öfver. Af D. for- mos. & dess variet. fas praktf. grupper och de dubbbla for- merna är fört. till odl. i krukor. Fröet gror ofta långsamt.	
1870. " lanceolata (Chrysomela)				
3 à 4 fot, gul — 8 — 50			Desmodium, (Leguminosæ.)	
Präktiga rabattv., som blom- ma från Juli till sent på hösten.			1895. " canadense (Hedysarum sea- brum) 2 à 3 fot, röd . . . — 15 —	
Crambe; Strandkål, (Cru- ciferæ.)			Vacker rabattv. m. prydly. blommor i Juli & Augusti.	
1871. " maritima — 5 — 6			Dianthus; Neglika, (Caryo- phyllæ.)	
Bildar vackra grupper på gräsmattor; se köksväxter, rubriken Sparrisväxter.			1896. " arenarius, Sandnegl., röd. — 12 — 90	
Crucianella; Korsblad, (Ru- (biaceæ.)			1897. " atrococineus, 1 fot hög, skarlakanfärgad — 8 — 40	
1872. " stylosa, roseoröd . . . — 5 — 20			1898. " cruentus, 1 à 2 f., blodröd — 15 —	
Endast några tum hög infatt- ningsv. m. frisk, fin grönsva och mycket prydly blmr, hvil- ka, sällv som bladen är användbara i buketter.			1899. " deltoideus; Ängsneglika, låg, röd — 5 — 30	
Cynoglossum; Hundtunga; Munkliss, (Boragineæ.)			1900. " albus, låg, hvit — 8 — 50	
1873.† coelestinum, 2 fot hög . — 5 — 30			1901. " dentosus, 1 fot hög, röd. — 15 —	
			1902. " plumarius; Fjäderneglika, 8 à 10 tum hög — 5 — 30	
			1903. " fl. pl., dubbel — 25 —	
			1904. " nanus fl. pl., låg, dubb. — 35 —	
			1905. " superbus, 2 f., hvit & röd — 10 — 75	
			1906. " grandifl., storblommig — 10 — 75	

à Port. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

Alla 11 sorterna, rdr 1,25.

Utm, på flerfärdiga sätt, i rabatter, krukor, grupper o. s. v. användbara prydnadsvä. Till infattu. ärö D. deltoideus & plurarius, synnerligen den låga formen, utm. väl passande. D. barbatus, caryophyllus och chinenensis finnas upptagna bland modellblommorna.

Dicythra; Blomsterlyra, (Fumariaceæ.)

1907. " spectabilis - 15 --

Känd och omtyckt prydnadsvä. för såväl fritt land, som för krukor. Fröt gror långsamt.

Dictamnus; Diktamn, (Rutaceæ.)

1908. " angustifol., 2 f., purpurröd - 25 --

1909. " Fraxinella (albus var. ru-

ber) 1 à 3 f. h., röd - 15 --

1910. " alba (D. albus) hvit . - 15 --

Praktf., 1 à 3 fot höga, starkt luktande rabattv. m. vackra blommor i Juli & Juli.

Digitalis; Fingerborgsblomster, (Scrophulariaceæ.)

1911.† Buxbaumii, 6 à 7 fot,

hvitgul - 8 - 50

1912. " ferruginea, 4 à 6 f., gul-

aktig med rostbrunt . - 8 - 50

1913. " gigantea, stor - 5 - 35

1914. " grandiflora (ambigua) 2

fot hög, blekgul - 8 - 50

1915.† lanata, 2 f., hvit m. brunt - 5 - 30

1916.† purpurea, 2 à 3 f., rödf. - 5 - 20

1917.† " alba, 2 fot, hvit . - 3 - 30

1918.† " gloxinoides, praktf. var. - 20 --

1919.† " maculata Iveryana,

utmärkt, fläckig - 25 --

Alla 9 sorterna, 75 öre.

Präktiga, i Juni & Juli blommande rabatty. Till grupper passar bäst D. purp. m. dess varieteter.

Dodecatheon; Gudsgäfva;

Gudsblomster, (Primulaceæ.)

1920. integrifolium, 1 f., mörkröd - 35 --

1921. Meadia, 1 fot, lilafärgad . - 15 --

Utm. vackra, i Maj & Juni bl. växter för fritt land eller krukor. På kalljord beträckas de under vintern.

Doronicum; Gemsrot, (Senecionideæ.)

1922. " Columnæ (cordifolia) 2 f.

hög, gul - 10 --

1923. " plantagineum, 1 fot, gul - 10 --

Rabattv., som förtjena att od-las för sin tidiga blomstring.

Dracocephalum; Drak-hufud, (Labiateæ.)

1924. " altaiense, blå - 8 - 50

1925. " argunense, blå - 8 - 50

1926. " austriacum, mörkblå - 8 - 50

1927. " canescens, blå - 5 - 20

à Port. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

1928. *Dracoceph. peregrinum*, blå - 10 - 60

1929. " " grandifl., storblommig - 15 --

1930. " *Ruyschianum*, blå - 10 - 751931. " *virginianum* (*Physostegia*) - 10 - 75

Alla 8 sorterna, 65 öre.

1 à 2 fot höga, från Juni till

i Aug. bl. vackra rabattv.

Echinacea; (Senecionideæ.)1932. " *angustifolia* - 20 --1933. " *purpurea* - 15 --

Vackra rabattv. m. gula blmr

i Augusti & September.

Echinops; Klottistel, (Gynanreæ.)1934. " *bannaticus* (*ruthenicus*) 4

à 5 fot hög, blå - 10 --

1935.† *exaltatus* (*strictus*) 5 à 7 f. - 25 --1936. " *paniculatus* (*spheerocephalus* var. *glabratus*) 6 à 10 f. - 8 - 501937. " *Ritro*, 4 à 6 fot, ljusblå - 20 --

Vackra, egendoml., i Juli &

Aug. blm. tistleväxter m.

stora, klotrunda, ljus- och

mörkblå blomhuvuden. Anv.

till pl. på gräsplanner, i kan-

ten af buskp, eller på breda

rabatter.

Erigeron; Binka, (Asteroideæ.)1938. " *glabellum*, 4 à 8 tum h. - 10 --1939. " *speciosum* (*Stenactis* sp.)

2 à 3 fot hög - 5 - 30

Särdeles vackra grupp- och

rabattv. m. blå blmr i Juni,

Juli & Aug. Den förstn. pas-

sar äfven till infattningar.

Eriogonum; (Senecionideæ.)1940. " *umbellatum*, gul - 20 --

Låge, länge bl. rabattv. med

talrika blomhuvuden.

Eryngium; Manskraft, (Umbelliferæ.)1941. " *alpinum*, 1 à 3 fot hög. - 5 - 301942. " *giganteum*, 4 à 5 fot h. - 5 - 301943. " *maritimum*, 1 à 2 fot h. - 12 - 901944. " *planum*, 2 fot hög - 5 - 30

Egendoml., vackra, under

sommaren bl. rabattv. m. blå

eller hvita blmr. Fröt gror

långsamt och ojemnt, såvida

det ej säs genast efter mog-

naden. Så är förhållandet m.

frivet af de fiesta Umbelliferæ.

Erysimum; Vinterkrasse, (Cruciferæ)1945. " *ochroleucum* (*Cheiranthus*

ochr., *decumbens* & *du-*

bius; *Erysimum pollens*) - 20 --

6 à 8 tum hög under våren

och sommaren bl. växt med

gula blmr för rabatter. För-

drar god jord och ett torrt,

soligt läge.

Eupatorium; Flockblomster, (Eupatoriaceæ)1946. " *ageratoides* (*urticafol.*, *al-*

tissimum) 4 à 6 fot hög - 15 --

1947. " *Fraserii*, 3 à 4 fot hög - 10 --

		à Port. Ort.
	Rmt Rd. ö.	Rd. ö.
	Under sommaren & hösten blommande rabatväxter.	
Ferula; <i>Dyfvelsträck</i> , (<i>Um- belliferae</i>)		
1948. „ <i>communis</i> , 3 à 4 fot hög —	5	— 30
Har mycket vackra blad och passar till pl. på gräsplaner, i kanten av buskpartier o. s. v. Fröet ligger ofta i 1 a 2 år i jorden.		
Fritillaria; <i>Kesarkrona</i> , (<i>Liliaceæ</i>)		
1949. „ <i>imperialis</i> , blandade . . . —	15	— —
1950. „ <i>Meleagris</i> ; <i>Damspelsblom- ster</i> , blandade . . . —	15	— —
Bekanta, omt. prydnadsv.		
Funkia; (<i>Liliaceæ</i>)		
1951. „ <i>coerulea</i> , blå —	15	— —
1952. „ <i>lancifol.</i> fol. var., brokbl. —	15	— —
1953. „ <i>Sieboldii</i> , hvit eller blå . . . —	15	— —
Praktf. rabattv. Fröet gror längsamt.		
Gaillardia , (<i>Senecionideæ</i>)		
1954. „ <i>aristata</i> (<i>bicolor</i>) —	5	— 35
1955. „ <i>Bosselaria</i> , praktfull —	15	— —
1956. „ <i>grandiflora speciosa</i> —	15	— —
1957. „ <i>vera</i> —	8	— 50
1958. „ <i>Loiselii</i> —	8	— 60
1959. „ <i>pulchella</i> —	5	— 30
1960. „ <i>Richardsonii</i> —	5	— 30
Alla 7 sorterna, 55 öre		
Utn. fr. $1\frac{1}{2}$ till 3 à 4 fot höga praktv. Blomna äro stora, mycket vackra, gula med brunt & rött och framkomma under sommaren & hösten.		
Galuga , (<i>Leguminosæ</i>)		
1961. „ <i>officinalis</i> , 3 à 5 fot hög —	5	— 20
1962. „ <i>orientalis</i> (<i>montana</i>) 2 à 4 f. —	10	— 60
1963. „ <i>persica</i> , 2 à 3 fot, hvit. —	5	— 20
Vackra, i Juni, Juli & Aug. blommande rabatväxter.		
Gentiana ; <i>Höstklöcka</i> , (<i>Gen- tianæ</i>)		
1964. „ <i>acaulis</i> , låg, blå, praktf. —	15	— —
1965. „ <i>asclepiadea</i> (<i>Pneumonan- the plicata</i>) 1 à 2 fot hög, skön, blå —	30	— —
1966. „ <i>catesbeii</i> (<i>Saponaria</i>) $1\frac{1}{2}$ fot hög, blå eller hvit . . . —	20	— —
1967. „ <i>lutea</i> (<i>Asterios</i>) 3 à 4 f., gnl —	15	— —
1968. „ <i>macrophylla</i> (<i>Heppion</i> <i>macrophylla</i>) blå —	10	— 80
1969. „ <i>Pneumonanthe</i> , 4 à 8 tum hög, skön, blå —	20	— —
Alla 6 sorterna, 1 rdr. Mycket vackra, under värren, somm. & hösten bl. rabattv. G. <i>acaulis</i> är, på fuktig, ler- blandad jord, en praktfull infästningsväxt.		
Georgina; Dahlia; Geor- gin , (<i>Asteroideæ</i>)		
1970. „ <i>coccinea</i> , 1 à 2 fot, skar- lakkoröd, enkel —	20	— —

	à Port. Ort.	
	Rmt Rd. ö. Rd. ö.	
1971. <i>Georgina glabrata</i> , 1 à 2 f., lilafärgad, enkel — 10 — 70		
1972. " <i>glabr. fl. alba</i> , hvit, enkel — 10 — 70		
1973. " <i>variabilis</i> , vanlig — 35 —		
1974. " <i>Liliput</i> , småblommig — 50 —		
De tressne förstör. sorterna kunna behandl. som ettåriga, d. v. s. att fröet utsätts hvarje år, då de blomma fr. Juni t. hösten, men de blifvs dock större och vackrare om rotknölarna öfvervintras. Fröet af de vanl. georginerna (G. variab.) är samladt af de vackraste dubbla sorter.		
Geranium; Storknäbb, (Geraniaceæ)		
1975. " <i>sanguineum</i> — 20 —		
Rabatty, med stora, vackra, carminröda blommor.		
Geum; Neglikrot, (Rosaceæ)		
1976. " <i>chiloense</i> (<i>coccineum</i>) — 8 — 50		
1977. " <i>coccineum</i> — 8 — 50		
1978. " <i>grandiflorum</i> — 10 — 75		
Dessa prydл. 1 à 1½ fot höga växter pl. büst i krukor, öfverv. frostfr. och uppl. om våren i god jord. De utveckla under hela sommaren en mängd präktiga, högr. blmr.		
Glaucium; Strandvallmo, (Papaveraceæ)		
1979.† <i>fulvum</i> (<i>grandifl.</i>) gulrød — 10 — 75		
1980.† <i>luteum</i> , gul — 5 — 35		
Från Juli till hösten blom., 1 à 2 fot höga rabattväxter.		
Globularia; Bergskrabba, (Globularieæ)		
1981. " <i>trichosantha</i> — 20 —		
Låg infattningssv. med frisk grönsva och, om våren, lysande, blå blommor.		
Gypsophila; Gipsblomster, (Caryophylleæ)		
1982. " <i>acutifolia</i> , 3 à 4 fot hög — 5 — 20		
1983. " <i>glauca</i> (<i>Stevениi</i> ; <i>repens</i>) 1½ à 2 fot hög, hvit . — 8 — 50		
1984. " <i>paniculata</i> , 3 à 4 fot. — 5 — 20		
Hafva små, men ofantl. talr., hvita blmr. Anv. mycket till buketter, hyartill de är särdeles vackra. Skyddas mot barfrost.		
Hedysarum; Tuppufvud, (Leguminosæ)		
1985. " <i>coronarium</i> , 2 à 3 fot, röd — 5 — 20		
1986. " <i>fl. albo</i> , 2 à 3 f. hv. — 5 — 20		
1987. " <i>sibiricum</i> , 3 fot, violettröd — 10 —		
Särdeles vackra, under Juni & Juli bl. rabattv. H. coron. är ömtålig för sträng frost & fuktighet; böra derför öfverv. frostfr. & torrt samt om våren uppl. på grupper.		
Helenium, (Senecionideæ)		
1988. " <i>atropurpureum</i> , purpuröd — 25 —		
1989. " <i>autumnalis</i> , 4 à 6 f, gul — 10 —		
1990. " <i>californicum</i> , 3 à 4 f, gul — 10 —		
1991. " <i>Hoopesii</i> , orangef. storbl. 8 — 50		

	à Port.	Ort.	à Port.	Ort.
	Rmt Rd. ö.	Rd. ö.	Rmt Rd. ö.	Rd. ö.
Stätiliga, fr. Juli till Okt. bl. växter, som kunnar pl. på råbatter eller i kanten af buskpartier. De höga sorterna kunnar ifven anv. bland fleråriga bladv. på fritt land.				
Helianthemum; Sölvända, (Cistinæ)				
1992. „ luteum, $\frac{1}{2}$ fot hög, gul — 10 — —				
1993. „ mutabile, $\frac{1}{2}$ fot, hvit, senare röd — 5 — 30				
Nätta växter; förra torr, sandbl. jord och torra platser. Beträckas under stark barfrost med grannisqvistar.				
Helianthus; Solros; (Senecionideæ)				
1994. „ Maximilianus, gul — 15 — —				
6 a 8 fot hög, om hösten bl. växt; passande bland fleråriga bladv., i kanten af större buskpartier eller som fristående på gräsplaner.				
Helleborus; Prustrot; Nyssrot, (Ranunculaceæ)				
1995. „ atrorubens — 40 — —				
1996. „ foetidus — 30 — —				
1997. „ hyemalis (Eranthis) 3 à 4 t. — 30 — —				
1998. „ niger — 35 — —				
Intrassanta, omkr. 1 fot höga rabattv., som blomma i Mars & April, stundom senare. H. niger utvecklar ofta sina st. hvita blmr vintertiden under snön och H. hyemal. har små gula blmr, framkommande så snart snön smält och frosten grätt nägra tum ur jorden.				
Hepatica; Sippa; Blåsippa; (Anemon., Ranunculaceæ)				
1999. „ triloba (Anem. hepatic.) blå — 30 — —				
2000. „ fl. alba, hvit — 20 — —				
2001. „ fl. rubra, röd — 20 — —				
Tidigt bl. växter; kunnapl. i krukor och drifvas till blomning i Februari och Mars.				
Heracleum, se bladväxter.				
Hesperis; Nattviol, (Cruciferæ)				
2002.†, motronalis, 3 fot, röd. — 5 — 15				
2003.†, fl. alba, 3 fot, hvit — 5 — 15				
2004.†, tristis, $\frac{1}{2}$ f., grå, vällukt. — 8 — 50				
Bloomma i Juni och Juli med vackra, isymerhet om afton- nen och natten vällukt. blmr. Fortpl. ofta genom sjelfsädd.				
Hieracium; Hökblomster, (Chichoraceæ)				
2005. „ aurantiacum, $\frac{1}{2}$ f. hög — 10 — 60				
Använtes till breda infattn. Fortpl. gen. utfallande frö.				
Hyoscyamus; Bolmört, (Solanaceæ)				
2006. „ orientalis. 2 fot, violett — 30 — —				
Tidigt om värten bl. rabattv.				
Hypericum; Johannisholmster, (Hypericinæ)				
2007. „ Ascyon, $\frac{1}{2}$ fot hög — 10 — —				
2008. „ elegans, 1 à $\frac{1}{2}$ fot hög — 8 — 50				
Hypericum; Pyramidalblomster, (Hypericinæ)				
2009. Hypericum pyramidatum, 4 à 6 fot — 15 — —				
Prydliga rabattv. med gula blommor i Juli och Augusti.				
Iberis; Flirkrage, (Cruci- feræ)				
2010. „ sempervirens, 8 à 12 tum — 12 — —				
2011. „ semperflorens, 1 fot hög — 12 — —				
2012. „ Tenoreana, 10 tum hög — 8 — 50				
Egna sig allesamman till in- fattn. De båda förstn. kunnar pl. i krukor och drifvas till blomm. i Mars & April. Be- träckas under stark barfrost.				
Inula; Aländsrot, (Asteroïdæ)				
2013. „ suaveolens $1\frac{1}{2}$ fot hög, gul, välluktande — 15 — —				
„ andra sorter, se bladväxter.				
Ipomea, se slingerväxter.				
Iris; Svärdsilja, (Iridæ)				
2014. „ anglica, i flera färger. — 10 — 60				
2015. „ foetidissima $1\frac{1}{2}$ f., blåviol. — 10 — 75				
2016. „ furcata, 2 fot hög, blå — 10 — 75				
2017. „ germanica, $1\frac{1}{2}$ fot hög, i många färger — 15 — —				
2018. „ graminea, 3 à 4 fot, blå — 10 — —				
2019. „ Guldenstädtii, guldgul — 8 — 50				
2020. „ hispanica (Xiphium) i flera färger — 10 — 75				
2021. „ pumila nova, låg, blan- dade i flera praktf. färger — 25 — —				
Alla 8 sorterna, 85 öre. Dessa praktf. grupp- eller ra- battv. borde finnas i hvarje blomsterträdgård. I. pumila är äfven en af de vackraste infattningsväxter.				
Jasione; Färrayanzel; Mon- ke, (Campanulaceæ)				
2022. „ humilis, blå — 20 — —				
En låg, under sommaren blom., särdeles prydlig. växt för rabatter & infattningar.				
Knautia, se bladväxter.				
Lathyrus, se slingerväxter.				
Leontice; Lejonblad, (Ber- beridæ)				
2023. „ Leontopetalum, äkta — 20 — —				
Denna intrassanta, sällsynta växt har tidigt om värten gula blmr. Täl ej barfrost eller vjinterfuktighet, hvarföre de på fritt land stående exempl. deremot bura skyddas. Säk- rast är dock att pl. några ex. i krukor, öfverv. dem frostfr. och uppl. dem om värten på passande platser.				
Liatris, (Eupatoriaceæ)				
2024. „ spicata (picta, gracilis; Seratula) — 15 — —				
Vacker; blommor om som- maren. Bör antingen sorg- fältigt beträckas eller öfverv. frostfr.				
Linaria; Flugblomster, (Scrophulariaceæ)				
2025. „ alpina, mörkblå — 20 — —				

- à Port. Ort.
Rmt Rd. ö. Rd. ö.
2026. *Linaria tristis* (Antirrhin.)
askgrå, blekg. & purpur. — 10 — 60
” andra sorten, se ettåriga bl.
Den förstn. är synnerligen
vacker till synpanlägg.,
stemparter och amplar. L.
tristis är en vacker rabattv.
Båda blomma under somm.
- Lindelofia*, se *Omphalodes*.
- Linum**; *Lin*; *Här*, (Linaceae)
2027. ” *alpinum*, himmelsblå. — 10 — 75
2028. ” *anglicum*, 2 à 3 f., ljusblå — 12 — 90
2029. ” *candidissimum*, hvit. — 20 —
2030. ” *campanulatum grandifl.* gul — 12 — 90
2031. ” *Levisii variegata*. — 5 — 35
2032. ” *narbonense*, 1 à 2 f., blå — 8 — 40
2033. ” *perenne*, 2 à 3 fot, blå. — 5 — 20
2034. ” fl albo, 2 à 3 f., hvit — 5 — 35
- Alla 8 sorterna, 65 öre.
Förtr. grupp- & rabattväxter,
blommande i Juni & Juli. L.
campanul. öfver, särkast i
växthus vid + 5 a 6°; de
öfriga fordra tunn betäckning
under stark barfrost.
- Lobelia*, se ettåriga & krukv.
- Lunaria**; *Månniol*, (Cruciferae)
- 2035.†, *biennis* (*annua*) *Judea silf-verpenningar*, 1 à 2 fot,
purpröd eller hvit. — 8 — 50
2036. ” *rediviva*, 1 à 3 f., violett — 15 —
Särdeles vackra för rabatter
& grupper. Den förstn. bör
sås hvarje år.
- Lupinus**; *Vargböna*; *Lupin*, (Leguminosae)
2037. ” *arbustus*, lila med blårödt — 8 — 50
2038. ” *Douglasii*, blå, violett. — 8 — 50
2039. ” *elegans*, violett. — 8 — 30
2040. ” *grandifolius* (*macrophyllus*)
brun eller violett. — 5 — 30
2041. ” ” *odoratus*, välluktande — 10 —
2042. ” ” *mexicanus*, blå, blåhvitt. — 10 —
2043. ” ” *perennis*, blå, violett. — 5 — 20
2044. ” ” *polyphyllus*, blå, violett. — 5 — 20
2045. ” ” *albus*, hvit. — 5 — 30
2046. ” ” *atropurpureus*, mörkr. — 10 — 75
2047. ” ” *bicolor*, blåhvitt. — 10 — 75
- Alla 11 sorterna, 75 öre.
Utm. 2 à 4 fot höga, från
Juni till i Aug. bl. rabattv.
Fordra god jord och en tunn
gransrbetäckn. mot barfrost.
- Lychnis**; *Studentnegl.*; *Tjär-blomster*, (Caryophyllae)
2048. ” *calcedonica*, 3 à 5 f., röd — 5 — 20
2049. ” fl albo, hvit. — 5 — 30
2050. ” ” ” *carnea*, ljusröd. — 5 — 20
2051. ” ” ” *fulgens*, 2 à 2 1/2 f., skarl.röd — 15 —
2052. ” ” ” *grandiflora gigantea*, 1 f.
hög, skarlanröd. — 30 —
2053. ” *Haageana* (*hybrida*) 1 fot,
i många färger. — 20 —
2054. ” ” ” *atrococcinea*, mörkröd — 25 —
- à Port. Ort.
Rmt Rd. ö. Rd. ö.
2055. *Lychnis Haageana carnea*,
ljusröd. — — 30 —
2056. ” *Sieboldii* (*grandiflora alba*)
1 fot hög, hvit. — — 30 —
2057. ” *Viscaria splendens*, 1 fot,
carmosinröd. — — 8 — 50
- Alla 10 sorterna, rdr 1,55.
Dessa praktf. under Juni &
Aug. i alla nyanser fr. hvitt
till mörkrödt varierande bl.,
äro förtjenta af den största
uppmärksamhet. De kunna
anv. såväl till grupper & ra-
batter, som till odl. i krukor.
Till sistn. ändamål äro L.
grandifl., Haageana & Siebol-
dii vackrast. Utefordra dessa
sorter en tunn betäckning
mot barfrost.
- Lysimachia**; *Lysing*, (Primulaceae)
- 2058.†, *atropurpurea*, mörkr. vack. — 8 — 50
Odlas bätti i krukor, öfver,
frostfritt och utpl. om våren.
- Lythrum**; *Tackelblomster*, (Lythraceae)
2059. ” *Salicaria* (*roseum superbum*)
2 à 4 fot hög, röd — 5 — 30
2060. ” *virgatum*, 3 à 4 f., röd — 10 —
Mycket vackra till rabatter;
fordra en god, något fuktig
jordmän.
- Macheranthera**, (Asteroides)
2061. ” *glabra*, 1 1/2 fot, blå. — 25 —
Rikbl. rabattv.; kan äfven
användas till bredare infästn.
Blommar i Juni & Augusti.
- Malva**; *Kattost*, (Malvaceae)
2062. ” *Morenii* (*Alcea* var.) 1 1/2
fot hög, rosearöd. — 5 — 30
2063. ” *moschata*, 2 à 3 fot, hvit — 10 — 75
Vackra rabattv. Den sistn.
har en svag bisamlukt.
- Michauxia**, (Campanulaceae)
- 2064.†, *campanuloides*, (*strigosa*) — 25 —
4 à 5 fot hög rabattv. m. tal-
rika, stora, hvita, något blå-
violetter blm. i Juli & Sept.
- Monarda**, (Labiateae)
2065. ” *didyma* (*coecinea*) röd. — 25 —
2066. ” *elegans*, röd. — — 25 —
2067. ” *splendens*, röd. — — 25 —
Sköna rabattv., hvars blad
lema ett helsöamt, välsma-
kande thé.
- Morina**, (Dipsaceae)
2068. ” *longifolia*, rosearöd. — — 20 —
Tistellik växt m. vackra blm.
- Myosotis**; *Försgämigej*, (Bo-
raginæ)
2069. ” *alpestris*, blå. — — 8 — 50
2070. ” ” fl. albo, hvit. — — 8 — 60
2071. ” ” ” *roseo*, rödaktig. — 12 — 90
2072. ” *azorica*, mörkblå. — — 20 —
2073. ” *palustris*, åkta, blå. — — 12 — 90
2074. ” *sylvatica*, blå. — — 5 — 35
- Alla 6 sorterna, 55 öre.

å Port. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

Dessa allm. omtyckta blmr
är särdeles vackra till grupper,
infattn. och krukor. M.
azorica måste öfverv. inomhus
och M. palustris trifves
endast på fuktiga ställen;
de öfr. växa och blomma rikt
i vanl. god trädgårdsjord, men
fordra skydd mot barfrost.

Obeliscaria; Obeliskblomster, (Senecionideæ)

2075. „ columnaris (Rudbeckia column. & columnifera; Ratabida sulcata). — 10 — 75
6 a 7 fot hög med stora, gula blmr i Juli & Sept. Pl. på stora rabatter eller i kanten af buskpartier.

Oenothera; Nattljus, (Onagraceæ)

2076. „ Frascerii, 1 fot hög, gul — 10 — 75
2077. „ fruticosa (tetragona) 2 à 3 fot hög, gul — 12 —
2078. „ „ major, storblommig — 15 —
2079. „ glauca, 1 à 2 f., guldgul — 10 —
2080. „ grandiflora (suaveol.) 3 à 4 fot, gul, välluktande — 5 — 20
2081. „ „ major, mycket större — 8 — 50
2082. „ missouriensis (macrocarpa; alata) låg, gul, storbl. — 10 — 75
2083. „ speciosa, hvit med gult, praktfull — 8 — 50

Alla 8 sorterna, 70 öre.
Praktf., fr. Juni till hösten
bl. grupp- & rabattv., hvilka,
liksom de ettåriga arterna,
förtjena mycket uppmärksamhet af blomsterodlare.
O. fruticosa kan med fördel
pl. i kruka och anv. till dekorat. O. speciosa bör öfverv.
frostrfr. och uppl. om våren.

Omphaeodes, se Cynoglossum.
Onopordon, se bladväxter.

Orobus; Skogsärt, (Papaveraceæ)

2084. „ lathyroides, 2 à 3 fot, blå — 10 — 75
2085. „ venosus, 12 à 16 t., blå — 15 —
2086. „ vernus, 1 fot, purpuröd — 15 —
Vackra i Maj & Juli bl. rabattväxter.

Paonia; Pion, (Ranunculaceæ)

2087. „ arborea; Mountanpion — 20 —
2088. „ officinalis, bästa sorter, bl. — 5 — 10
2089. „ sinensis, bästa sorter bl. — 12 —
Efter frösädd får man ofta nya, vackra varieteter. Om fröet ej utsätts genast efter mogn., lieger det vanl. ett år och deröfver i jorden innan det gror. Plantorna bär värda i krukor de första åren och först tredje året uppl. på kalljord. Den förstn. betäckes om vintern.

Papaver; Vallmo, (Papaveraceæ)

2090. „ alpinum croceum, 1 f., gul — 12 —

å Port. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

2091. Papaver bracteatum, 2 fot,
högröd — 8 — 60
2092. „ caucasicum, 1 f., mönjer. — 10 —
2093. „ orientale, 2 f., skarl.röd — 10 — 75
Vackra, fr. Juni till Sept.
bl. rabattv. P. bracteatum & orientale hafta stora, praktf.,
läggöda blmr och användas
med fördel till pl. i kanten
af från vägarna något aflägsna
buskpartier. P. alp. & cau-
cas. fordra om vintern skydd
mot barfrost.

Penstemon, (Scrophularineæ)

2094. „ atropurpureus — 10 — 75
2095. „ campanulatus (Chelone camp., angustif., atropurpureus & roseum) — 10 — 75
2096. „ Digitalis — 5 — 25
2097. „ elegans (camp. eleg.) — 8 — 50
2098. „ grandiflorus, mycket stor-
blommig, skön. — 25 —
2099. „ Hartwegii (gentianoides) — 15 —
2100. „ „ coccineus — 20 —
2101. „ Murrayanus — 25 —
2102. „ pulchellus — 10 —
2103. „ hybrida former, utmärkt
vackra, blandade. — 25 —

Alla 10 sorterna, rör 1,40.

Dessa sköna, 2, 3 a 4 fot
höga, mycket tacksamt blom-
grupps, tåla ej vär vinter,
utan måste förvaras frostfr.
och uppl. om våren. De vack-
raste sorterna böra förökas
genom sticklingar.

Phlox; Flambloster; Höstsyrren, (Polemonieæ)

2104. „ suffruticosa hybr.; fl. färg. — 20 —
2105. „ decussata hybr. i fl. färg. — 30 —
Äro bland de allra bästa
grupp- & rabattv. Fordra fet,
något fuktig jord och skydd
mot det starkaste solskenet.
Fröet gror långsamt.

Phygelia, (Scrophularineæ)

2106. „ capensis, 2 à 3 fot hög — 25 —
Vacker gruppv. Blomma är
1½ tum långa, skarl. röda.
Behandlas som Penstemon.

Phytolacca, (Phytolaceæ)

2107. „ decandra, 5 à 8 fot hög — 5 — 20
En buskig, till pl. på gräs-
planer särdeles användbar
växt; beteckes eller öfver-
frostrfritt.

Plantago; Vägvärda, (Plantagineæ)

2108. „ major fol. purpureis — 12 — 90

Plumbago; Blyrot, (Plumbagineæ)

2109. „ Larpentea (Valoradia plum-
baginoides) — 40 —
1½ fot hög, under sommar-
regn & hösten bl. rabattv. m.
sköna blå blmr. Bör om-
sorgsfullt betäckas eller öf-
vervintras inomhus.

à Port. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

Polemonium; Venusvagn,
(*Polemoniaceæ*)

2110. " boreale, 2 fot hög, blå . . . 10 —
 2111. " coeruleum, 2 à 3 fot, blå . . . 5 — 20
 2112. " album, hvit 5 — 20
 2113. " humile, 6 à 8 tum, blå . . . 5 — 35
 Vackra, fr. Maj till i Aug.
 bl. rabattv. fortl. genom
 sjelfsådd.

Potentilla; Femfingerört,
(*Rosaceæ*)


2114. " Acajou, 2 à 3 fot, mörkröd — 25 —
 2115. " atrosanguinea, 2 à 3 fot, — 10 —
 2116. " aurea, 1 fot hög, gul . . . 5 — 30
 2117. " colorata (formosa); nepa-
 lensis) 2 fot hög, ljusröd — 8 — 60
 2118. " Hopwoodiana, 2 f, mångf. — 10 —
 2119. " insignis, 1 à 2 fot, gul — 12 —
 2120. " Mac Nabiana, 2 à 3 fot,
 skarlakanröd med gult . . . 15 —
 2121. " hybrida, blandade färger — 15 —
 2122. " fl. pl., dubbla, bland. — 25 —
 2123. " Roemeriana 12 —

Alla 10 sorterna, rdr 1,20.
 Sköna, från Juni till sent på
 hösten uppåhörligt bl. ra-
 battv. De dubbla arterna äro
 verkliga prakty för såväld
 krukor som fritt land.

Primula; Majnyckel; Gull-
vifva, (Primulaceæ)

2124. " Auricula, Aurikler, bl. f. — 20 —
 2125. " Luikeraurikler, bland. — 30 —
 2126. " cortusoides, röd 20 —
 2127. " elatior (veris var.; inodora)
 i flera färger 12 — 90
 2128. " luteola, citrongul 20 —
 2129. " mollis, mörkearminröd . . . 25 —
 2130. " suaveolens, svagt välväkt.
 gul eller röd, se afbildn. — 30 —
 2131. " veris, gul eller mörkröd — 12 —

Alla 8 sorterna, rdr 1,50.



Primula suaveolens.

à Port. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

Tidigt om våren bl. vackra
 grupp-, rabatt- eller infatt-
 ningsv. P. cortus, mollis
 & luteola böra beträckas eller
 öfveri frostriftt.

Ptarmica, (Senecionideæ)

2132. " Clavennæ fl. pl. 45 —
 Utm. vacker, i Juni & Aug.
 bl. grupp- eller rabattv. m.
 talrika, dubbla, bellislika,
 hvita blmr. till buketter.
 Pulsatilla, se Anemone.
- Pyrethrum; Batramssört,**
(*Senecionideæ*)
2133. " carneum, 1 à 2 f, ljusröd — 8 — 50
 2134. " roseum, 1 à 2 f, rosenröd — 8 — 50
 " hybrida, enkla variet.:
 2135. " atroroseum, lys. mörkröd — 10 — 75
 2136. " atrosanguineum, lys. röd — 15 —
 2137. " carmineum, lys. carminröd — 15 —
 2138. " Delhayii, lysande röd. — 12 —
 2139. " Gloire de Nimy, lys. röd — 20 —
 2140. " Millerii, hvit 12 — 90
 2141. " album floribundum, hvit — 20 —
 " hybrida, dubbla variet.:
 2142. " carmineum plenum 30 —
 2143. " floribundum pl. 30 —
 2144. " multiflor album pl. 30 —
 2145. " purpureum pl. 30 —
 2146. " roseum pl. 30 —
 2147. " hybr. blandade sorter 25 —
 2148. " parthenifolium aureum. — 30 —

Alla 15 sorterna, rdr 2,60.

7 sorter enkl. var. 95.

5 " dubbla var. 1,35.

De båda förstn. arterna lem-
 na det bekanta persiska in-
 sektpulfret. P. parthenif. aur.
 är en utm. skön, 6 tun hög
 infattningsv. m. friskt, gul-
 grönt bladverk och hvita
 blmr. Kan ej nog rekommenderas till garnering af
 blomster & bladväxtanordningar
 på finare gräsmattor.
 De hybrida formerna hafta
 allesammans fr. Juni till Aug.
 utm., stora blmr i de mest
 lysande färgnyanser. De hö-
 rat till våra präktigaste grupp-
 & rabattv. och kunna dess-
 utom användas i krukor till
 dekorering af växthus, bo-
 ningsrum, blomsterbord o. s.
 v. Behöfva god, lös jordmän
 och för säkerhets skull en
 tunn ljust- eller granris-
 täckning under barrost.

Ranunculus; Smörblomster;
Ranunkel, (Ranunculaceæ)

2149. " asiaticus superbissimus. — 35 —
 2150. " cæcius; Smörblomster, 4 à
 5 fot hög, gul, enkel . . . 10 —
 Den förstn. är en af de vack-
 raste kända grupper, utomor-
 dentligt praktfull, varierande
 i alla möjliga nyanser, från
 rent hvitt, gul, violett o. s. v.
 till svartrödt. Om fröet ut-
 säs tidigt, blomma en del ex.

ù Port. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

redan första året. Rötterna
nypagas om hösten, förva-
ras torrt och frostfr. samt
utpl. följande vår i god, kraf-
tig jordmän. R. cæcius är
användbar på rabatter och i
kanten av buskpartier.

Rheum, se bladväxter.

Rudbeckia, (Senecionideæ.)

2151. " fulgida (chrysomela; as-
pera) 1 à 2 fot hög, mörk-
gul med svartröd 10 — 75
2152. " grandifl. (nudicaulis) stor-
blommig, gul m. mörkrödt — 20 —
2153. † (Centrocarpa) hirta, 1 à 3
fot hög, guldgul 30 —
2154. " (Neumanniana) speciosa
guldgul med mörkrödt 15 —
Särdeles stätiliga, från Juni
till Sept. & Okt. bl. pryd-
nadsv. för breda rabatter el-
ler kanterna kring buskp.

Salvia, (Labiateæ.)

- " argentea, se bladväxter.
2155. † bicolor, 2 à 3 f., violett — 20 —
2156. " pendula, 2 à 3 fot, blå. — 35 —
2157. † Sclarea, 2 à 3 f., blåvit — 5 — 25
Vackra rabattv.; blomma i
Juni & Juli.

Sanguinaria; Blodört, (Pa-
paveraceæ.)

2158. " canadensis. 20 —
8 à 10 tum hög m. pryd.,
hvita, krokuslikta blmr. For-
drar lös, godjord, något skug-
ga och betäckn. mot frost.

Saxifraga; Stenbräcka,
(Saxifrageæ.)

2159. " desciens. 15 —
5160. " hypnoidea. 15 —
Mosslikta växter med hvita
blmr i Maj & Juni. Använ-
das till infattn. eller pl. på
gräfvar o. s. v.

Scabiosa; Ångsvädd; Enke-
blomster, (Dipsacæ.)

2161. " caucasica connata (Astero-
cephalus) 2 à 3 f. h., blå — 8 — 60
Passande till pl. på rabatter.

Scutellaria; Hjelmört; Get-
nos, (Labiateæ.)

2162. " macrantha, 6 t. h., violblå — 15 —
2163. " peregrina, 2 à 3 f., violett — 10 —
Den förstn. passar till pl. på
klippanlägg.; den senare på
rabatter. Blomma i Juni &
Augusti.

Sedum; Fetört; Fetknoppar,
(Crassulaceæ.)

2164. " Aizoon, 1 fot hög, gul 10 —
2165. " album, 6 tum hög, hvit. — 20 —
2166. " hybridum, 6 t., svavelfulgul — 15 —
2167. " kamtschaticum, gul. 12 —
2168. " spuriun, purpuröd. 25 —
Särdeles passande till pl. på
Stenhögar o. s. v.

ù Port. Ort.

Rmt Rd. ö. Rd. ö.

2169. " acaulis (excapa) 2 à 3 t.
hög, hvit eller rosenröd. — 8 — 45
2170. " alpestris, låg, hvit 15 —
2171. " chloræfolia, 1 à 2 f., hvit — 12 —
2172. " maritima, 1 fot hög, hvit — 8 — 50
2173. " Schafta, 4 à 6 t. h., hvit — 12 —
2174. " Zawadskii, 4 à 6 t., hvit — 10 —

Alla 6 sorterna, 55 öre.

Rabattv. De lägre arterna
äfven användb. till infattn.
och klippanläggningar.

Sliphium, se bladväxter.

Sisyrinchium; Gräslilja,
(Irideæ)

2175. " anseps, 6 à 8 tum h., blå — 8 — 50
Infattningsv. med gräslikta
blad och vackra blommor.

Solidago; Guldris, (Asteroideæ)

2176. " Riddellii, 2 à 4 fot. gul. — 15 —
2177. " revoluta, 2 à 4 fot, gul — 10 —
Anvärdbara till förskönning
af rabatter och buskpartier.
Blomma i Juli & Aug.

Spergula; Spergel, (Alsi-
naceæ)

2178. " pilifera, fin, hvita blmr — 20 —
Denna mosslikta växt är sär-
deles användb. till fina in-
fattn. I England nyttjas den
stundom i st. f. gräs till bil-
dandet af små, fina mattor.

Spiraea; Brudspira, (Rosaceæ)

2179. " calllosa, 3 à 4 f., rosenröd — 8 — 40
2180. " Ulmaria fol. var., 2 à 3
fot, hvit m. brokiga blad — 15 —
Den förstn. är buskartad, an-
värdb. till garneringar af busk-
partier; den senare vacker
rabattväxt.

Stachys; Stinknässa, (La-
biataeæ)

2181. " coccinea, 2 à 3 fot, röd. — 15 —
Öfverv. frostfr. utpl. om vä-
ren. Bl. fr. Juni till Aug.

Statice; Ormrot, (Plumba-
gineæ)

2182. " coccinea. 8 — 50
2183. " echioïdes. 15 —
2184. " eximea. 8 — 50
2185. " incana hybrida nana 5 — 30
2186. " rubra. 8 — 50
2187. " speciosa. 10 — 75
2188. " scoparia 8 — 50

Alla 7 sorterna, 55 öre.

Mycket vackra till pl. på
stenhögar eller rabatter. Af-
skurra hålla sig blmrna och
äro vackra till vinterbuket-
ter & kransar.

Stenactis, se Erigeron.

Stevia, (Eupatoriaceæ)

2189. " Eupatoria (hyssopifol.; Age-
ratum punctatum) 10 — 75
2190. " Lindleyana 8 — 50
2191. " purpurea 10 — 75

	à Port. Ort.	à Port. Ort.
	Rmt Rd. ö. ö. Rd.	Rmt Rd. ö. Rd. ö
Vackra, m. floekvis sittande purpur, blmr. Öfverv. frostfritt & utpl. om våren; åtven any. som krukväxter.		
Teleckia, se Buphtalmum.		
Thaliectrum; <i>Ångsruta,</i> (Ranunculaceæ)		
2192. " anemonoides (Anemone thalictroides) 6 à 8t. h., hvit — 8 — 50		
2193. " aquilegfolium, 4 à 5 f., hvit — 10 — 75		
2194. " concinnum, 4 fot, gul — 10 — 75		
2195. " glaucum, 6 fot, svafvelgul — 8 — 50		
2196. " purpuraseens, 3 à 4 f., röd — 12 — Mycket prydlig till buskettgarneringar & rabatter. Både blad & blmr kuma dessutom användas i buketter. Den första, bl. i April & Maj och är en af de mest intressanta vårlblr. De öfriga blomma i Juni & Augusti.		
Thermopsis; <i>Räfböna,</i> (Papilionaceæ)		
2197. " fabacea (Sophora) . . . — 15 —		
2198. " lanceolata (Thermia lupinoides) gul . . . — 15 — Vackra, i Juni & Juli blommande rabattväxter.		
Tradescantia; (Commelinaceæ)		
2199. " virginica, blandade . . . — 12 — 90 Omkr. 1 fot hög infätningsväxt, m. gräslik blad och ganska prydlig, blå, violetta, röda & hvita blommor fr. Juni till September.		
Tricyrtis; (Iridæ)		
2200. " hirta — 15 —		
2201. " aestivalis — 20 —		
2202. " fl. nigra — 25 — Egendoml. vackra växter, hvars köttiga rötter bär ofvervintras inomhus.		
Tulipa; <i>Tulpan,</i> (Liliaceæ)		
2203. " sylvestris, Skogstulpan . . . — 25 — En gång pl. och öfverlemnad åt sig sjelf fortl. den sig genom sidolökar; kan lätt förvildas på fuktiga gräsmattor. Blimna som utv. om våren äro gula och vällukt.		
	V. cornuta äro utm. under hela sommaren m. tusentals violetta blmr prydda infätningsväxt. V. odorata kuma inpl. i krukör och drifvas om våren; blma åtven om hösten. Var. russica har större blommor.	Om urvalte oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:
		200 sorter två- och fleråriga växter, rdr 20 —
		100 " två- och fleråriga växter 10,50
		50 " två- och fleråriga växter 5,50
		25 vackra sorter två- & flerå. växt, 3,25
		12 vackra sorter två- & flerå. växt , 1,75

VII. Krukväxter:

En stor del af fröet till de under denna rubrik anförde växter införskrifves till Europa direkte från växternas hemländer, i synnerhet från Nya Holland, Ost- och Vestindien, Goda Hoppsudden, m. fl. ställen. Mänga sorter harfor derföre, genom den långa resan, redan vid lithostonen förlorat en del af sin gröningskraft, så att de behöva ligga länge i jorden innan de gro och uppkomma ejemnt. Derföre är man ofta nödsakad att använda artificiella medel till befrämjande af dess gröningsförmåga. Sålunda bör fröet af de flesta exotiska Leguminosæ, såsom: *Acacia*, *Bossia*, *Chorozema*, *Cianthus*, *Edwardsia*, *Poinciana* m. fl. innan det utsätts, antingen inläggas i linneflappar och hastigt neddoppas i 75 à 80° varmt vatten, eller och bör det få ligga en à två dygn i yumont, med en 100:del saltsyra uppbländadt, regn- eller åvatten. Man kan åtven dertill nyttja starkt utsprädat chlorvatten. På större frösörter, såsom: fröet till en del Palmer, *Canna* och dylikt bortfilas det grodden omgivande, ytter skälet, dock så försiktig att grodden icke på ringaste sätt skadas. Det

är naturligtvis ej meningen att hela skalet bör borfjas, utan blott det ställe, der grodden skall framstjuta. Mycket finkorniga fröslag, sässom: *Azalea*, *Begonia*, *Caleolaria*, *Epacris*, *Erica m. fl.* börja vid sanningen endast helt obetydligt eller och aldeles intet beträckas med jord, utan bör man i stället öfverläcka de med dyl. frö besädda krukorna med glasskifvor och ställa dem skuggigt och fuktigt. De vattnas bäst på det sätt att man uti andra, vattenfylda kärn nedslätter frökruskorna och läter dem genom bottenhålen uppsuga vatnet. Alla sorter krukväxtrö fördra för att kunna gro: jemn värme, fukteighet och skydd mot starkt solsken.

ab Port. Pr st. Rmt Rd. ö.

Abroma; *Kakonaleva*, (*Byttmeriacæ*)

2222. „ *Augusta* (*fastuosa*) 6 a 7 f hög — 40 Blmrna brunröda; fördra drifbänk-jord och + 15 a 16° C.

Abutilon; (*Malvaceæ*)

2223. „ *aurantiacum*, orangerröd — 40
2224. „ *insigne*, rosenröd, mörkstrimmig — 40
2225. „ *striatum*, gul med rödt — 10
2226. „ *venosum*, gul m. blodröda ådror — 20
2227. „ *hybridum*, Due de Malakoff — 20
2228. „ „ *Medicis Spada* — 30
2229. „ „ *Montgolfier* — 30
2230. „ „ *souvenir d'Aragon* — 20
2231. „ „ *van Houttei* — 10

Alla 9 sorterna, 1 rdr.

Prakt. växter för boningsrum. Blmrna klocklikta, utm. vackra; fördra kraftig jord och + 5 a 15° C.

Acacia; *Akasia*, (*Mimoseæ*)

2232. „ *albicans* — 10
2233. „ *argyrophylla* — 10
2234. „ *armata*, pr ort 90 öre — 12
2235. „ *aroma*, pr ort 75 öre — 10
2236. „ *calamifolia* — 30
2237. „ *celastrifolia*, pr ort 50 öre — 8
2238. „ *chordophylla* — 25
2239. „ *cultiriformis* (*dolabriformis*) — 12
2240. „ *cyanophylla* — 12
2241. „ *dealbata* (*affinis*) pr ort 75 öre — 10
2242. „ *decipiens* — 15
2243. „ *decurrens* — 15
2244. „ *dentifera* (*erythropus*) — 20
2245. „ *discolor* (*botryceph.*; *Mimosa discè*) — 25
2246. „ *eburnea*, pr ort 50 öre — 8
2247. „ *elata* — 20
2248. „ *falcata* — 10
2249. „ *falciformis* — 10
2250. „ *farnesiana* (*pedunculata*; *Farne-sia odora*) — 10
2251. „ *floribunda* — 25
2252. „ *pendula* — 15
2253. „ *glaucia pend.* (*leucocephala*) — 15
2254. „ *glomerata*, pr ort 25 öre — 5
2255. „ *grandis* — 25
2256. „ *graveolens* (*verniciiflora*) — 12
2257. „ *heterophylla* — 25
2258. „ *horrida* — 15
2259. „ *La Trobeii* — 12
2260. „ *leiophylla* (*Blomeii*) — 15
2261. „ *leptophylla*, pr ort 20 ö. — 5
2262. „ *linifolia* (*abietina*; *pinifolia*) — 30
2263. „ *longifolia*, pr ort 50 öre — 10
2264. „ „ *magnifica* — 15
2265. „ „ *pendula* — 10

ab Port. Pr st. Rmt Rd. ö.

2266. *Acacia longissima glauca pendula* (*linearis*) — 10
2267. „ *lophanta*, pr ort 15 öre — 5
2268. „ „ *speciosa*, pr ort 75 öre — 10
2269. „ „ *lunata* (*brevifolia*; *austral.*) — 25
2270. „ „ *Meissnerii*, pr ort 60 öre — 10
2271. „ „ *Melanoxylon* (*arecata*, *latifolia*) — 8
pr ort 50 öre
2272. „ *mollissima* (*decurrens v. moll*) — 12
2273. „ *Neumannii* (*lophanta N.*) — 5
pr ort 30 öre
2274. „ *oleifolia* (*elegans*; *purpurea*) — 15
2275. „ *paradoxa* (*armata*; *angustifolia*; *undulata*) — 15
2276. „ *petiolaris* — 20
2277. „ *pulchella* — 40
2278. „ *psychantha* — 10
2279. „ *reclinata* — 20
2280. „ *retinoides* (*glaucescens*) — 10
2281. „ *Sophore*, pr ort 50 öre — 8
2282. „ *trinervata*, pr ort 50 öre — 8
2283. „ *verticillata* — 15

Alla 52 sorterna, rdr 7 —

40 vackra sorter, „ 5,50

20 „ sorter. 3 —

12 „ „ „ „ 1,75

Acacierna höra till de kalla växthusens bästa prydnadsväxter. De bildas efter beskärning utm. vackra träd, hvilka kunna uppdragas till anseelig höjd. Blommor om våren, stundom äfven under hösten & vintern. Förra ljungjord, sparsamt vatten om vintern, men mycket ljus och frisk luft. Öfverv. vid + 5 a 8° C. och utflyttas under som. i det fria.

Agapanthus; *Flocktulja*, (*Hemerocallidæ*)

2284. „ *umbellatus*, blå — 10
2285. „ fl. albo, hvit — 30
Kända, omyckta fönsterv.; bärta ej för ofta ompl. Fröt gror långsamt.
Agave; *Amerikansk Aloe*, (*Liliaceæ*)
2286. „ *americana*, *S. k. Hundrävrig*, *Aloe*, — 20
pr ort 80 öre.
2287. „ *filifera*, utmärkt praktfull. — 50
2288. „ *mexicana*, storväxt — 20
Bekanta dekorationsv. Förra kraftig jord, blandad m. grofkorning sand, sparsam vattning om vintern och + 5 a 10° C.

Aloe; *Aloe*, (*Liliaceæ*)

2289. „ *arboreascens* — 35
2290. „ *attenuata* — 35
2291. „ *cæcia* — 35
2292. „ *formosa* — 35
2293. „ *mitraformis* — 35

	" Port. Pr-st. Rmt Rd. ö.
Tacksamma växter för boningsrum. Fordra sol och spars. vattning, särdeles om vintern. Af A. mitraf. erhålls det ämne, som under namn af aloe nyttjas i medicinen.	
Alstroemeria, (Amaryllideæ)	
2294. " aurantiaca — 10	
2295. " chilensis, i flera färger. — 20	
Vackra, under sommaren i det fria anv. växter. Rötterna förr. torra om vintern. Öfverv. vid + 5° C.	
Amaryllis, (Amaryllideæ)	
2296. " vittata — 25	
Lökv. m. praktf blmr. Öfverv. vid + 15 a 20° C.	
Angelonia, (Serophulariaceæ)	
2297. " grandiflora — 20	
2298. " Gardneriana — 25	
Vackra, ungefärl 1 f höga smäbuskar med blå, hvitpunkt. blmr. Fordra + 15° C. och sandbl. grästorfjord.	
Anomatheca, (Iridæ)	
2299. " cruenta — 20	
Rotknölarna ligga under vintern torra. Utpl. om sommaren. Blmarna vackra, blodröda.	
Anona; Flaskträd, (Anoneæ)	
2300. " Cherimolia — 10	
2301. " suavissima — 12	
Trädartade; fordra fet, lös jord, mycket vatten och + 15° C.	
Aralia; Bergangelika, (Aralieæ)	
2302. " digitata, (Hedera xalapensis) — 30	
2303. " papyrifera, Sidenpappersväxten — 60	
2304. " umbraculifera — 25	
Stål. dekorationsv. för temp. växthus & boningsrum.	
Arbutus; Smultronträd, (Ericaceæ)	
2305. " Andrachne — 20	
2306. " Unedo — 10	
Utm. för sina smultronlikna frukter. Pl. i god ljung- & lösfjord. Öfverv. vid + 5° C.	
Ardisia; Spetsblomster, (Myrsineæ)	
2307. " crenulata — 20	
Kan odlas i boningsrum; utm. för dess röda bär.	
Asclepias; Svärlot, (Asclepiadeæ)	
2308. " curassavica — 10	
3 a 5 fot hög m. vackra, mörka orangef. blmr. Odlas bäst i varm driftbänk och om vintern vid + 12 a 15° C. Kan under blomningen inflyttas i boningsrum.	
Aspalanthus, (Papilionaceæ)	
2309. " nivea — 15	
2310. " cericea — 30	
Sällsynta prydnadsv. Fordra lättt, sandbl. ljung- & lösfjord, + 5 a 8° C.	
Azalea; Hyellros, (Rhodoreæ)	
2311. " indica, i flera färger. — 20	
2312. " pontica — 15	
Fröet hemtadt af de nyaste prakts.	
Begonia, (Begoniaceæ)	
2313. " boliviensis, praktfull. — 25	
2314. " diversifolia — 15	
2315. " Pearceii, vackra blad och blmr — 20	
2316. " Rex hybrida, praktfulla blad — 25	

	" Port. Pr-st. Rmt Rd. ö.
Fröet bür ej betäckas med jord. Den förstn. är utm. för grupper; bör, liksom B. diversif. hållas torr om vintern och ompl. på våren. B. Pearceii & Rex äro praktiga fönsterv. Den sistn. har olika tecknade, vackra blad.	
Berberis; Surtörne, (Berberideæ)	
2317. " Realii — 25	
2318. " Darwyndii — 25	
2319. " Ehrenbergii — 35	
2320. " fascicularis (B. pinnata; (Mahonia) pr ort 25 öre. — 5	
2321. " Fortuneii — 25	
2322. " japonica — 15	
Prydl. ständigt gröna buskar med praktf. gula och gulröda blmr. Öfverv. vid + 2 a 5° C. Fröet gror långsamt.	
Bignonia; Trumpetblomster, (Bignoniaceæ)	
2323. " gracilis, guldgul — 25	
2324. " jasminoides, blekröd, — 25	
Rankväxter med skönt bladwerk & praktf. blmr. Fordra lösfjord & + 10 a 15° C.	
Billbergia, (Bromeliaceæ)	
2325. " fasciata — 20	
2326. " vittata — 30	
2327. " zebrina — 25	
Ananaslikta dekorationsv. för varma växthus & boningsrum, m. särdeles vackra blmr. Fordra lättt jord eller mossa och + 15° C.	
Bocconia, se bladväxter.	
Boehmeria, se bladväxter.	
Bossiae, (Papilionaceæ)	
2328. " cinerea — 30	
2329. " heterophylla — 20	
2330. " ovata — 20	
Vackra, nyholl. smäbuskar m. talr. blmr. Fordra lättt ljungjord, god dränering, lagom vatten och + 5 a 10° C.	
Brachyzema, (Papilionaceæ)	
2331. latifolium, beh. som förestående — 10	
Cactus, (Cacteæ)	
2332. " acutangulus. — 35	
2333. " eriophorus (cubensis). — 35	
2334. " grandiflorus, Nattens drottning — 60	
2335. " major — 80	
2336. " speciosissimus — 50	
2337. " triangularis. — 35	
Alla 6 sorterna, rdr 2,70. Kammarväxter m. praktf. blmr. Fordra mycket sol & spars. vattning. Hvarje portion imnehåller blott 5 frö.	
Bonapartia, se bladväxter.	
Calampelis, se slingerväxter.	
Calceolaria; Tuffblomster, (Scrophulariaceæ)	
2338. " hybrida, enfärgade, punkt. & tigrerade sorter, i praktfulla nyanser, se afbildningen. — 15	
2339. " nana, låga, samma sorter som föregående, blandade — 15	
2340. " rugosa hybrida, buskartade i många nyanser — 20	

Fröet säs helst i slutet af Aug eller början af Sept i data fat eller krukor m. fin sandbl. löjfjord, hvars yta, före såningen, noga jemmas med ett dertill gjorda bräde. Fröet bör ej betäckas, utan blott lindrigt nedtryckas i jorden med ofvann. bräde, hvarefter de besädda kärlen nedlättas uti ett vattenfyldt kärl, till dess jorden uppsugit röd fuktighet, då de ställas tätt under glaset i en sval driftbänk. För att befordra grönningen öfvertäckas frökärlen m. glasskifvor, som åter borttagas när fröet börjar gro. Så snart hjertbladen utbildat sig, om skolas pl. i andra kärl i något kraftigare, men likvälv lätt, löj jord, på omkr. 1 tums afst. fr. hvarandra. Kärlen ställas derpå åter under glas i drifts-, vattens- försigtigt & skyddas mot solen tilldess pl. blifvit så försiktigkommit att de bevänt kunnna fattas med fingrarne, då de ompl. hyar för sig, först i små och sedermera i allt större och större krukor. De fordra om vintern en ljus, sval plats nära glaset och frisk luft så ofta värdet är mildt. En jemn, fastän ej öfverflödig fuktighet är absolut nödv. för dess treffning. Bladlöss aflägsn. genast gen. tobaksrökn. eller på annan sätt. Unde knoppn. & blomm. är svag gödselvattn. 2 a 3 ggr i veckan till det rekomm. De buskartade tofselbl. anv. helst på grupper i det fria och förökas under vintern & våren genom sticklingar.



Caleolaria hybrida.

à Port. Rmt Rd. ö.

Calla, (Aroidæ)

2341. „ *aetiopica* (*Richardia africana*) — 8
pr ort 50 öre

Bekant & omtyckt kammarväxt.

Callistachys; Praktax, (Papilio-naceæ)

2342. „ *lanceolata*, mörkgul — 15

à Port. Rmt Rd. ö.

Trädartad, vacker; pl. i sandbl. torf-, ljungh- & löjfjord, vattnas spars. & öfverv. vid + 5 a 10° C.

Callistemon, se Metrosideros.

Calothamus; Praktbuske, (Myrtaceæ)

2343. „ *quadrifida*, blommorna röda . . . — 40
Buskartad, vacker; behandl. som föregående.

Calythrix; Håarkalk, (Myrtaceæ)

2344. „ *scabra* — 15
Vacker buske eller träd, behandlas som föregående.

Camellia, (Theaceæ; Camellieæ)

2345. „ *japonica*, blandade sortter — 45
Fröet samladt af de bästa, dubbla sorter.

Canna, se bladväxter.**Carica; Melonträd, (Cucurbitaceæ)**

2346. „ *papaya* — 50
Intressant träd m. ätbara, meloni. frukter. Pl. i stora krukor, i fet, lucker jord; öfverv. vid + 10 a 15° C.

Cassia; Kasuarträd, (Papilionaceæ)

2347. „ *corymbosa*, pr ort 30 öre — 5
2348. „ *floribunda*, pr ort 40 öre — 8
2349. „ *laevigata*, pr ort 30 öre — 5
Träd m. vackra, gula blmr. Beskr. res årsl. Fordrar löjfjord & + 10 a 15° C.

Casuarina; Kasuarträd, (Coniferae)

2350. „ *leptoclada* — 30
2351. „ *muricata* — 25
Egendoml., bladlösa träd med träd-fina grenar. Pl. i löf- & ljunghjord; öfverv. vid + 5 a 10° C.

Ceanothus, (Rhamnæ)

2352. „ *africanus*, hvit, pr ort 75 öre . — 10
2353. „ *azureus grandiflorus*, blå — 15
2354. „ *integerimus*, hvit — 30
2355. „ *intermedius*, hvit — 15
Prydl. småbuskar m. talr. blmr. Pl. i löjfjord; öfverv. vid + 2 a 5° C.

Cereus, se Cactus.**Cestrum; Hammarbuske, (Solanaceæ)**

2356. „ *aurantiacum*, orangefärgad . . . — 15
2357. „ *diurnum*, hvit — 35
2358. „ *roseum*, rosenröd — 25
Vackra träd eller buskar för fönsterödl. ha välviktande blmr. Fordrar kraftig löjfjord & + 10 a 15° C.

Chamapeuse, se bladväxter.**Chironia, (Gentianæ)**

2359. „ *baccifera* — 25
Särdeles vacker; pl. i med grof sand bl. ljungh- & löjfjord. Öfverv. ljus & luftigt vid + 5 a 10° C.

Chorizema, (Palpilionaceæ)

2360. „ *cordatum* — 15
2361. „ *spectabile* — 20
2362. „ *varium* — 15
Smäträd eller buskar med vackra röda blmr under våren & sommaren. Fordra sandbl. ljungh- & löjfjord, måtti. vattn. och + 5 a 6° C.

- a Port. Rmt Rd. ö.
- Crysanthemum; Prestkrage, (Senecionideæ)**
2363. " Broussonetii — 30
 2364. " frutescens (Argyranthem. frut.) — 20
 2365. " indicum grandifl., bland. dubbla — 20
 2366. " " pomponicum, småblommiga, blandade, dubbla — 25
 2367. " japonicum, storbl., egendomlig — 35
 Den förstn. har hvita blommor och är en värdefull grupp. C. frut. bildar ett litet träd, som hela året om, men mest vår & somr, bär en mängd hvita blmr. De öfr. blima i Okt., Nov & Dec. och är bland de tacks. höstblommorna.
- Cineraria; Askört, (Senecionideæ)**
2368. " hybrida, l:ma, blandade i alla färger, pr ort 10 rör — 20
 2369. " " nana, lägväxt, bland. färger — 20
 2370. " " kermesina, högträdt, utmärkt — 40
 2371. " " afrocoerulea, blå — 30
 2372. " Webbi (Pericallis) i flera färger — 25
 Dessa utm. prakt. blmr. behandl. sät, som vi ann. om Calceolaria och blomma i sät fall samtidigt m. dem. För att få rätt stora, blad- & blomrika ex, bör man, så snart rötterna nätt krukan väggas, ompl. ex. i allt större krukor. Böra om vintern ej stå varmt, högst + 5° C. Den sistn. är mycket stor, ofta 3 a 4 fot hög. Öfriga sorter, se blady.
- Cissus, (Vitiferæ)**
2373. " antarctica — 20
 Rätt vacker rankv. för boningsrum.
- Citrus; Citron; Orange & Pomerans, (Aurantiaceæ)**
2374. " Aurantium, Apelsin, p. ort 50 ö. — 8
 2375. " Bigaradia, Orange, pr ort 75 ö. — 10
 2376. " Limonium, Limon, pr ort 50 ö. — 8
 2377. " medica, Citron — 50
 2378. " nobilis, Mandarinorange — 25
 Alla kunn. lätt odlas i boningsrum. Clematis, se slingerväxter.
- Clerodendron, (Verbenaceæ)**
2379. " splendens, lysande röd — 10
 Praktv. m. sköna blmr. Fordrar god löjfjord & + 15° C.
- Cianthus; Praktvicka, (Papilionaceæ)**
2380. " puniceus, mörkröd — 25
 Omtyckt praktv. Fordrar under vintern en ljus plats, lagom vattn. & + 5 a 6° C.
- Clitoria, (Papilionaceæ)**
2381. " Ternatea — 10
 Utm. väckra, blå eller hvita blmr. Odlas under som. i varm driftbänk. Ompl. i god löjfjord så snart rötterna nätt krukan väggas. Öfverv. vid + 15° C.
- Cobaea, se slingerväxter.
- Coccinea, se slingerväxter.
- Coffea; Kaffeträd, (Rubiacæ)**
2382. " arabica, äkta, 5 frö — 75
 Odlas i varmt hus vid + 15 a 20° C. Fordrar god, sandbl. löjfjord, om vintern sparsam, men om sommaren ymnigare vattn., skydd mot solen och besprutning 2 a 3 ggr dagligen.
- Commelina, se ettåriga blomsterv.**
- Convolvulus; Vinda, (Convolvulaceæ)**
2383. " mauritanicus, blå blommor — 25
 Vacker, krypande växt m. talr. blmr. Passar till ampl. & pl. på fritt land. Öfverv. vid + 5° C.
- Cordyline, (Asphodelæ)**
2384. " australis (Dracena) — 50
 2385. " indivisa aureo lineata (Dracena) — 30
 Stålth. dekoreringsv. för temp växt- lns & boningsrum. Öfverv. vid + 8, 10 a 15° C.
- Correa, (Rutaceæ)**
2386. " alba, hvit — 30
 2387. " speciosa, röd — 30
 Småbuskar eller träd med väckra, hängande blmr. Pl. i Jönig- & löjfjord och öfverv. vid + 5 a 10° C.
- Cosmophyllum, (Ferdinanda) se bl. v.**
- Crassula, (Crassulaceæ)**
2388. " coccinea, skarlakanröd — 15
 1 1/2 a 2 fot hög m. präktiga, välvakta blmr. Fordrar ljung- & driftbänkjord, öfverv. vid + 5 a 6° C. Utpl. om sommaren på grupper.
- Crotalaria; Skallerskida, (Papilionaceæ)**
2389. " arborescens — 15
 2390. " laburnifolia — 15
 Vackra, träd. växter med gula blmr. Pl. i Jönig- & löjfjord; öfverv. v. + 5 a 10° C.
- Cuphea, (Lythrariæ)**
2391. " eminens — 20
 2392. " platycentra (ignea) — 10
 2393. " strigulosa — 10
 2394. " zimapantii, pr ort 60 öre — 10
 Vackra, talr. rödgula blmr., kunn. om sommaren uppl. i det fria. Öfverv. v. + 5 a 10° C.
- Cyclamen; Jordbröd, (Primulaceæ)**
2395. " europeum — 15
 2396. " macrophyllum — 15
 2397. " persicum — 15
 Små, laga, utm. prydl. till en del om hösten framk. röda eller hvita blommor.
- Cytisus; Ärtträd, (Papilionaceæ)**
2398. " Attleyanus — 15
 2399. " chrysobotrys — 15
 2400. " floribundus — 30
 2401. " glabratus — 15
 2402. " racemosus — 20
 Buskar eller småträd m. hela året framk., gula välvakta blmr. Pl. i löjfjord och vattn. måttl. om vintern.
- Datura; Spikklubba, (Solanaceæ)**
2403. " arborea, (Brugmansia suaveol.) — 15
 2404. " Knightii, (Brugmansia) dubbel — 30
 Bekanta praktv. m. stora, hvita trumpetform. välvakta blmr. Trifivas mycket bra i boningsrum. Pl. i god, kraftig löjf- & driftbänkjord. Behöfva ej ljus eller vatten om vintern.

*ù Port. Rmt Rd. ö.***Daubentonia; (Papilionaceæ)**

2405. „ magnifica — 10

2406. „ Tripetiana (punicea; Piscidea punicea; Aeschynomene miniatæ) — 10
Särdeles vackra. Om fröet säs tid, blma de första året, men blifva större & starkare om de öfverv. v. + 5 a 10° C. Fordra god löf- & ljungjord samt mättig vattning.**Daviesia; (Papilionacæ)**

2407. „ acicularis — 20

2408. „ alata — 20

2409. „ latifolia superba — 25

Låga, vackra, nyholt, om värren m gulaktiga blmr prydda småbuskar. Pl. i sandbl. ljungj. & öfverv. vid + 5 a 10° C.

**Desmodium; (Leguminosæ-He-
dysaneæ)**

2410. „ gyrans, rörlig, 5 frö — 50

Småbladens på denne märkvärdiga, 3 a 4 fot höga växt är så kinsliga för ljuset att, då de träffas deraf, de röra sig taktmässigt upp och ned, så att det nästan ser ut som hade växten animaliskt lif. Fordrar god ljung- & löjfjord, väl dränerade kru-
kor, om som. rikl. vattn. & luft samt
om vintern en ljus plats och + 15° C.**Didymocarpus; Dubbelfrukt,
(Gesneriacæ)**

2411. „ Rexii (Streptocarpus) — 10

2412. „ polyanthos — 10
Ortartade; bimrna vackra, blå. For-
dra löjfjord & + 15° C.**Dillwynia; (Papilionacæ)**

2413. „ cinerascens — 15

2414. „ floribunda — 15
Små, fina buskar m. guldgula & eld-
röda blmr. Fordra sandbl. ljungjord;
väl dränerade kärl, ljus & luft i
mångd och + 5 a 10° C.**Diosma; (Rutaceæ)**

2415. „ alba — 20

2416. „ capitata — 15
Fin, vällukt. buskar m. hvita eller
rödletta blmr. Behandl. som föreg.**Dipteranthus; (Açantaceæ)**

2417. „ paniculata, 10 frö — 40

2418. „ spectabilis, 10 frö — 20

Prydl. buskar m. blå eller lila blmr.
Fordra löjfjord och + 15° C.**Disemma; (Passifloræ)**

2419. „ coccinea, (Passiflora coccinea) — 10

2420. „ Herbertii — 40
Rankv. m. skarlaikanröda blmr. For-
dra löjfjord och + 10 a 15° C.**Dracæna; Drakblodsträd, (Aspara-
gineæ)**

2421. „ Draco, äkta — 25

„ andra sorter, se Cordyline.
Utm. stättig dekorationsv. Behöver
kraftig löjfjord och + 15° C. Trivs
förräffligt i boningsrum.**Eccremocarpus (Calampelis) se slin-
gerväxter.****Echinocactus; Igalkaktus, (Cactæ)**

2422. „ Linkii — 30

ù Port. Rmt Rd. ö.

2423. Echinocactus mammulosus — 30

2424. „ candicans (Echinocereus) — 30

2425. Ehrenbergii (Echinocereus) — 30

Echinopsis; Igalkaktus, (Cactæ)

2426. „ Decaisneana — 30

2427. „ multiplex — 30

2428. „ oxygona — 30

2429. „ tubiflora — 30

2430. „ turbinata — 30

Ovanstående 9 sorter, 5 korn af**hvarje, rdr 2,40.****Egendoml. Behandlas som Cactus.****Edwardsia; (Papilionacæ)**

2431. „ chilensis, 3 frö — 60

2432. „ Mac Nabiana — 30

2433. „ microphylla — 40

Higa, praktf. träd in. fint lövverk

och sköna, gula blmr. Pl. i löf- &

ljungjord; öfverv. vid + 5 a 6° C.

Entelea, se bladväxter.

Epacris; Epakris, (Epacridæ)

2434. „ hybrida, flera sorter, blandade — 15

Känd praktv. Pl. i sandbl. ljung-

jord; öfverv. vid + 5 a 8° C.

Erica; Igang, (Ericaceæ)

2435. „ arborea, pr ort 75 öre — 10

2436. „ concinna — 20

2437. „ multiflora — 20

2438. „ pyroliflora — 20

2439. „ 52 olika sp. blandade — 20

Fröet utsätts i fin, sandbl. ljungjord;

befästekas blott m. en glasskiva och

hälles vid jemn fuktighet. Pl. i

god löjfjord, i väl dränerade kärl.

Öfverv. framförallt ljust, torrt &

luftigt vid + 3 a 5° C.

Erythrina; Korallträd, (Papilio-**naceæ)**

2440. „ caffra — 30

2441. „ corallodendron, 2 frö — 50

2442. „ crista galli — 15

2443. „ Hendersonii, 2 frö — 30

2444. „ laurifolia — 15

2445. „ viarum — 25

Dessa atm. praktf. växter är väl

förtjenta att blomsterödl. uppmärks.

En del sorter, särskilt crista galli,

laurifol. m. fl. falla om vintern sätta

blad, kunna då ställas åt sidan och

behövfa ej vatten. Om vintern böra

de åter visa tecken till lif, och böra

då ompl. i väl dränerade kärl, i god

kraftig, sandbl. löjfjord. Efter pl. bö-

ra de ställas något varmare. Under

sommaren kan man anv. dem utö

eller i öppna växthus och bonings-

rum. De sorter som är i jämna ve-

getation fordras om vintern + 15° C.

och något fuktig luft.

Eucalyptus, se bladväxter.

Eucomis; Punktilja, (Asphodelacæ)

2446. „ punctatus — 20

Hälles torr om vintern; ompl. om

våren vid + 5 a 6° C.

Eugenia; (Myrtaceæ)

2447. „ apiculata — 15

2448. „ Ugnii — 20

- a Port. Rmt Rd. ö.
- 06 — Prydliga, myrtenlikta träd, m. hvita,
vällukt. blmr. Fordra ljung- & löf-
jord och + 5 a 10° C.
- Fabricia, (Myrtaceæ)**
2449. " levigata — 25
Träd med vackert, blågrönt bladverk;
fordrar ljung- & löfjord och + 5° C.
- Ferdinanda, se bladväxter.**
- Foucroya, se bladväxter.**
- Fuchsia; Bloddroppa, (Onagraceæ)**
2450. " arborescens, trädlik — 12
2451. " coccinea — 12
2452. " corymbiflora — 12
2453. " alba — 12
2454. " hybrida, enkla & dubbli, bland. — 15
Att uppdraga fuchsier af frö är både
tacksamt och intressant, enär man
derigenom erhåller mycket kraftiga
ex. och ej sällan nya, vackra sorter.
- Genista; Ginstbuske, (Papilionaceæ)**
2455. " canariensis, (Spartium albicans) — 10
2456. " candicans, (Cytisus) pr ort 30 öre — 5
Busk- eller trädform. växter, ständigt
prydda m. gula vällukt. blmr. Pl i
löfjord; öfvervintra vid + 5° C.
- Gesneria, (Gesneriaceæ)**
2457. " cardinalis — 25
2458. " splendens — 30
2459. " zebra — 30
Praktv. varmhustv. m. sköna, skarla-
kantr. blmr och vackra, sammetslikta
blad Fröet bör ej betäckas med jord.
Rotknölarna ligga torra om vintern
och ompl. om våren i god ljung-,
torf- & löfjord, hvarefter de hållas
varmt & fuktigt.
- Gloxinia, (Gesneriaceæ)**
2460. " hybrida, nyare sorter, blandade — 15
2461. " erecta, blandade sorter — 20
2462. " " grandiflora, storbl. — 25
2463. " " pendula grandifl., häng. bl. — 30
2464. " " horizontalis grandiflora, bl. — 30
Utm. praktiv., hvars blmr var. i alla
nyancer af hvit, blått, violet & rödt
o. s. v. De fordra en nägorlunda
jemu värme af + 15 a 20° C, fuk-
tig luft, skugga, god, halfrutten löf-
eller skogsjord och väl dränade kru-
kor. Fröet bör ej betäckas med jord.
- Goodia, (Papilionaceæ)**
2465. " lotifolia — 15
Träd m. talrika, gulbruna blmr. For-
dra löf- & ljungjord och + 5 a 6° C.
- Greigia, (Bromeliaceæ)**
2466. " sphacelata — 40
Ananasmlik, sköna dekorationsv. för
temp växthus eller boningsrum.
- Grevillea, (Proteaceæ)**
2467. " robusta — 30
Vack. träd. Fordrar god löf- & ljung-
jord, måtl. vatten, och + 6 a 10° C.
- Habrothamnus, (Solanaceæ)**
2468. " elegans — 15
2469. " Warscewiczi — 20
Prydl. buskar m. vackra blmr. Pl i
sandbl. löfjord; öfvervintras vid +
5 a 10° C.
- Hakea, (Proteaceæ)**
2470. " acicularis — 20
a Port. Rmt Rd. ö.
2471. Hakea brachyryncha — 20
2472. " saligna — 20
Särdeles vackra träd för temp, hus.
Planteras i sandbl. löf- & ljungjord.
- Hardenbergia, (Papilionaceæ)**
2473. " Comptoniana — 25
2474. " lucida — 25
2475. " monophylla — 20
2476. " ovata — 20
Trädartade, nägot slingr. växter m.
mycket prydl., röda eller violetta
blmr. Pl i löf- & ljungjord, vattnas
måttl. och öfverv. vid + 5 a 10° C.
Växa och blima bättre om de pl. på
frí grund i växthuset.
- Hedychium; Kransblomster, (Scit-
tamineæ)**
2477. " Gardinerianum — 10
Stål. dekorationsv. m. vackra oran-
gef, starkt vällukt. blmr i rika klasar.
Pl i kraftig löf- & driftbankjord. Öf-
vervintrar vid + 15° C.
- Helichrysum; Stråblomster; Evi-
getsblomster, (Senecionideæ)**
2478. " Errera — 20
2479. " fulgidum — 25
2480. " speciosissimum — 20
Praktv. immorteller med röda, guia
eller hvita blmr. Pl. i sandbl. ljung-
& löfjord. Öfverv. vid + 5 a 10° C.
- Heliotropium; Heliotrop, (Ver-
benaceæ)**
2481. " peruvianum, blandade — 12
Bekanta och för sin vaniljlikta vällukt
omtyckta blmr. Kunna lätta odlas i
boningsrum. Praktiga till upplan-
ting på grupper.
- Hibiscus; Ibisblomster, (Malvaceæ)**
2482. " coccineus (speciosus) — 12
2483. " heterophyllus (grandiflorus) — 40
2484. " liliiflorus — 25
2485. " Manihot — 8
2486. " Moscheutos — 8
2487. " mutabilis — 20
2488. " rosa sinensis — 40
2489. " " Parkerii — 50
2490. " " rubrus — 50
2491. " syriacus — 15
Alla 10 sorterna, rds 2, 40.
Af dessa utm. praktiv. växter är alla,
m. und. af H. coccineus & Moscheutos,
busk- eller trädartade. De nyssn. sorten-
erna harva fleråriga rötter, som böra
ompl. om våren i god, kraftig löfjord
och nägorlunda vida krukor. Alla
sorterna utm. sig för vackra blad och
sköna, lilljelika, röda, hvita eller gull-
aktiga blmr. De flesta kunna afven
odlas i boningsrum. H. Moscheutos,
rosa rubrus & syriacus öfverv. vid
+ 5°, H. coccineus & heteroph. vid
+ 8 a 10° och de öfriga vid
+ 15° C.
- Humea, (Senecionideæ)**
2492. " elegans (Calomeria amaranthoides) — 15
Tvåårig, vacker växt. Öfverv. nära
glaset vid + 5 a 6° C. Ompl. om
våren i större kärl, eller uppl. på

à Port. Rmt Rd. ö.

solistika platser i det fria. År i före-
ning m. andra växt. väckert. grupper.**Indigofera; Indigobuske, (Papilio-
naceæ)**

2493. "	australis, rosenröd	— 10
2494. "	coccinea, mörkröd	— 15
2495. "	Dosua (doiua) lilafärgad	— 10
2496. "	sylvatica, roseväxande	— 25
2497. "	tinctoria; Äkta Indigo	— 10

Mycket prydlig och blomrika småbuskar. Pl. i sandb. löf- & driftbankjord, i ej alltför stora, väl dränerade krukor. Öfver. vid + 3 a 5° C. År omväntliga för mycken väta, hvarföre det är bäst att under kalla eller väta somrar behålla dem under glas. Kunna även odlas i boningsrum.

Kennedyia, (Papilionaceæ)

2498. "	Baumannii	— 25
2499. "	prostrata	— 30
2500. "	rubicunda	— 10

Slingerv. m. talr. röda eller violetta blmr. Pl. i löf- & ljungjord. Öfver. vid + 5 a 10° C.

Lagerstroemia, (Lythraceæ)

2501. "	indica	— 25
2502. "	Reginae	— 25

Dessa, om de väl behandlas, utm. prydlig träd, förtjena en plats i hvarje växtsamling. Pl. i kraftig löfjord. Öfver. vid + 8 a 10° C. Måste om våren skarpt tillbakaskäras och ställas varmt, då några år gamla pl. viligt utveckla sina i långa ax sittande, praktiga, röda blommor.

Lantana, (Verbenaceæ)

2503. "	hybrida, blandade i många sorter,	— 8
	pr ort 40 öre	

Bland de bästa & prakt. växter för grupper. Öfver. vid + 8 a 10° C. Fortpl. höst & vår genom stickling.

Lapageria, se slingerväxter.

Laurus; Lager, (Laurineæ)

2504. "	Benzoin; Benzointrädd	— 15
2505. "	nobilis, Lagerbärträdd, pr. ort 10 ö. — 5	

Fordra löf- & driftbankjord och + 3 a 5° C.

Lavatera, se bladväxter.

**Leptospermum; Söderhafsmyr-
ten, (Myrtaceæ)**

2506. "	baccatum	— 30
2507. "	flavescens	— 25
2508. "	lanigaeum	— 25
2509. "	scoparium	— 25

Vackra träd m. fina blad och talr. vita eller rödletta blmr. Pl. i löf- & ljungjord; öfver. vid + 3 a 5° C.

Lilium; Lila, (Liliaceæ)

2510. "	aurantium	— 50
2511. "	giganteum	— 50
2512. "	pyramidalis superbum	— 15

Utm. Fröet gror långsamt och uppkommer ofta först följande år.

Linum; Lin; Hör, (Linaceæ)

2513. "	arboreum, trädartad, gul	— 30
2514. "	flavum, gul	— 15

à Port. Rmt Rd. ö.

Utm. vackra m. talrika, nägorl. stora blmr. Pl. i god löfjord; öfver. vid

+ 5 a 8° C.

Lisanthus, (Gentianaceæ)

2515. "	Russellianus	— 20
---------	------------------------	------

Fröet af denne sköna växt, likasom

af alla gentianæ gror långsamt och

ojemnt. Det utsäss om våren och

beträffes ej med jord. En glasskifva

läggas över krukan, som sedan ställs

i en ljum driftbänk och hålls la-

gom fuktig. De små pl. omskolas

först och plant. sedan, här för sig,

i alt större och större krukor. For-

dra under somm. en luttig, sval och

skuggig plats samt rikl. vatten. Blmr.

na äro stora, utm. sköna, violetta.

Lobelia, (Lobeliaceæ)

2516. "	fulgens	— 15
---------	-------------------	------

2517. "	Queen Victoria	— 25
---------	--------------------------	------

2 a 3 fot höga m. lys skarlaröda

blmr i långa ax. Praktf. till grupp.

på trått land. Fortpl. gen. delning.

Öfver. vid + 3 a 5° C.

Lophospermum, se slingerväxter.**Lotus; Gigelsärter, (Papilionaceæ)**

2518. "	australis	— 20
---------	---------------------	------

2519. "	Jacobaeus	— 15
---------	---------------------	------

Prtyd. småbuskar m. mörkröda blmr.

Pl. i löfjord; öfver. vid + 5 a 8° C.

Mahonia, (Berberideæ)

2520. "	aquifolia, . . . pr ort 20 öre — 5	
---------	------------------------------------	--

2521. "	repens . . . pr ort 20 öre — 5	
---------	--------------------------------	--

Vackra buskar m. styvfa, glänsande

blad och gulgröna blmr i stora kla-

sar. Kunna under beträckning odlas

på kalljord.

Malva; Kattost, (Malvaceæ)

2522. "	californica . . . pr ort 50 öre — 8	
---------	-------------------------------------	--

2523. "	latifolia	— 15
---------	---------------------	------

Träd m. talr. röda blmr. Pl. i löfjord;

öfvervintra vid + 5 a 10° C. Kun-

na även odlas i boningsrum,

Mandevilla, (Apocynaceæ)

2524. "	suaveolens (Echites)	— 12
---------	--------------------------------	------

Vacker slingrväxt m. väldunktande

blmr. Pl. i löfjord; öfver vid +

8 a 10° C.

Medeola, (Asparaginaceæ)

2525. "	asparagoïdes	— 12
---------	------------------------	------

Vacker till ampler. Fordrar löfjord

och + 1 a 5° C.

Malaleuca; Cafepiträd, (Myrtaceæ)

2526. "	decussata (pumila; tetragona, pariflora)	
---------	---	--

pariflora)

ericeifolia (nodosa)

erubescens (ericifolia)

hypericifolia

2530. "	linariifolia (Metrosideros hysopif) — 30	
---------	--	--

Mycket prydlig, träd- eller buskar-

tade, m. fina blad och röda, violetta

eller gulgröna blmr. Pl. i löf- &

ljungjord; beskäras årl. Öfver. vid

+ 5 a 10° C. Lemma utm. bu-

kettgrönt.

Melianthus, se bladväxter.**Mesembryanthemum; Isplanta,
(Ficoideæ)**

2531. "	acinaciforme	— 15
---------	------------------------	------

2532. "	coccineum	— 15
---------	---------------------	------

- à Port. Rmt Rd. ö.
2533. *Mesembryanthemum cruciatum* — 15
 2534. " *edule* — 15
 2535. " *grandiforum* — 15
 Utm. sig för egendoml. former och
 vackra blmr. Tacksamma för odling
 i boningsrum.
- Metrosideros**, (*Myrtaceæ*)
2536. " *coccinea* — 30
 2537. " *lanceolata* — 30
 2538. " *pendula* — 30
 2539. " *rigida* — 20
 2540. " *robusta* — 30
 2541. " *semperflorens* — 15
 2542. " *viridisflora* — 25
- Alla 7 sorterna, rdr 1,50.
 Praktträd för boningsrum och kalla
 växthus. Blirna lysande, skarl. el-
 ler ljusröda, gul- eller grönaktiga.
 Pl. i löf- & ljungjord.
- Mimosa*, se ettåriga växter.
- Musa**; *Pisang*; *Bananas*, (*Musaceæ*)
2543. " *speciosa* — 35
 Tropiskt praktv. m. stora blad; öf-
 ver vid + 15° C.
- Muschia**, (*Campanulaceæ*)
2544. " *Wollastonii* — 15
 Ståtl. växt m. stora, vackra blad och
 gulgröna blmr. sittande i nära 2 fot
 höga vippor. Fordrar kraftig jord
 och stora krukor. Öfver, vid +
 5 a 10° C.
- Mutisia**, (*Compositæ*)
2545. " *retrorsa* — 25
 Skarlaikanr. blmr; utpl. om som-
 maren på kalljord.
- Myoporum**; *Musmat*, (*Myopo-
 rineæ*)
2546. " *ellipticum* (*Pogonia glabra*) — 25
 2547. " *floribundum* — 25
 Prydl. träd äfven för boningsrum.
 Pl. i ljung-, torf- & löjfjord; öfver.
 vid + 5 a 10° C.
- Myrtus**; *Myrten*, (*Myrtaceæ*)
2548. " *communis*, vanl., pr ort 20 öre — 5
 2549. " " *boëtica*, pr ort 50 öre — 8
 2550. " " *italica fructo nigro* — 10
 2551. " " *tarantina* — 10
 Trivias väl i ej för varma boningsr.
- Nierembergia**, (*Solanaceæ*)
2555. " *frutescens* — 30
 2556. " *gracilis* — 10
 Utm. pryd. småbuskar m. vackra
 blåvita blmr. Pl. i latt löjfjord;
 öfver, vid + 5 a 10° C.
- Opuntia**; *Fikonkaktus*, (*Cacteæ*)
2557. " *ficus indica*, ätbar frukt — 40
 2558. " " *fr. albis*, hytt frukt — 50
 2559. " " *atropurpureis*, mörkr. fr. — 50
 2560. " " *luteis*, gul frukt — 50
 Högst egendoml. formade. Fordra
 samma behandl. som kaktus; trivias
 i boningsrum.
- à Port. Rmt Rd. ö.
- Panax**; *Kräftröt*, (*Aralieæ*)
2561. " *angustifolium* — 25
 2562. " *dendroides* — 25
 2563. " *Murrayii* — 25
 Präktiga dekorationsv. Pl. i löjfjord;
 öfver, vid + 5 a 10° C.
- Panicum*, se dekorationsgräs.
- Passiflora**; *Passionsblomster*, (*Passi-
 filoreæ*)
2564. " *alba* (*Granadilla*) hvit — 20
 2565. " *coerulea*, blå, pr ort 50 öre — 10
 2566. " *grandiflora*, storblom, blå — 15
 2567. " *edulis* (*Granadilla*) åtbar trukt. — 20
 2568. " *gracilis* — 20
 2569. " *rubro-coerulea*, violet — 20
- Alla 6 sorterna, 90 öre.
 Slingerv. m. utm. vackra, egendoml.
 blmr. Förträffl. till bekl. af pelare.
 murar, o. s. v. i varma eller temp.
 växthus; kunna äfven fördelat, od-
 las i boningsrum. Pl. i god löjfjord
 och forplanta genom sticklingar.
- Pelargonium**, (*Geraniaceæ*)
2570. " *hybridum*, storblommiga Engel-
 iska sorter, blandade — 40
 2571. " *diadematum* — 30
 2572. " *Odièr* (*Pel. à cinq macules*) — 30
 2573. " *Fancy*, *Fantasipelargonia* — 30
 2574. " *scarlet*, blandade sorter — 20
 2575. " *Tom Thumb*, lågå — 20
 Kända, omyckta kammar- & gruppv.
 Efter frössädd får man ofta nya och
 intressanta sorter.
- Persea**; *Argoträd*; *Maderalager*,
 (*Laurineæ*)
2576. " *indica* (*Laurus*) pr ort 50 öre — 10
 Träd m. pryd. vällukt, blad, men
 onanseln. blmr. Behandl. som vanl.
 lager.
- Pericallis*, se *Cineraria*.
- Petunia*, se modeblommor.
- Phormium**; *Ny-Zelandstlin*, (*As-
 phodoleæ*)
2577. " *tenax* — 20
 Praktig dekorationsv. Fröet gror
 långsamt. Öfver, vid + 1 a 5° C.
- Poinciana**, (*Legum.-Casalpineæ*)
2578. " *Gilliesii* (*Casalp.*) pr ort 30 öre — 5
 2579. " *pulcherrima* (*Casalpinia*) — 15
 2580. " *Regia* (*Casalpinia*) — 50
 Träd m. fint, vackert löfverf och
 praktf. blmr. Pl. i löf- & ljungjord;
 öfver, vid + 10 a 15° C. Blifva
 större och väckrare om de plant. i
 växthuset från grund.
- Primula**; *Majnycikel*, (*Primulaceæ*)
2581. " *simensis albo*, hytt — 10
 2582. " " *albo pl*, hvit dubbel — 35
 2583. " " *cuprea*, kopparröd — 15
 2584. " " *erecta superba*, kopparcar-
 minröd — 20
 2585. " " *alba*, hvit — 40
 2586. " " *fimbriata alba*, fransad, hytt — 20
 2587. " " *alba globosa*, ny utm. — 50
 2588. " " *rubra globosa*, ny, utm. — 50

à Port. Rmt Rd. ö.

2589. *Primula sinensis fimbriata Kermesina splendens*, lys. karmiröd — 25
 2590. „ *siensis fimbriata lilacina alba*
 marg., ny, utmärkt. — 50
 2591. „ *fimbriata purpurea, purpur.* — 20
 2592. „ „ *rosea, rosenröd* — 20
 2593. „ „ *rubra, röd, extra* — 20
 2594. „ „ *striata, hvit med rödt* — 20
 2595. „ „ *macrophylla (filicifolia) alba,*
 hvít, storbladig — 20
 2596. „ „ *rubra, röd* — 30
 2597. „ „ *striata, strimmig* — 30
 2598. „ „ *rubra, vanlig, röd* — 10
 2599. „ „ *striata, vanlig, strimmig* — 10
 2600. „ „ *blandade sortter* — 20

Alla 19 sorterna, rdr 4,50.

12 vackra sortter, „ 3,50.

Dessa utm. pryd. och tacksamma växter blomma nästan hela året om, dockrikast och vackrast under vintermånaderna, då nästan alla andra blmr saknas. Fröet sås om våren, helst i god, lätt sandbl. löf- & ljunghjord och beträckas fuga. De besädda kärlen ställas i en lagom varm driftbänk, hvarest de få qvarstå tillsvidt pl. fätt 3 a 4 blad, då de ompl., 2 tum ifrån hvarandra, i andra käril. När pl. fätt till, styrra ompl. d. hvar för sig i 3 a 4 tums krukor och ställas antingen i en kall driftbänk eller i växthus och vattnas rikl. Öfverv. nära glaset vid + 5 a 6° C. De dubbla sorterna fortpl. om våren genom sticklingar.

Protea; *Silfverträd*, (*Proteaceæ*)

2601. „ *mellifera* — 20
 2602. „ *strobilifera* — 40
 Pl. i ljunghjord; öfverv. vid + 5 a 6° C.
Psidium; *Guajavaträd*, (*Myrtaceæ*)
 2603. „ *Araca (Psidium minus)* — 30
 2604. „ *Cattleyanum* — 20
 2605. „ *pomiferum* — 15
 2606. „ *pyriferum (Guajava pyriforme)* — 15
 Sköna träd m. ätbara, utm. välsmakande frukter. Pl. i kraftig löf- & driftb.-jord. Fordrar om som. rikl. vatten och luft, om vintern + 10 a 15° C. De bär frukt redan som hälvt ugga exemplar.

Punica; *Granaträd*, (*Grenatææ*)

2607. „ *Granatum, Granatiäpple* — 10
 2608. „ *nana, Dverggranat* — 15
 Prydnadsträd, som fälla bladen om vintern och derföre under denne tid hälla till godo med hvarje frostfri plats. Pl. i god löf- & drift.-jord.

Rhodochiton; *Rosenklädning*, (*Serophulariææ*)

2609. „ *volubile (Lophosperm. Rhodoch.)* — 20
 Praktf. slingerv. för temp. växthus. Omvänt för öfverfl. väta. Har talr. egdomsl., purprörda blommor.

Rhododendron; *Alpros*, (*Ericaceæ-Ehodoraceæ*)

2610. „ *arboreum hybr., blandade sortter* — 30
 2611. „ *Catawbiense hybr., många sortter* — 30
 2612. „ *hybridum, många sortter* — 30
 2613. „ *ponticum, blandade sortter* — 10

à Port. Rmt Rd. ö.

Fröet sås i ljunghjord och beträckas mycket tunnt, men hålls jämt fuktigt. De unga pl. oddas de första åren under glas.

Rivinia, (*Phytolaceæ*)

2614. „ *brasiliensis* — 25
 2615. „ *humilis* — 25
 Dessa småbuskar oddas för sina vackra, röda frukter. Pl. i löfjord, öfverv. vid + 15° C.
Roella; *Daggört*, (*Campanulaceæ*)
 2616. „ *ciliata (reticulata)* — 50
 Praktf. m. stora, klockf. hvita och blå blmr. Pl. i lätt, sandbl. ljunghjord och väl dränade krukor. Öfverv. vid + 5 a 8° C. och aktas för öfverflödig fuktighet.

Salvia; *Salvia*, (*Labiataeæ*)

2617. „ *albo-coerulea* — 50
 2618. „ *candelabrum* — 50
 2619. „ *patens, 5 frö* — 75
 Dessa praktv. pl. i god löfjord. Omplant. om våren. Öfverv. vid + 5 a 8° C. Fortpl. gen. sticklingar.
Schizostylus, (*Irideæ*)
 2620. „ *coccinea* — 30
 Skön; blmar om vintern m. stora, skarlakans. blmr. Pl. i löfjord. Öfverv. vid + 5 a 10° C.

Sempervivum; *Takkök*, (*Crassulaceæ*)

2621. „ *aureum (calyciforme)* — 30
 2622. „ *tabuliforme* — 30
 Odas för sina vackra, högst besynnerliga former.

Senecio, se *Cineraria*.**Solanum;** *Trollbär*, (*Solanaceæ*)

2623. „ *capsicatum*, pr ort 50 öre . . . — 8
 2624. „ *Pseudocapsicum*, pr ort 40 öre. — 5
 öfriga arter, se bladväxter.
 Utm. för sina vackra, orangefr. frukter. Pl. i löfjord; öfverv. vid + 5 a 6° C.

Sparmannia, (*Tiliaceæ*)

2625. „ *africana* — 25
 Storv. träd m. stora, ljusgröna blad och hvita blmr. Fordrar löf- & driftbänkjord och + 4 a 5° C.

Statice; *Ormort*, (*Plumbaginææ*)

2626. „ *arborea* — 30
 2627. „ *grandiflora* — 30
 2628. „ *macrophylla* — 20
 Utm. vackra växter, hvars blmr kunnar förvaras afskurna och anv. i vinterbuketter. Pl. i löfjord; öfverv. vid + 4 a 5° C.

Stepotcarpus, se *Didymocarpus*.**Sutherlandia**, (*Papilionaceæ*)

2629. „ *frutescens* . . . pr ort 50 öre — 8
 2630. „ „ *spectabilis floribunda* . . . — 12
 Vackra, något buskartade m. talrika röda blmr. Öfverv. så nära glaset, som möjl. vid + 5 a 8° C. och vatten spars. Om våren uppl. de på passande ställen å fritt land, då de utbildar sig till yvfiga, rikblm. buskar.

Swainsonia, (*Papilionaceæ*)

2631. „ *coronillæfolia* — 30
 2632. „ *Grayana* — 20

	à Port. Rmt Rd. ö.
2633. <i>Swainsonia Osburnii</i>	— 20
2634. " <i>purpurea grandiflora</i>	— 30
" Verkliga prydnadsv. Kunna behandl. som föreg., hvilka de mycket likna.	
Tacsonia, (Passifloræ)	
2635. " <i>ignea</i>	— 30
2636. " <i>splendens</i>	— 45
" Praktiga slingerv. för temp. växthus och boningsrum. Pl. i löf- & ljungj.	
Tamarindus; Tamarind, (Legum.-Cæsalpineæ)	
2637. " <i>indicus</i>	— 50
Högt träd m. pryd. löfverk. Frukt- tenerhällespå apotheken under namn af tamarinder. Pl. i löf- & drifts- jord; öfverv. vid + 15 a 20° C.	
Teucrium; Gamander, (Labiateæ)	
2638. " <i>Marum (Marum verum) Kattört</i>	— 30
Utm. för sin starka, men behagl. lukt. Bör aktas för kattor, som tycka om lukten.	
Thunbergia, se slingerväxter.	
Trachelium; Plymblomster, (Campanulaceæ)	
2639. " <i>coeruleum</i> , blå, pr ort 75 öre	— 10
2640. " " <i>album</i> , hvit	— 10
Tvårig; öfverv. vid + 4 a 6° C. och utpl. om våren på grupper, hvar till den är utmärkt vacker.	
Tritomanthe, (Asphodeloæ)	
2641. " <i>Uvaria grandiflora (Tritoma Uv.; Veltheimia speciosa; Aletris Uv.; Kniphofia Uvaria)</i>	— 25
Stätl. prydnadsv. m. talr. cylinderf., brandgula blmr. som knippevis nedhänga från toppen av den 2 a 3 fot höga stängeln. Pl. i god, kraftig löf- & drifts-jord; utpl. om sommaren. Öfverv. vid + 4 a 6° C.	
Tydaea, (Gesneriaceæ)	
2642. " nya sorter blandade	— 25
Dessa med Gesneria, Achimenes & Gloxinia nära befryndade prydnadsblmr äro utm. vackra och tacksamma. Rötterna, som under vintern ligga aldeles torra, ompl. om våren i halfrutten skogs- eller löjförd, hvarefter de ställas varmt och hållas lagom fuktiga. Behandl. eljest som Achimenes.	
Verbena; Jernört, (Verbenaceæ)	
2643. " hybrida i praktf. sort, p. ort 1 rdr	— 12
2644. " " storblom., aldra bästa sorter	— 20
2645. " " striata, nya, italienska	— 25
2646. " " <i>coccinea</i> , skarlaakanröd	— 30
2647. " " <i>coerulea</i> , blå	— 20
2648. " " <i>alba pura</i> , rent hvit	— 35

	à Port. Rmt Rd. ö.
2649. <i>Verbena teucrioides</i> , hvit, vällukt., —	8
pr ort 50 öre	
Alla 7 sorterna, rdr 1,25.	
Verkliga praktväxter för såväl grup- per, som för krukor.	
Veronica; Årenpris, (Scrophu- lariaceæ)	
2650. " <i>Andersonii</i>	— 20
2651. " <i>Lindleyana</i>	— 20
2652. " många sorter, blandade	— 20
Träd- eller buskarterade, utm. vackra och tacksamma växter för temp. växthus och boningsrum. Om de i Juni utpl. på fritt land i god jord blifva de stora och lummiga samt utveckla under hösten, vintern och våren talr. blmr. Fortpl. lätt genom stiekl., hvilka, tagna om våren, följerande höst blomma.	
Viburnum; Snöboll, (Caprifoliaceæ)	
2653. " <i>rugosum (rigid.; strictum; lalifol.)</i>	— 15
2654. " <i>Tinus (Laurus Tin.)</i> p. ort 20 ö. —	
Träd eller buskar m. glatta, lager- lika blad och hvita blmr. Pl. i löf- & driftsbinkjord. Öfverv. vid + 1 a 5° C.	
Vinca, (Apocynæ)	
2655. " <i>rosea</i>	— 5
2656. " " <i>fl. alba</i>	— 5
Dessa pryd. växter pl. i kraftig löf- jord och öfverv. vid + 12 a 15° C. Odlas under som. bäs i en lagom varm kast. Anv. under blomntiden till dekorering. Blirna framkomma i mängd och äro stora, ljus- röda eller rent hvita.	
Wigandia, se bladväxter.	
Yucca; Palmilija, (Liliaceæ)	
2657. " <i>aloefolia</i>	pr ort 50 öre — 8
2658. " " <i>fol. var.</i>	— 15
2659. " " <i>rosea</i>	— 30
2660. " " <i>rubra</i>	— 30
2661. " <i>Draconis</i>	— 40
2662. " <i>gloriosa</i>	— 20
Alla sorterna, rdr 1,10.	
Ställiga dekorationsv. m. praktfulla hvita eller hvitgula, vällukt. blmr. Fordra kraftig jord och + 5 a 10° C.	

Då urvalet af sorterna oinskränkt	
anförfros åt oss, lemnas:	
100 sorter krukväxter	rdr 15 —
50 " krukväxter	8 —
25 " utmärkta krukväxter	4,50
12 " " krukväxter	2,50

E. Ormbunkar. (Filices.)

Groddkornen (sporerna) af ormbunkarne motsvara fröet af de phanerogama växterna och kunna säs när som helst. De säs i vanliga flata, fröfat eller, i brist på sådiana, i runt krukor, på hvars bottnar man lägger ett starkt lager af sönderstötta tegelbitar eller trädö, hvorpå lägges god, halfrutten vegetabilisk jord, som först varit utsatt för en så stark hetta, att alla i densamma förut befinnliga frö och sporer förlorat sin grobarhet. Sedan jorden blifvit jemnad på ytan, utsäs grodd-

kornen och nedtryckas lindrigt med en passande, släthyflad träbit, hvarefter krukorna öfvertäckas med glasskifvor, på det att inga främmande frö eller sporer af andra ormbunkar må kunna blanda sig med det sådda. För att yttermera förhindra detta, äfvensom för att ej bortsköja eller rubba de sädda spörerna, vattnas krukorna nedifrån genom att nedsänkas uti andra, vattenfylda kärl. Hufvudvilkoren för ett godt resultat äro: jemn värme, fuktighet och skugga. När plant. uppnått såpass storlek att de kunna fattas med fingrarne, oml. de, först i små, sedan i större och större krukor. Under första året är vanl. 2 à 3 oml. nödvändiga, men sedan exempl. uppnått sin naturliga storlek behöva en del sorter blot ompl. en gång årligen, andra deremot en gång kvartannat, tredje, fjerde eller femte år, allt efter de olika sorternas beskaffenhet. De med C märkta sorterna fordra om vintern + 10 à 15°, de med T. + 5 à 8° C. De üfriga arterna tåla vintern på kall jord.

a Port. Rmt Rd. ö.

2663. <i>Adiantum Capillus-Veneris</i> , T.	— 10
2664. " <i>concinnum</i> , T.	— 10
2665. " <i>Cunninghamii</i> , C.	— 25
2666. " <i>formosum</i> , T.	— 25
2667. " <i>hispidulum</i> , C. T.	— 10
2668. " <i>macrophyllum</i> , C.	— 25
2669. " <i>lunatum</i> , C.	— 30
2670. " <i>pubescens</i> , C.	— 15
2671. " <i>trapeziforme</i> , C.	— 30
Alla sorterna, rdr 1,60.	
2672. <i>Alsophila australis</i> , T.	— 15
Stor, trädartad, utmärkt väcker.	
2673. <i>Aspidium caripense</i> , T.	— 20
2674. " <i>erythrosorum</i> , C.	— 50
2675. " <i>fraxinifolium</i> , C.	— 25
2676. " <i>glabellum</i> .	— 25
2677. " <i>macrophyllum</i> , C.	— 25
2678. " <i>trifoliatum</i> , C.	— 25
2679. " <i>violaceans</i> , C.	— 10
Alla 7 sorterna, rdr 1,60.	
2680. <i>Asplenium Belangerii</i> , C.	— 25
2681. " <i>bulbiferum</i> , T.	— 10
2682. " <i>erectum</i> , C.	— 10
2683. " <i>flabellifolium</i> , C.	— 80
2684. " <i>firmum</i> , C.	— 30
2685. " <i>foeniculicum</i> , C.	— 30
2686. " <i>fontanum</i> .	— 25
2687. " <i>glaberrimum</i> , C.	— 25
2688. " <i>Nidus</i> , C.	— 50
2689. " <i>praemorsum</i> , C.	— 25
2690. " <i>tovarensse</i> , T.	— 15
2691. " <i>viride</i> .	— 15
Alla 12 sorterna, rdr 2,60.	

2692. <i>Athyrium</i> (<i>Aspidium</i>) <i>Filix foem.</i>	
multiceps	— 25
2693. " (<i>Aspid.</i>) <i>Filix foem. purpureum</i>	— 20
2694. " " <i>Filix foem. laeiniatum dis-</i>	
sectum	— 25
2695. " " <i>foem. thysanotum</i> .	— 20
2696. " " <i>diffusum</i> .	— 20
2697. " " " <i>mulfifurcatum</i> .	— 25
2698. <i>Blechnum boreale</i> .	— 20
2699. " <i>brasiliense</i> , trädartad, C.	— 15
2700. " <i>fraxineum</i> , C.	— 15
2701. " <i>glandulosum</i> , C.	— 15
2702. <i>Cenopteris japonicus</i> , C.	— 10
2703. <i>Cibotium Schiedei</i> , C.	— 25
Utm.; Bladen ofta 8 à 10 fot långa.	
2704. <i>Cyrtomium falcatum</i> , T.	— 20
2705. <i>Cystopteris fragilis</i> var. <i>obtusa</i>	— 20
2706. <i>Didymochlaena lunulata</i> , C.	— 25
Stor, praktfull ormbunka.	

a Port. Rmt Rd. ö.

2707. <i>Doodia aspera</i> , C. T.	— 10
2708. " <i>lumulata</i> , T.	— 10
2709. " <i>rupestris</i> , T.	— 10
2710. <i>Doryopteris nobilis</i> , C.	— 75
2711. " <i>palmata</i> , C.	— 25
2712. <i>Elaphoglossum callaeolium</i> , C.	— 40
2713. <i>Goniophlebium apendicula-</i>	
tum	— 25
2714. <i>Gymnogramma hybrida</i> , C.	— 15
2715. " <i>l'Herminierii</i> , C.	— 25
2716. " <i>Martensi</i> .	— 15
2717. " <i>tatarea</i> .	— 10
2718. <i>Lastrea augescens</i> , C.	— 10
2719. " <i>Filix mas. spinulosa</i> .	— 20
2720. " " <i>mas. grandiceps</i> .	— 25
2721. " <i>aemula</i> .	— 20
2722. " <i>dilatata</i> .	— 15
2723. <i>Lomaria gibba</i> , praktfull, C.	— 20
2724. <i>Osmunda spectabilis</i> v. <i>gracilis</i>	— 25
2725. <i>Phegopteris interruptum</i> , T.	— 25
2726. " <i>spectabilis</i> , trädartad, C.	— 25
2727. <i>Phymatodes pustulata</i> , C.	— 25
2728. " <i>Billardieri</i> , C.	— 25
2729. " <i>longipes</i> , C.	— 25
2730. <i>Polypodium aureum</i> , C.	— 20
2731. " <i>glaucum</i> , C.	— 20
2732. " <i>paradiseae</i> , C.	— 15
2733. " <i>sporadocarpum</i> , C.	— 20
2734. " <i>vulgare</i> .	— 5
2735. " <i>bifido-lobatum</i> .	— 25
2736. <i>Pteris argyrea</i> , C.	— 25
2737. " <i>arguta</i> , C.	— 15
2738. " <i>aspericaulis</i> , C. T.	— 20
2739. " <i>aurita</i> , C.	— 20
2740. " <i>Blumeana</i> , C.	— 10
2741. " <i>cretica fol. var.</i> , C. T.	— 10
2742. " <i>geranifolia</i> , C.	— 25
2743. " <i>glaucovirens</i> , C.	— 25
2744. " <i>longifolia</i> , C.	— 10
2745. " <i>paleacea</i> .	— 10
2746. " <i>palmata</i> , C.	— 25
2747. " <i>pyrophila</i> , C.	— 25
2748. " <i>serrulata</i> , C. T.	— 10
2749. " <i>tremula</i> , C. T.	— 15
2750. " <i>umbrosa</i> .	— 15
Alla 15 sorterna, rdr 2,30.	

Då urvalet af sorterna oinskränkt

öfverlämnas åt oss, lemnas:

50 sorter Ormbunkar.	rdr 7 —
25 " Ormbunkar för växthus	4,25
12 " " för fritt land.	2 —

F. Barrväxter:

(Conifere.)

Fröet till många sorter utländska barrträd ligger ofta flera månader — af vissa sorter t. ex. *Innipes*, *Taxus* m. fl. ett år och deröver — i jorden innan det gror och det händer derföre stundom att jorden under tiden blifver hvad man kallar sur, i hvilket tillstånd den är oduglig för all vegetation. Fröet måste då åter uplockas och sås i ny, frisk jord. För att påskynda grönningen plägar man låta fröet ligga, någon tid innan det sås, i ljumt vatten, hvarigenom det kärnan omgivande skælet uppmjukas, så att grodden lättare kan framkomma. Den bästa jördbländan för dessa växter är: lika delar grästorffjörd, löf- och ljungjord, blandad med grof sand och något lera. De vackraste och mest intressanta barrträden härstamna från trakter, der medeltemperaturen är + 8 à 10° C., hvarföre de hos oss ej tåla vintern på kalljord, men planterade i baljor eller krukor och öfvervintrade vid + 0 à 5° C. utveckla sig de flesta sorterna till praktfulla exemplar. Många barrträd hålla under vintern tillgodo med ganska anspråkslösa platser, bakom ställagen i kalla växthus, i odlade boningsrum, eller torra och nägorlunda ljusa källare. De äro särdeles användbara till dekorationer, om sommaren i det fria och om vintern i växthus och boningsrum. De med ett T. utmärkta sorterna öfvervintras så, som ofvan är nämndt; de med B. planteras på kalljord och betäckas under vintern; de öfriga tåla våra vintrar ute på fritt land.

	à Port. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.	à Port. Ort.	Rmt Rd. ö. Rd. ö.
Abies; Gran, (Abietinæ)				
2751. " acutissima	— 10	— 60	2771. <i>Cupress. glauca pend. vera</i> , T. — 12 — 80	
2752. " alba (A. glauca; <i>Picea</i> alba; <i>Pinus alba</i>)	— 8	— 50	2772. " <i>Lawsoniana</i>	— 20 —
2753. " canadensis (<i>Picea</i> ; <i>Tsuga</i> canadensis)	— 5	— 30	2773. " <i>macrocarpa</i>	— 30 —
2754. " <i>exelsa</i> (<i>Pinus Abies</i>) <i>Vanlig Gran</i> , pr. #. 2 rdr	— 5	— 5	2774. " <i>majestica</i>	— 20 —
	pr. 100 #. 190 rdr.		2775. " <i>sempervirens</i> (<i>fastigiata</i> ; <i>pyramidalis</i> ; <i>stricta</i>)	
2755. " <i>nigra</i> (Ab. <i>Mariana</i> ; <i>Pinus nigra</i> ; <i>Pin. marylandica</i>)	— 8	— 50	Åkta <i>Cypress</i> , T.	— 5 — 15
2756. " <i>orientalis</i> , utmärkt vacker	— 25	— —	2776. " " <i>horizontalis</i> (<i>expansa</i> ; <i>fastigiata horizont.</i>) T. — 5 — 15	
2757. " <i>rubra</i> (A. <i>nigra rubra</i> ; A. <i>arctica</i> ; <i>Picea rubra</i> ; <i>Pinus americana</i>) <i>Amerikansk Rödgran</i>	— 10	— 75	2777. " " <i>pendula</i> , T.	— 8 — 50
Araucaria, (Abietinæ)			2778. " " <i>thurifera</i> (<i>Benthamii</i>) T. — 20 —	
2758. " <i>brasiliensis</i> , T. 2 frö.	— 60	— —	2779. " " <i>torulosa</i> , T.	— 12 —
Callitris, (Cupressinæ)			2780. " " <i>elegans</i> , T.	— 12 —
2759. " <i>australis</i> (<i>Cupressus</i>) T. — 15 —			2781. " " <i>Tournefortii</i> , T.	— 20 —
2760. " <i>cupressiformis</i> , T.	— 30	— —	<i>Cupr. Laws.</i> är ett af de vackraste prydnadsträd för kalljord; behöfver blott i unddomen skydd mot stränga vintrar.	
Casuarina , se krukväxter.				
Cedrus; Ceder, (Abietinæ)			Frenela, (Cupressinæ)	
2761. " <i>atlantica</i> , <i>Hvitceder</i> , T.	— 25	— —	2782. " <i>australis</i> , T.	— 20 —
2762. " <i>Libani</i> (<i>Pinus Cedrus</i>) <i>Libanonceder</i> , T.	— 25	— —	2783. " <i>pyramidalis</i> , T.	— 25 —
Chamaecyparis, (Cupres-			Ginkgo. (Taxinæ)	
sineæ)			2784. " <i>biloba</i> (<i>Salisburia adiantifolia</i>) — 60 —	
2763. " <i>sphæroidea</i> (Cupressinæ			Juniperus; En; (Juniperinæ)	
thyoides), T. B.	— 20	— —	2785. " <i>Bermudiana</i>	— 5 — 20
Cryptomeria, (Cupressinæ)			2786. " <i>communis</i> , <i>Vanlig En.</i>	— 5 — 5
2764. " <i>japonica</i> , T.	— 5	— 30	pr #. 1 rdr	
2765. " <i>Lobbii</i> , T.	— 12	— —	3787. " " <i>pyramidalis</i>	— 5 — 20
Cunninghamia, (Abietinæ)			2788. " " <i>suesica</i>	— 5 — 20
2766. " <i>sinensis</i> , T.	— 12	— —	2789. " <i>exelsa</i> (<i>foetida exelsa</i> ; <i>foetidissima</i>) T.	— 5 — 30
2767. " <i>glauca</i> , T.	— 25	— —	2790. " <i>Lysia</i> (<i>davurica</i> ; <i>phoenicia</i> ; <i>Pseudo-Sabina</i>) T.	— 5 — 10
Cupressus; <i>Cypress,</i> (Cu-			2791. " <i>Oxycedrus</i> (<i>Monspeliensis</i> ; <i>Oxycedr. phoenicia</i>) B. — 5 — 10	
pressinæ)			2792. " <i>prostrata</i> (<i>alpina</i> ; <i>Hudsonia</i> ; <i>Sabina humilis</i>)	— 5 — 20
2768. " <i>elegans</i> , T.	— 12	— 80	2693. " <i>Sabina</i> , <i>Vanlig Säfvenbom</i> — 5 — 10	
2769. " <i>funebris</i> (<i>pendula</i>) T.	— 10	— 75	2794. " <i>sabinoides</i> (<i>Sab. gracilis</i>) — 15 —	
2770. " <i>Goveniana</i> , T.	— 15	— —	2795. " <i>virginiana</i> , <i>Blyertseeder</i>	— 5 — 10
			2796. " " <i>glauca pendula</i>	— 12 — 90

	à Port. Ort.		à Port. Ort.	
	Rmt Rd. ö. Rd. ö.		Rmt Rd. ö. Rd. ö.	
Larix; Lärkträd, (Abietineæ)				
2797. " <i>americana</i> — 12 —				
2798. " <i>pendula</i> — 20 —				
2799. " <i>europea</i> (<i>Pinus Larix</i>) <i>Vanlig Lärkträd</i> , pr. fl. 2 rdr — 5 — 5				
Picea; Tall, (Abietineæ)				
2800. " <i>balsamea</i> (<i>Abies</i> , <i>Pinus balsamea</i>) <i>Balsamtall</i> . . . 8 — 40				
2801. " <i>cephalonica</i> (<i>Pinus Abies Apollinis</i> ; <i>cephalonica</i>) . . . 8 — 50				
2802. " <i>Fraserii</i> (<i>Abies</i> , <i>Pinus Fr.</i> ; <i>Pinus balsamea</i> <i>Fraserii</i>) — 15 —				
2803. " <i>Nordmanniana</i> (<i>Ab.</i> , <i>Pinus Nordmanniana</i>) — 8 — 50				
2804. " <i>pectinata</i> (<i>Pin. Picea</i> ; <i>pectinata</i> ; <i>Abies pectin. alba</i> ; <i>taxifol.</i> ; <i>vulg.</i>) <i>Silfvergrund</i> — 8 —				
2805. " <i>Pichta</i> (<i>Ab.</i> , <i>Pinus Pichta</i> ; <i>sibirica</i>) <i>Becktall</i> — 15 —				
2806. " <i>Pinsapo</i> (<i>Ab.</i> , <i>Pin. Pins.</i>) — 10 — 60				
Pinus; Fur, (Abietineæ)				
2807. " <i>austriaca</i> (<i>nigra</i> ; <i>nigrescens</i>) <i>Österrikisk Fur</i> , p. fl. 5 rdr — 5 — 10				
2808. " <i>Cembra</i> , <i>Cembrafur</i> , <i>Zerbelnötter</i> , m. åtbara nötter — 5 — 5 pr. fl. rdr 1,50				
2809. " <i>halepensis</i> , <i>Aleppofur</i> , T. — 5 — 15				
2810. " <i>inops</i> (<i>variabilis</i> ; <i>virginiana</i>) <i>New-Jersyfur</i> — 8 — 50				
2811. " <i>Lambertiana</i> , <i>Lambertfur</i> — 12 — 80				
2812. " <i>Laricio</i> (<i>corsicana</i> ; <i>altilissima</i> ; <i>maritima</i>) <i>Strandfur</i> , B. — 5 — 25				
2813. " <i>montana</i> , <i>Bergfur</i> — 5 — 15				
2814. " <i>Mugho</i> (<i>Mughus</i> ; <i>uncinata</i>) <i>Dvergfur</i> — 5 — 30				
2815. " <i>Peuce, Grekisk Lyncosfur</i> — 10 — 75				
2816. " <i>Pinea, Italiensk Pinie</i> , T. — 5 — 8 pr. fl. 4 rdr.				
2817. " <i>Pinaster</i> (<i>chinensis</i> ; <i>japonica</i> ; <i>maritima</i> ; <i>Mossonia</i> ; <i>nepalensis</i> ; <i>Nova Hollandica</i> ; <i>Nova Zealandica</i>) <i>Stjernfur</i> , pr. fl. 2 rdr . . . — 5 — 5				
2818. " <i>pyrenaica</i> (<i>Halepensis major</i> ; <i>hispanica</i> ; <i>Laricio pyrenaica</i> ; <i>Lar. monspeliensis</i> ; <i>Pinaster hispanica</i> ; <i>Pseudo-Halepensis</i> ; <i>Salzmannii</i>) <i>Pyrenéefur</i> , utn. — 12 — 90				
2819. " <i>rigida</i> (<i>canad.</i> ; <i>trifol.</i>); <i>Tæda rigida</i> ; <i>Pinus LoddigesiiAmerikansk Becktall</i> — 15 —				
2820. " <i>strobos</i> , <i>Weilmuthstall</i> . . . — 5 — 25				
2821. " <i>sylvestris</i> , <i>Vanlig nordisk Fur</i> . . . pr. fl. 3 rdr — 5 — 6				
2822. " " <i>argentea</i> — 15 —				
2823. " " <i>ricensis</i> , <i>Rigafur</i> , be römd för sin varaktiga ved pr. fl. 8 rdr				
2824. " <i>Tæda</i> (<i>virginiana tenuifol.</i>) — 20 —				
2825. " <i>taurica</i> (<i>Pallasiana</i> ; <i>Lario Pallasiana</i>) — 5 — 20				
Sequoja, (Cupressineæ)				
2826. " <i>sempervirens</i> , T. — 20 —				
Taxodium, (Cupressineæ)				
2827. " <i>distichum</i> , (<i>Cupr. dist.</i>) B. — 10 —				
Taxus; Idegran, (Taxineæ)				
2828. " <i>baccata</i> , vanlig, pr. fl. 8 rdr — 5 — 15				
2829. " <i>canadensis</i> — 5 — 25				
2830. " <i>fastigiata</i> (<i>hybernitica</i>) — 15 —				
2831. " <i>tardiva</i> (<i>adpressa</i>) — 10 — 60				
Thuja; Lifsträd, (Cupressineæ)				
2832. " <i>articulata</i> (<i>Callitris quadrivalvis</i>) — 8 — 50				
2833. " <i>compacta</i> , T. — 8 — 50				
2834. " <i>gigantea</i> (<i>Libocedrus decurrens</i>) utmärkt, B. — 50 —				
2835. " <i>hybrida</i> , vacker, T. B. — 20 —				
2836. " <i>Lobbii</i> , skön, B. — 20 —				
2837. " <i>Meldensis</i> (<i>Biota Meldens.</i>) — 20 —				
2838. " <i>occidentalis</i> — 5 — 20				
2839. " " <i>intermedia</i> — 8 — 50				
2840. " " <i>orientalis</i> , B. — 5 — 20				
2841. " " <i>argentea</i> , T. B. — 25 —				
2842. " " <i>aurea</i> , T. B. — 30 —				
2843. " " <i>crassifolia</i> , T. B. — 30 —				
2844. " " <i>fastigiata</i> , T. B. — 10 — 60				
2845. " " <i>gracilis</i> (<i>nepalens.</i>) T. B. — 15 —				
2846. " " <i>pyramidalis</i> , T. B. — 8 — 40				
2847. " " <i>plicata</i> (<i>occid. pl.</i> ; <i>robusta</i>) — 20 —				
2848. " <i>stricta</i> , B. — 10 — 75				
2849. " <i>tatarica</i> (<i>australis</i> ; <i>orientalis tatarica</i>) T. B. — 8 — 40				
Wellingtonia, (Cupressineæ)				
2850. " <i>gigantea</i> (<i>Sequoja gig.</i>) B. — 40 —				
Detta trädslag är obestridligen en av de aldra vackraste barrväxter.				

Andra Afdelningen,

Prisföreteckning å växter:

(Uppställd i den ordning, som finnes angiven uti innehållsförteckningen, på priskurantens första sida)

I. Fruktträd, Bärbuskar m. m.

	Pr st., Rmt Rd. öre.	Pr st., Rmt Rd. ö.
Äppleträd; <i>Pyrus Malus</i>, (Pomaceæ)		Vinbär, svarta, stor och god sort . . . — 20
" halftämmiga med namn	1,25	pr 100 st., 16 rdr; 12 st., 2 rdr.
" " m. namn, 50 st., vårt val, 50 rdr.		" körsbärs-, röda utm., pr 12 st., 3 rdr — 30
" " " 25 st., vårt val, 30 "		" Prince Albert, röda, stora, utmärkta — 30
" pyramidformiga med namn	1,25	pr 12 st., 3 rdr.
" spalierformiga med namn	1,50 à 3 —	" Queen Victoria, svarta, stor sort . . . — 30
Päronträd; <i>Pyrus communis</i>, (Pomaceæ)		pr 12 st., 3 rdr.
" halftämmiga med namn	1,25	Ogden's, svarta, stor sort — 35
" " m. namn, 50 st., vårt val, 50 rdr.		pr 12 st., rdr 3,50.
" " " 25 st., vårt val, 30 "		" högröda, stora pr 12 st., 4 rdr. . . . — 40
" pyramidformiga med namn	1,25	
" spalierformiga med namn	1,50 à 3 —	
Plommon; <i>Prunus domestica</i>, (Amygdaleæ)		
" halftämmiga med namn	1,50	
" " m. namn, 50 st., vårt val, 70 rdr.		
" " " 25 st., vårt val, 36 "		
" spalierformiga med namn	1,50 à 3 —	
Körsbärsträd; <i>Prunus Cerasus & Avium</i>, (Amygdaleæ) (Bigareau, Klarbär, Majkörsbär, Glaskörsbär, Moreller o. s. v.)		
" halftämmiga med namn	1,50	
" " m. namn, 50 st., vårt val, 70 rdr.		
" " " 25 st., vårt val, 36 "		
" spalierformiga med namn	1,50 à 3 —	
Apricoser; <i>Prunus Armeniaca</i>, (Amygdaleæ)		
" spalierformiga, unga, rdr 2,50; äldre 6 —		
Persicor; <i>Amygdalus Persica</i>, (Amygdaleæ)		
" spalierformiga, unga, rdr 2,50; äldre 6 —		
Vindruvor; <i>Vitis Vinifera</i>, (Vitifereæ)		
" utm. sorter i unga, friska exemplar 1,50		
" m. namn, 12 sorter, vårt val, 15 rdr.		
Fikonträd; <i>Ficus Carica</i>, (Urticaceæ)		
" starka, fruktberande exemplar	2,50	
Kastanier; <i>Castanea vesca</i>, (Amentaceæ)		
" äkta, unga exemplar	— 25	
Krusbär; <i>Ribes Grossularia & Uva crispa</i>, (Ribesiaceæ)		
" engelska, utmärkta sorter med namn — 30		
pr 100 st., 22 rdr; 12 st., 3 rdr.		
" i rummel, goda sorter utan namn — 20		
pr 100 st., 15 rdr; 12 st., 2 rdr.		
Vinbär; <i>Ribes rubr. & nigr.</i>, (Ribesiaceæ)		
" röda, holländska, stor, god sort . . . — 20		
pr 100 st., 16 rdr; 12 st., 2 rdr.		
" hvita, holländska, utm., pr 12 st., 3 rdr — 30		
Hasselöt; <i>Corylus Avellana</i>, (Amentaceæ)		
" vanliga		
" Lambertska, riktbärande, stora	1 —	
" Zeller-, Gunslebener	1 —	
" tidiga, långa	1 —	
" med röda kärnor	1 —	
" Waterloo.	1,25	
Smultron; <i>Fragaria vesca m. fl.</i>, (Rosaceæ)		
" flera olika sorter, pr 100 st., 3 rdr —		
" " goda sorter, bland., pr 100 st., 2 rdr —		
Sparris; <i>Asparagus officinalis</i> (Asparagineæ)		
" Darmstäder, 2-åriga, pr 100 st., 2 rdr —		
" jätte-, äkta, 2-åriga, pr 100 st., rdr 2,50 —		
Behandling, se förförteckningen, Köks-trädgårdsväxter, rubr.: Sparrisväxter.		
Matrhabarber; <i>Rheum</i>, (Polygoneæ)		
" Queen Victoria . . . pr 12 st., 3 rdr — 30		
" vanlig, pr 100 st., 12 rdr; 12 st., rdr 1,50 — 15		
Behandling, se förförteckningen, Köks-trädgårdsväxter, rubriken: Sparrisväxter.		
Gräslök; <i>Allium Schoenoprasum</i>, (Asphodelaceæ)		
" pr torfva 25 öre.		

II. Träd och Buskar till Allée-, Park- och Trädgårdsanläggningar:

B. betyder: att de växter, vid hears namn det står, böra under vintern betäckas; Ö: att de böra frostfritt öfvervintras och S.G. betyder: ständigt grön. Då dessa tecken stå vid slägtnamnen, gälla de äfven för alla arterna. Växternas familjnamn och hemland finnes äfven angivet.

Pr st. Rmt Rd. ö.

Abies; <i>Gran;</i> (<i>Abietinææ</i>) S. G.	
„ <i>alba</i> (<i>Pinus alba</i> ; <i>glaucæ</i> ; <i>laxa</i> ; <i>te-</i> <i>tragona</i>) Norra Amerika	1 —
„ <i>exelsa</i> (<i>Pinus Abies</i>) vanlig, Europa ; flera gånger oimplant exemplar — 50	
„ var. <i>norvegica</i> , vackra exemplar	2,50
„ <i>nigra</i> (<i>marianna</i> ; <i>Pinus marylandica</i> ; <i>Pinus nigra</i>) N. Amerika	1 —
„ <i>orientalis</i> , Orienter ; praktf. unga ex.	2,50
„ <i>Menziesii</i> (<i>Pinus</i> ; <i>Picea Sitchensis</i>) Nordv. Amerika ; starka exemplar	3 —

Acer; *Lönn,* (*Acerinææ*)

„ <i>campestre</i> , <i>Näverlönn</i> , Södra Sverige — 25	
„ <i>dasycarpum</i> , <i>Silfverlönn</i> , N. Amerika — 50	
„ <i>leatum</i> (<i>colechicum</i> ; <i>attnense</i>) Kaukasus — 1 —	
„ <i>Negundo</i> (<i>N. aceroides</i> ; <i>fraxinif.</i>) N. Am. — 50	
„ fol. arg. var., utmärkt, B.	2,50
Ett bland de vackraste kända träd med brokiga blad; bör planteras på ett torrt och skyddadt ställe.	
<i>Opulus</i> (<i>opulifol.</i> ; <i>italicus</i>) S. Europa	1 —
„ <i>plantanoides</i> ; vanlig, Sverige ; starka, 5 à 6 fot höga, pr 100 st., 85 rdr 1 —	
„ mindre . . . pr 100 st., 45 rdr — 50	
„ fol. var. med brokiga blad	1,50
„ <i>dissectum</i>	2,50
<i>Pseudoplatanus</i> , <i>Sykomorlönn</i> , Europa — 40	
„ buskar till bersäder, p. 12 st., 5 rdr — 50	
„ fol. atropurpureis, m. mörkbr. blad — 75	
„ „ variegatis, med brokiga blad	2 —
„ <i>rubrum</i> (<i>carolinian.</i> ; <i>virgin.</i>) N. Am. 1 —	
„ <i>sacharinum</i> , <i>Sockerlönn</i> , N. Amerika 1 —	

Aesculus; *Hästkastanje*, (*Hippocastanææ*)

„ <i>Hippocastaneum</i> , vanl, starka exempl. 1 —	
pr 100 st., 90 rdr	
„ 2 fot höga, opli., pr 100 st., 15 rdr — 20	
„ fol. <i>laciniatum</i> , unga exemplar	2 —
„ „ var., med brokiga blad	2 —
„ <i>Pavia</i> (<i>Pavia flava</i> ; <i>lutea</i>) N. Amer. 1 —	
„ <i>rubicunda</i> , m. vackra, röda blmr, N. Am. 1 —	

Alnus; *Al*, (*Amentaceæ*)

„ <i>argentea</i> , <i>Silfveral</i> , N. Amerika	1 —
„ <i>glutinosa</i> , <i>Klibbl</i> , Europa , 3 à 4 fot höga ex., pr 100 st., 12 rdr	— 20
„ <i>incana</i> , <i>Grål</i> , Europa , 3 à 4 fot höga ex., pr 100 st., 15 rdr	— 25

Amelanchior; *Bärismispel*, (*Pomaceæ*)

„ <i>Botryapium</i> (<i>Pyrus Amel.</i>) Europa	25
pr 12 st., rdr 2,50	

Vacker, härdig buske, m. talrika, hyvita
blommor tidigt om våren.

Amorpha; *Falsk Indigo*, (*Papilionaceæ*)

„ <i>fruticosa</i> , N. Amerika	50
„ <i>Levisii</i>	50
„ <i>glabra</i> (<i>caroliniana</i>) Carolina	50

Pr st. Rmt Rd. ö.

Utm. sig hufudsakl. för sitt vackra löfverk.
Nägot känsliga för vintern i mellersta Sverige.

Ampelopsis; *Jungfruvin*; *Vildvin*, (*Viniferææ*)

„ <i>hederacea</i> , pr 100 st. 16 rdr; 12 st. 2,25 — 20	
En af de bästa och starkaste rankv. till beklädn. af murar, verandor och dylkt.	

Amygdalopsis, se *Prunus triloba*.

Amygdalus; *Mandel*, (*Amygdaleææ*)

„ <i>communis</i> , vanlig, Södra Europa	1,25
„ var. <i>campestris</i> (<i>Amygd. campestr.</i>) — 50	

„ <i>persica</i> fl. pl. med dubbla blmr, B. 2 —	
„ <i>pumila</i> fl. pl. (<i>Prun. japon.</i>) Japan , B. 2 —	

Aralia; *Bergangelika*, (*Araliaceæ*) B.

„ <i>spinosa</i> , N. Amerika	1,50
Utmärkt för sina vackra blad.	

Araucaria; (*Abietinææ*) S. G. Ö.

„ <i>imbricata</i> , Chili , yngre exemplar	6 —
Verkliga praktexemplar af detta besynnerliga träd, finns till 30, 40 a 50 rdr pr st. Se vidare bland krukväxter.	

Aristolochia; *Pipblomster*, (*Aristolochieææ*)

Sipho, **N. Am.**, sling.v. fordr. varmt läge 1,50

Aucuba; *Guldträd*, (*Cornææ*) S. G. Ö.

„ <i>himalaica</i> , Himalaja	2,50
„ <i>japonica</i> , Japan ; unga exemplar	1,25

„ <i>alba maculata</i>	2,50
„ <i>bicolor</i>	2,50

„ <i>grandidentata</i>	2,50
„ <i>hermaphrodita</i>	3 —

„ <i>latimaculata</i>	2 —
„ <i>macrocarpa</i>	3 —

„ <i>viridis</i>	2,50
Härdiga buskar med gulfläck, eller rent gröna blad. Användb. till dekorörer på fritt land, i boningsrum och kalla växt- hus. Planteras i löf- & grästorfjord.	

Azalea; *Ejelros*, (*Rhododaceææ*)

„ <i>pontica</i> , Mindre Asien , flera sorter	1,25
Behandl. se fröförtreckningen.	

Berberis; *Surtörne*, (*Berberideææ*)

„ <i>aquifolia</i> (<i>Mahonia</i>) N. Amer. , S. G. — 25	
pr 12 st., rdr 2,50	

„ <i>canadensis</i> , N. Amerika	1 —
„ <i>vulgaris</i> , vanlig, Europa , Mell. Asien ,	

starka buskar, pr 12 st., rdr 2,50 — 25	
„ 3-åriga, pr 100 st., 3 rdr	—

„ fol. atropurpureis med röda blad	
utmärkt vacker prydnadsväxt — 75	

„ <i>marginatis</i> , vackra blad	— 75
marginerat, vackra blad	

Betula; *Björk*, (*Amentaceææ*)

„ <i>alba</i> , vanlig, Eur. , Asien : 4 à 5 fot	
höga, opli., pr 100 st., 25 rdr — 30	

„ <i>laciniosa</i> , <i>Ornäsbjörk</i> , unga ex.	1,50
„ <i>pendula</i> , hängande	3 —

	Pr st. Rmt Rd. ö.	Pr st. Rmt Rd. ö.	
Bignonia; Trumpetblomster, (Bignoniaceæ)			
„ radicans (Tecoma) N. Amerika	1 —	Clematis Vitalba, Tyskland etc.	— 50
Utm. slingerv., täl vintern på fritt land i södra Sverige.		„ Viticella, Italien	— 50
Biota, se Thuja.		Länge och rikt blommande slingerväxter.	
Buxus; Buxbom, (Euphorbiaceæ) S. G.		Colutea; Blåsträd, (Papilionaceæ)	
„ sempervirens, den bästa infattningsväxt, pr 100 st, starka ex, 8 rdr — —		„ arborescens, S. & mell. Eur., Orienten — 25	
„ „ arborescens, 8 fot höga, pyramid		„ cruenta, S. & mell. Europa, Orienten — 30	
ex., planterade i baljor, B. Ö. 25 —		Corchorus; Keria; Ranunkelbuske, (Rosaceæ)	
„ „ 4 f. h, pyramidt i baljor, B. Ö. 10 —		„ japonicus, pr 12 st, 3 rdr	— 30
„ „ salicifolia, finbladig	— 25	„ fol. arg. var. med brokiga blad — 50	
„ „ fol. arg. var., unga plantor	1 —	Den förstn., som har dubbla, gula blmr passar till driftning om vintern. Den senare har enkla, gula blmr. Pl. i löjfjord.	
„ „ balearica, Balear. öärne, unga i kr, Ö. 1 —		Cornus; Hornbuske, (Cornex)	
Calycanthus; Kryddträd, (Calycantheæ)		„ alba (stolonifera), pr 12 st., 2 rdr — 20	
„ floridus, Carolina	1,50	„ „ fol. var. har ej alltid brokiga blad — 50	
„ præcox, Japan	1,50	„ alternifolia, N. Amerika	— 50
Utm. sig för sin starkt arom. luktande ved; äro i mell. Sverge ömtältiga för kölden.		„ circinata, N. Amerika	— 75
Caprifolium, (Caprifoliaceæ)		„ fastigiata (paniculata) N. Amerika . — 50	
„ brachypoda aurea reticulata, Japan, B. — 40		„ florida, N. Amerika	1 —
pr 12 st, 4 rdr		„ mas (mascula) Korneller, Europa	— 25
„ hortense (Lonicera capr.) S. Europa — 25		„ „ fol. arg. var. med brokiga blad	1,50
„ „ atropurpureum	1 —	„ striata, Norra Amerika	— 25
„ „ italicum rubrum	50	„ asperifolia	— 40
„ „ album	50	Coronilla; Koronill, (Papilionaceæ)	
„ „ pallidum.	75	„ Emerus, Öland & Gotland	— 50
Periclymenum, vanl, pr 12 st, 2 rdr — 20		„ glauca, Södra Europa, Ö.	— 50
proliferum, Europa	1 —	Vackra, men ömtältiga under vintern.	
semperfiriens (Brownii), S. Europa	1 —	Corylus; Hassel, (Amentaceæ)	
Den förstn. har små bladm. guldgulda ädror, är en prydlig ampelväxt och fört. till bek. af mindre espalier, flätverk o. d. Allesamman förrättfliga slingerväxter.		„ Avellana, vanlig, Europa & Asien . — 25	
Caragana; Årtträd, (Papilionaceæ)		„ fol. atropurpureis	1 —
„ arborescens (Robinia Carag.) Sibirien — 50		„ „ laciniatis	1 —
„ „ yngre, pr 12 st, rdr 2,50	25	„ andra sorter, se frukttr. & bärb., nötter.	
„ „ pendula	2,50	Cotoneaster; Oxbär, (Pomaceæ)	
Chamlagu, Norra Kina	1,50	affinis, Neapel	— 40
„ „ pendula	2 —	Crategus; Hagtorn, (Pomaceæ)	
„ pygmaea arenaria, Hemland?	75	„ aestivalis (elliptica) N. Amerika	— 75
„ „ pendula	2 —	„ coccinea, N. Amerika	— 50
Carpinus; Afeenbok, (Amentaceæ)		„ „ corallina	— 75
Betulus, vanl, Europa; 3 fot höga ex. — 30		„ „ pruinosa	— 75
pr 100 st, 25 rdr		„ Crus galli, N. Amerika	— 50
Cedrus; Ceder, (Abietineæ) S. G. Ö.		„ „ galli splendens	— 75
„ atlanticus (argent.) Hvitceder; Atlasceder, Afrika, pr 12 st, 10 rdr	1 —	„ glaudulosa, N. Amerika	— 75
„ Deodora (Abies; Pinus Deodora) Deodora- eller Himalayaceder, starka ex. 5 —		„ Layii (californica)	— 75
„ mycket större, starka ex. 10 à 20 —		„ macrantha	— 75
„ Libani (Pinus Cedrus) Libanonceder 1 —		„ monogyna, vanlig, Europa	— 25
„ mycket stora, i baljor 10 à 20 —		„ fol. var. med brokiga blad	— 75
Planteras i kraftig lsf- och grästorfjord.		„ „ pendula, hängande	1 —
Celastrus; Celaster, (Celastrineæ)		„ nigra, Ungern	— 75
scandens, slingrande, N. Amerika	1 —	„ oxyacanta, vanlig, Europa	— 25
Cephalotaxus, (Taxineæ) S. G. B.		„ fl. albo pl, hvit, dubbel	1 —
Fortunei, Japan, starka exemplar 6 —		„ „ rubro pl, röd, dubbel	1 —
Clematis; Skogsgrefva, (Ranunculaceæ)		„ „ simplex, röd, enkel	— 75
cirrhosa, Medleforskusten, B.	50	„ scarlet superb	1 —
Flammula, Södra Europa, B.	50	„ fol. var. med brokiga blad	— 75
Hendersonii (cylindrica) N. Amerika 1 —		„ „ pendula, hängande	2 —
lanuginosa, Kina, B.	2 —	„ punctata (Azarolus) N. Amerika	1 —
virginiana, N. Amerika	50	„ sanguinea, N. Asien	— 75
		„ tanacetifolia	— 75
Cryptomeria, (Cupressineæ) S. G. Ö.			
araucaroides, Japan			
elegans, Japan			
japonica, Japan	15, 10, 5 à 1,50		

Pr st. Rmt Rd. ö.

Cryptomeria japonica	Lobbii (viridis)	
starka exemplar		5 —
Vackra barrträd till dekorat. i växthus och på fritt land. Pl. i grästorfjord.		

Cupressus; Cypress, (Cupressineæ) S. G.

" Lawsoniana, N. Am., 4 à 5 f., praktf.	10 —
" 3 à 4 f. h., 5 rdr; mindre, starka pl.	1 —
" glauca, 3 à 5 fot, praktex. 10 à 5 —	
" unga, starka plantor	1 —

Cydonia; Qvitten, (Pomaceæ)

" japonica, Japan	— 75
" vulgaris, Södra Europa	— 25

Cytisus; Gulregn; Bönträd, (Papilionaceæ)

" alpinum, S. & mellersta Europa	— 25
pr 100 st, 18 rdr	

" austriacus, Österrike, Ryssland	— 40
" capitatus, Österrike, Italien m. fl.	— 25

" caucasicus, Kaukasus	— 40
" elongatus, S. & mellersta Europa	— 20

pr 100 st, 15 rdr	
" hirsutus, S. Europa	— 25

" Laburnum, S. Europa	— 25
" nigricans, S. & mellersta Europa	— 75

" purpureus, S. Europa	— 75
" sessilifolius, S. Europa	— 30

" supinus, Mellersta Europa, Sibirien	— 20
" uralensis, Ural	— 35

Daphne; Källarhalsbuske, (Thymelæe)

" Mezeureum, vanl., Mell. Eur., n. Asien	— 75
" crenata, Japan	— 50

Deutzia; Deutsia, (Philadelphæa)

" crenata, Japan	— 50
" fl. pl., utm. till drift. om vintern	1 —

" gracilis, Japan, pr 12 st, rdr 2,50 — 25	
" starka, utm. till drift. om vintern	1 —

" seabra, Japan, starka	— 50
pr 12 st, 10 rdr	

Diervilla, (Caprifoliaceæ)

" canadensis, Nordv. Amerika	— 20
pr 12 st, 2 rdr	

Elaeagnus; Silveverbuse, (Elaeagnæe)

" angustifol. (hortensis, arg.) S. Europa	— 50
" atropurpureus, N. Amerika	— 1 —

Evonymus; Benved; Spindelträd, (Rhamnæe)

" atropurpureus, N. Amerika	— 1 —
" europaeus, Europa	— 20

" fol. var. med brokiga blad	— 75
" nanus (angustif.). Kaukasus	— 50

Fagus; Bok, (Amentaceæ)

" sylvatica, vanl., 2 f. höga plantor	— 25
pr 12 st, rdr 2,50	

" atropurpurea, Blokbok	— 1,50
" pendula, hängande	— 3 —

Fraxinus; Ask, (Fraxinæ)

" americana (discolor) N. Amerika	— 50
" aculeafolia, vacker, gulfläckig	— 1 —

" coarita (varietet)	— 50
" excelsior, Europa, Asien, vanl.; 10 à	

12 fot h., alléerträd, pr 12 st, 5 rdr	— 50
" aurea, med gula grenar & blad	— 50

" argentea var. m. hvitbrokiga blad	— 75
" pendula, Hängash, pr 12 st, 20 rdr	— 2 —

" spectabilis	— 75
" heterophyllus, N. Amerika?	— 50

Pr st. Rmt Rd. ö.

Fraxinus Ornus, S. Europa.	— 75
" Ornus florifera	— 1 —

" sambucifolia, Virginia	— 50
" var. crispa, Kalask	— 1 —

Genista; Ginstabuse, (Papilionaceæ)	
" ætnensis, Italien	— 40

" ætnensis, Italien	— 40	
" anglica, England	Tyskland m. fl.	— 40

" florida, Spanien	— 40
" lusitanica, Portugal	— 40

" tinctoria, Europa	— 25
Ginkgo; Ginkgoträd, (Taxineæ)	

" biloba (Salisburia adiantif.) Japan	— 1 —
Gleditschia; Christustörne, (Leguminosæ-Cassiaceæ)	

" caspica, Trakt kring Kasp. havvet	— 1,50
" horrida, Kina	— 1,25

" triacanthos (latiſiliqua) N. Amerika	— 75
Glycine, (Papilionaceæ)	

" chinensis (Wistaria chinensis) Kina	— 1,50
Halimodendron; Saltbuske, (Papilionaceæ)	

" argenteum, Sibirien	— 1 —
Hedera; Murgröna, (Aralieæ)	

" colchica (Roegneriana) Kaukasus	— 1 —
" Helix, vanlig, Europa & Orienten	— 20

pr 12 st, 2 rdr	
" digitata	— 50

" " hybernica	— 75
" " macrophylla, storbladig	— 50

" rhomboidea fol. var. med brokiga blad	— 1 —
Hippophaë; Sandtörne; Hafstörne; Finn-bär, (Elaeagnæe)	

" rhamnoïdes, Europa	— 30
Hydrangea; Hortensia, (Saxifrageæ) B. Ö.	

" hortensis, Japan, pr 12 st, 5 rdr	— 50
" japonica, Japan, pr 12 st, 5 rdr	— 50

" fol. var. med hvitbl. pr 12 st, 5 rdr	— 50
" rosalba, ny vacker	— 1,25

" Otaksia, ny, prakfull	— 1,25
Kända, tacksamma växter för fritt land, växthus och boningsrum. Den sistn. blommar låttast och är vackrast i boningsrum. Pl. I Jönig., torf. & löjfjord.	

Hex; Jernek, (Ilicineæ) S. G. B.	
" aquifolium var. med brokiga blad, utmärkt vackra varietefer	— 10 à 2,50

" ferax fol. var.	— 2,50
Kunde under god betäckn. öfverv. ute.	

Jasminum; Jasmin, (Jasmineæ)	
" fruticans, S. Europa, Orienten, B. . . . — 25	

Juniperus; En, (Juniperineæ)	
" communis var. suesica, Sverige; vackra plantor af 1 à 2 fots höjd	— 1,50

" chinensis, Kina, starka ex.	— 5 —
" unga plantor	— 1 —

" Sabina, Sävenbon, S. Europa, starka	— 1 —
" squamata, Himalaya	— 1,50

" virginica; Virginiaceder; Blyertsträd,	
utmärkt vackra, 2 à 3 fot höga	— 1,50

" " mindre exemplar	— 75
Kalmia, (Rhodoraceæ) S. G. B.	

" angustifolia, N. Amerika	— 1,50
" latifolia, N. Amerika	— 1,50

	Pr st. Rmt Rd. ö.	Pr st. Rmt Rd. ö.
Fordra ljungjord, skydd, skugga och god beträckning om vintern.		Pinus Cembra, <i>Cembrafur</i> , Sib., S. Eur., 1 pr 12 st., 10 rdr.
Ligustrum; Liguster, (Oleaceæ)		" Cembra mindre ex., pr 12 st., 5 rdr — 50
ovalitolium, Japan, B. Ö.	— 50	" Halepensis, S. Europa, Syrien, Ö.
" vulgare, Europa	— 10	" inops, <i>New-Jerseyfur</i> , starka exemplar — 50
" fol. var.	— 50	" insignis, Kalifornien, Ö.
japonicum, Japan, B. Ö.	— 50	" Laricio, <i>Korsikansk fur</i> , <i>Strandfur</i>
Den sistn. har vackra hyta blmr. Kan odla uti kruka i ljungjord.		" Larix, <i>Lärkträd</i> , pr 100 st., 15 rdr — 20
Lonicera; Try, (Caprifoliaceæ)		" mindre, pr 100 st., 10 rdr
alpigena, mellersta Europa	— 50	" Pinea, <i>Italiensk Pinie</i> , S. Europa,
" altaica, Altai	— 50	mellersta Asien, Ö.
" ciliata, N. Amerika	— 75	" Pumilio, <i>Dvergfur</i> , Alperna
" coerulea, Europa	— 25	pr 12 st., 5 rdr.
Diervilla, N. Amer., pr 12 st., 2 rdr — 20		Strobos, <i>Weihmuthstall</i> , N. Amerika . — 25
discolor, Ostindien, B.	— 75	" sylvestris, <i>Vanlig nordisk fur</i>
iberica, Södra Ryssland	— 50	Se äfven krukväxter.
Ledebourii, Nya Kalifornien	— 50	Populus; Poppel, (Amentaceæ)
" orientalis, Mindre Asien	— 50	" alba (argentea vera) <i>Silfverpoppel</i> ,
" pyrenearia, Pyrenéerna, Sibirien	— 30	Mell. Europa; 6 à 8 fot höga ex.
tatarica, Rosentry, Tatar., Sibirien	— 35	" angulata, <i>Carolinapoppel</i> , unga ex.
" mindre exempl., pr 100 st., 15 rdr — 20		" balsamifera, <i>Balsampoppel</i> , N. Amer.
Xylosteum, Europa, pr 100 st., 15 rdr — 20		pr 100 st., 40 rdr.
Lycium; Backtörne, (Solanaceæ)		" viminalis (laurifolia)
europeum, Europa, pr 12 st., 2 rdr — 20		" betulæfolia, N. Amerika
Magnolia, (Magnoliaceæ) Ö.		" canadensis (monelliifera) <i>Kanadapoppel</i>
" grandiflora, Florida etc.	3 —	pr 100 st., 40 rdr.
" purpurea, Japan	3 —	" fol. aur. var., med gulfl. blad
" tripetala, Pensylvanien	2,50	" dilatata, <i>Pyramidpoppel</i> , S. Europa . — 50
Mahonia, (Berberideæ) S. G.		pr 100 st., 40 rdr.
" aquifolia, N. Amer., pr 12 st., rdr 2,50 — 25		" graeca, Grekland
" repens, N. V. Am., pr 12 st., rdr 2,50 — 25		" grandidentata, N. Amerika
Mespilus; Mispel, (Pomaceæ)		" nigra, <i>Svartpoppel</i> , Europa
" germanica, Europa, Orienten	2 —	" ontariensis, <i>Ontariopoppel</i> , N. Amer. — 50
Paonia; Pion, (Ranunculaceæ)		pr 100 st., 40 rdr.
" arborea, Mountpion, Kina, Japan;		" tremula pendula, <i>Hängpoppel</i>
utmärkta sortir, starka exemplar	3 —	2,50
Philadelphus; Schersmin, (Philadelphææ)		Potentilla; Fingerört, (Rosaceæ)
coronarius; S. Eur., Orienten, Japan — 25		" fruticosa, N. Europa
" fl. pl.	— 50	" floribunda, N. & mell. Europa
" nanus	— 25	Prunus; Plommon; Körnbär, (Amygdaleæ)
" floribundus, N. Amerika	— 40	" Avium fl. pl., dubbelblommig
Gordonianus, N. Amerika	— 40	" pendulum, hängande
" hirsutus (gracilis) N. Amerika	— 50	" chinensis fl. pl., Kina, Japan, Ö.
" speciosus, N. Amerika	— 50	" domestica fl. pl., Plommon, dubbl. bl.
Phillyrea; Stenlind, (Oleaceæ) S. G.		" Laurocerasus, S. Europa, S. G. Ö.
" angustifolia, S. Europa, Ö.	— 50	" Mahaleb, <i>Weihsel</i> , S. Europa
Picea; Tall, (Abietineæ)		" Padus, <i>Hägg</i> , Europa
balsamea, <i>Balsamtall</i> , N. Amerika;		" " aucubæfolia
starka, vackra exemplar	1 —	" triloba, Kina, dubbel, utmärkt
" una plantor	— 15	1 —
" cephalonica, Grekland; unga ex.	— 25	Ptelea; Låderträd, (Pteleaceæ)
Fraserii, Pensylvanien (lik balsamea)		" trifoliata, N. Amerika
starka plantor	1 —	25
" nobilis, Nord-Kalifornien, 1/2 fot h. 2,50		Pterocarya; Vingnöt, (Juglandideæ)
Nordmanniana, Kaukasus; vackra, 3		" caucasica, små exemplar
à 4 fot höga exemplar	5 —	25
" pectinata, <i>Silfvergran</i> , mell. Europa — 50		Pyrus; Äpple; Päron, (Pomaceæ)
Pichta, Sibirien, starka exemplar	1,50	" Amelanchior, <i>Bärnäispel</i> , pr 12 st., 2,50 — 25
Pinus; Fur, (Abietineæ) S. G.		" baccata, <i>Bäräpple</i> , Sibirien
austriaca, Österrike etc.; starka, om-		" communis fl. pl., Päron med dubbl. bl. — 75
skolade exempl., pr 12 st., 5 rdr	50	" floribundus, Japan
		" Malus fol. var.
		" nivalis, <i>Snöpäron</i> , Mell. Europa
		" prunifolia, Sibirien
		" fructo coccineo
		" " luteo
		75

	Pr st., Rmt Rd. öre.	Pr st., Rmt Rd. ö.	
Pyrus prunifolia fructo nigro	— 75	Salix Aglae, Hemland?	— 30
" prunifolia fructo transparent	— 75	" alba, Sverige	— 25
" pendula, hängande	2 —	" argentea, med silfverhvita blad	— 35
Quercus; Ek, (Amentaceæ)		" americana pendula (Napoleona; ba-	
" Banisterii, Norra Amerika	1 —	bylonica foem.)	— 50
" Prinos, N. Amerika	— 75	" pendula, yngre exemplar	— 25
" discolor	— 75	" amygdalina, Sverige	— 20
" Robur, vanlig	— 50	" discolor	— 25
" fastigiata, pyramidiformig	8 —	" speciosa	— 20
Retinospora, se krukväxter.		" asplenifolia, Hemland?	— 50
Rhamnus; Vägtörne, (Rhamnaceæ)		" aurea, pr 100 st., 15 rdr — 20	
" catharticus, Europa	— 20	Utmärkt till vidjor.	
" unga till häckar, pr 100 st., 5 rdr — 10		" bicolor, Sverige	— 20
" tinctorius, Österrike	— 35	Bradfordii (lik S. Americana pendula;	
Vichellia	— 40	trol. en varietet)	— 50
Rhododendron; Alpros, (Rhodoreæ) S. G.		" cæsia, Sverige, Tyskland m. fl.	— 25
" hybridum, Ö; prakfulla exemplar 10 à 3 —		" candida, Hemland?	— 20
" ponticum, Mindre Asien Ö	1,50	" Caprea, Vanlig Salg, Sverige	— 15
Alla Rhodod. utm. sig för praktif. blmr. Planteras i ljungjord.		" pendula, hängande	3 —
Rhus; Sumak; Peruvträd, (Terebinthaceæ)		" coniferae, Hemland?	— 25
" glabra, Norra Amerika	— 75	" cuspidata, Tyskland	— 25
" elegans	— 75	" daphnoidea, Sverige	— 25
" radicans, N. Amer., pr 12 st. rdr 2,50 — 25		" jaspidea	— 25
Ribes; Vinbär; Krusbär, (Ribesiaceæ)		Vacker, snabbväxande sort.	
" acerifolium	— 25	" dasycyclas, Schles., pr 12 st., rdr 2,50 — 25	
" alpinum, Europa, Sibirien	— 15	Utm. vacker; lemnar långa, starka vid- jor; kan anses som en af de aldra bästa korgpilarterna.	
pr 12 st., rdr 1,50.		" fragilis, Sverige	— 20
" laciniatum	— 50	" grandifolia, Sverige	— 25
" atropurpureum (petreum) Mongoliet — 50		" hastata, Alperna m. fl. fjell	— 15
" aureum, N. Amer., pr 12 st., 2 rdr — 20		" holocericea, Sverige	— 20
" caucasicum (Bieberst.; ciliatum) Kauk. — 25		" lanceolata, Sverige	— 20
" floridum (amer.; glandul.) N. Amer. — 25		" laurina, England	— 25
" Gordonianum (Beatonii)	— 25	Utm. vacker i buskpartier och anläggan.	
" multiflorum (spicatum; vitifol.) Kroat. — 25		" lucida, (pentandra latifolia)	— 20
" nigrum fol. var. med brokiga blad — 30		En vacker sort med stora, glänsande, mörk- gröna blad; särdeles anv. i anläggningar.	
" acenitifolium	— 25	" mollissima, Sverige, Tyskland m. fl. — 20	
" sanguineum, N. Amerika	— 35	" nigricans, Sverige	— 20
" fl. pl. dubbelblommande	1 —	" borealis	— 20
" tennifolium, N. Amerika	— 25	" prunifolia	— 20
Robinia; Falsh Akasia, (Papilionaceæ)		" phyllacifolia, Eur. fjell & alper	— 20
" hispida, Florida; Carolina	2 —	Pontedereana, S. Tyskland	— 20
" Pseudoacacia, N. Amerika	— 50	" purpurascens, Hemland?	— 20
" Bessoniana	2 —	" purpurea, Sverige, Tyskl. m. fl.	— 15
" inermis, Klotsakasia	2,50	" var.	— 25
" viscosa, Florida	1,50	Uppdragen i högstamn. form. lemnar den- na art vackra hängträd.	
Rosa; Törnros, (Rosaceæ)		" rosmarinifolia, Sverige	— 20
" cinnamomea majalis, Bukettros	— 25	Lågv. ibladig, fördelaktig till anläggan.	
pr 12 st., rdr 2,50.		" rubra, Tyskland	— 25
" lutea, S. Europa, gul, enkel	— 50	" Russelliana, England?	— 25
" Manetii	— 50	" salviæfolia, Schweiz	— 25
" canina, mollissima och andra, till nä- stan ogenomträngliga häckar passande sorter, pr 12 st., rdr 2,50 — 25		" stipularis (viminalis stip.) Sverige.	— 20
Rubus; Hallon, (Rosaceæ)		" viminalis, Körpil, pr 100 st., 10 rdr — 15	
" odoratus, N. Amerika	— 15	" viridis, Sverige	— 25
" spectabilis, N. Amerika	— 25	Uppnär betydlig höjd & storlek.	
Salix; Pil; Vide; Salg, (Salicineæ)		" vitellina, se Salix aurea.	
" acutifolia (easpica; pruinosa) Sv. m. fl. — 20		Då valet af sorterna anförtros oss, lemnas af dessa och andra pilsorter, i äldre och yngre exemplar:	
En pydlig art m. hängande grenar; Kan användas som täpli.		50 sorter Salix m. namn, 7 rdr.	
" acuminata, Tyskland	— 20	25 & 12 i samma prisförhållande.	
" fol. var. med brokiga blad	— 50	11	

- Pr st., Rmt Rd ö.
 100 st. i 15 à 20 olika sorter, 8 rdr.
 100 st. sättqvistar, vanliga sorter, 1 rdr.
 100 " sällsyntare arter, 2 rdr.
- Sambucus;** *Hall; Fläder, (Caprifoliaceæ)*
 " canadensis, N. Amerika 50
 " nigra, vanlig, Europa, Orienten 20
 " fol. arg. var. 30
 " " aureis var. 30
 " fl. pl., dubbellovmande 40
 " pulverolenta 40
 " linearis 75
 " laciniata, *Persljefläder* 25
 " racemosus, *Drußfläder, Mell. Europa* — 20
- Solanum;** *Trollbär, (Solanaceæ)*
 " Dulcamara, *Qvesed, Sverige* 15
- Sophora;** *(Papilionaceæ)*
 " japonica, unga exemplar 1 —
- Sorbus;** *Rönn; Oxel, (Pomaceæ)*
 " Acpuria, *Vanlig Rönn, Sverige* 50
 " pendula, hängande. 1,50 à 3 —
 " edulis, *Frankrike* 50
- Spiraea;** *Brudspira, (Rosaceæ)*
 " acutifolia (hypericifolia) Sibirien 50
 " alpina, Asien 25
 " Billardii (Bastard) 25
 " callosa (japon; Fortuncii) Japan 20
 " cana (nana) Kroatien 25
 " chamadrifolia (incisa) Sibirien 20
 " Douglasii (tomentosa) N. Amerika 25
 " eximea, (Bastard) 75
 " Foxii (Bastard?) 75
 " Hookerii, Himalaya 40
 " hypericifolia, N. Amerika 30
 " media, Böhmen 50
 " Nobleana (Bastard) 35
 " opulifolia, Kanada 25
 " prunifolia, Japan 50
 " fl. pl., dubbellovmande 1 —
 " salicifolia, Europa, N. Asien 10
 " sorbifolia, Sibirien 25
 " dahurica 40
 " thalicroides (aquilegifol; hypericif.) 50
- Staphylea;** *Pimpnört, (Sapindaceæ)*
 " pinnata, S. Europa 50
- Symporia;** *Snöbär, (Caprifoliaceæ)*
 " racemosa, vanlig, pr 100 st., 10 rdr — 15
 " vulgaris 25
 " fol. aureis marginatis 1 —
- Syringa;** *Syrén, (Oleaceæ)*
 " chinensis (Bastard) buskformig 60
 " stamformiga exemplar 1,50
 " Emodi, Himalaya 1 —
 " Josikæa, Ungern, Siebenburgen 50
 " persica, Persien 60
 " vulgaris, vanlig, buskformiga 25
 " alba, buskformiga 25
 " stamformiga 1,25
- Taxodium;** *(Taxineæ) S. G. Ö.*
 " sempervirens, Mexiko, 10, 5, 2 rdr à — 50
- Taxus;** *Idegran, (Taxineæ) S. G.*
 " baccata, Europa 75
 " pyramidalis, vackra, i baljor 10 —
- Pr st., Rmt Rd ö.
 Taxus baccata pyramidalis, 2 fot höga 2,50
 " baccata fastigiata, 4 à 5 fot höga 5 à 6 —
- Thuja;** *Lifsträd, (Cupressineæ) S. G. Ö.*
 " gigantea, Columbiens, B. 6 à 7 f.h., 15 à 20 —
 " praktfulla, mindre exemplar, B. 2,50
 " Lobbii, Kalifornien, B. 50 öre à 1,50
 " occidentalis, starka exemplar 1 à 2,50
 " mindre plantor, pr 12 st., 2 rdr. — 20
 " pyramidalis 1 —
 " intermedia 1 —
 " Orientalis, Kina, Japan, starka 75
 " aurea, små exemplar 50
 " " starka praktexemplar 10 à 15 —
 " " elegantissima 5 —
 " expansa, praktexemplar 10 —
 " nepalensis 1 —
 " tatarica 1 —
 " plicata, N. Amerika 1 —
 " tatarica, Mell. Asien 1 —
 " Warreana, utmärkt sköna exemplar 3 —
- Thujopsis;** *(Cupressineæ) S. G.*
 borealis, N. Amer., mindre exemplar 1 —
 " starka, yfviga praktex., 2, 5 à 10 —
 Tillhör, likasom Cupressus Lawsonii, de vackraste barrv. för fritt land. Den har hästädes odlats under löppet af fl. år och ännu aldrig lidit af vintern. Våra exemplar är uppdragna på fritt land och, likasom alla här odlade Coniferæ, försedda med stora rotknippen, så att de kunna oplant. snart sagt hvilken årtid som helst.
- Tilia;** *Lind, (Tiliaceæ)*
 alba argentea, starka 2,50
 " americana, N. Amer., starka 1,50
 " corallina (Bastard) 1,50
 " grandifolia (europ. var.) Europa; starka, utmärkta exemplar 3 —
 " asplenifolia, egendomlig 1 —
 " parvifolia, Europa, vanlig, 2,50 à 3 —
 buskformiga 50
- Ulmus;** *Alm, (Ulmaceæ)*
 alata, Virginie 1 —
 " campestris, Europa 50
 " betulæfolia 1 —
 " torrulosa 1 —
 " purpurea, m. bruna blad 1 —
 " globosa, England 75
 " microphylla, småbladig 75
 " montana, Europa, starka alléträd, 1 —
 pr 100 st., 85 rdr
 " 5 à 7 fot h., pr 100 st., 45 rdr — 50
 " buskformiga, pr 100 st., 35 rdr — 40
 " adiantifolia 50
 " crispa 75
 " Dampieri, pyramidiform, vackra 1 —
 " exoniensis, *Pyramidalin*, vanlig 75
 pr 12 st., rdr 7,50
 " fol. arg. var. med brokiga blad — 75
 " superba 75
 " horizontalis 1 —
 " pendula, *Hängalm* 2 —
 " pumila, Mell. Europa, vackra 1,50
 " suberosa, *Korkalm*, Europa 75
 " pyramidalis 1 —

	Pr st., Rmt Rd. ö.	Pr st., Rmt Rd. ö.
Ulmus suberosa pendula, hängande . . .	1,50	Weigelia rosea, Kina, Japan
Viburnum; Snöboll, (Caprifoliaceæ)		flera andra sorter 75 öre à 1 —
" Lantana, Mell. & s. Europa	25	Wellingtonia; Mammouiträd, (Cupres-
" fol. var. med brokiga blad	1 —	sineæ)
" lantanoides, N. Amerika	30	" gigantea, Kalifornien, 3 à 4 f. höga 10 —
" Opulus sterile (roseum)	50	" mindre exemplar 2, 3 à 5 —
" högstammiga exemplar	2 —	Härst. uppdragna på fritt land och för- sedda med goda rotklippar.
Vitis; vindruva, (Vitiferæ)		Då urvalet af sorterna oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:
" Alexandrina	1 —	100 st. Träd & buskar i 100 sort. m. namn, 50 rdr
" Labrusca, Kanada	1 —	100 " Träd & buskar i 50 sort. m. namn, 25 "
Weigelia, (Caprifoliaceæ)		100 " Träd & buskar i rummel 20 "
" amabilis, Japan	50	

III. Buskar till häckar och bersåer:

	Pr 100 st., Rmt Rd. ö.	Pr 100 st., Rmt Rd. ö.
Alm, buskformiga till bersåer	35 —	Rosor; Rosa pimpinellifolia pl. 25 —
Baktörne; Lycium barbatum	10 —	" Rosa canina, mollissima och andra till nästan ogenomträngliga häckar pas- sande sorter, . . . pr 12 st., rdr 2,50 25 —
Buxbom; Buxus sempervirens, starka . . .	8 —	Snöbär; Symphoria racemosa 10 —
Gran; Abies excelsa, flera gånger omplan- terade exemplar	45 —	Surtörne; Berberis vulgaris, 3-åriga . . . 3 —
Hagtorn, 2-årig, pr 1000 st., 16 rdr 2 —		Syrene; Syringa vulgaris, blå & hvita . . . 8 —
" 3-årig, pr 1000 st., 22 rdr 2,75		" blå & hvita, starkare exemplar 20 —
Liguster, 2-årig, pr 1000 st., 25 rdr 3 —		Try; Lonicera tatarica & Xylosteum . . . 15 —
" 3-årig, pr 1000 st., 35 rdr 4 —		Vägtörne; Rhamnus catharticus. 5 —
Lind; Tilia parvifol. , pr 12 st., 5 rdr 40 —		Ärträd; Caragana arborescens 18 —
Lifsträd; Thuya occidentalis, 4-årig 10 —		
Lönn; Acer Pseudopl. , pr 12 st., 5 rdr 40 —		

IV. Törnrosor för fritt land:

(Rosaceæ.)

Vår samling af törnrosor för fritt land består af över 500 olika sorter och torde således vara en af de mest rikhaltiga inom vårt land.

	Pr st., Rmt Rd. ö.	Pr st., Rmt Rd. ö.
Rosa alba, Hvita Rosor; flera olika sor- ter med namn, 75 öre 1 à 1,25		Rosa hybrida remontant stamformiga, många olika sorter m. namn, 2 —
" bengalensis florida, slingrande 1,75		pr 12 st., 20 rdr.
" bourbonica hermosa, pr 12 st., 6 rdr — 60		" lutea, Gula Rosor, olika sorter med
pr 100 st., 20 rdr		namn, 75 öre, 1 rdr à 1,75
En vacker rikblommig sort; utm. såvälv till drifning, som till pl. på grupper.		" enkla gula, . . . pr 12 st., 5 rdr — 50
" Boursali elegans, slingrande 1 —		" Manettii, pr 12 st., 5 rdr — 50
" rubra, slingrande 1 —		" muscosa, Mossrosor, flera olika sorter med namn, 1, 2 à 2,50
" canina, mollissima, m. fl. till häckar — 25		" pimpinellifolia, . . . pr 12 st., 3 rdr — 30
pr 12 st., rdr 2,50		pr 100 st., 25 rdr
" capreolata alba, slingrande 1 —		" rubifolia belle Baltimore, slingrande 1,25
" " carnea, slingrande 1 —		" belle of the prairies, slingrande. 1,25
" pendula, Hängros 4 —		" semperflorens, . . pr 12 st., 5 rdr — 50
" rubra, slingrande 1 —		" Thea, Törnor, många olika sorter. 1,25
" centifolia, flera sorter med namn 50		Då urvalet anförtros oss, lemnas
" cinnamomea majalis, Buketros 25		100 st. Frilandsrosor, olika m. namn, 50 rdr.
pr 12 st., rdr 2,50		25 " olika sorter med namn 13 "
" damascena, flera sorter med namn 75		12 " " sorter med namn 7 "
" gallica (provincialis) med namn 50		100 " " " utan namn i rummel 15 "
" hybrida, många sorter med namn 75		50 " " " utan namn, i rummel 8 "
" remontant, många sorter m. namn 1 —		25 " " " namn, i rummel 5 "
pr 50 st. i 50 sorter, 45 rdr		12 " " " " i rummel . . . 3 "

V. Fröplantor till Ettåriga Blomsterväxter:

Dessa plantor expedieras blott om våren. Behandling m. m., se Fröföreteckningen, pag. 16 till 50.

Pr 100 st., Rmt Rd. ö.	Pr 100 st., Rmt Rd. ö.
Acroclinium roseum, röd & hvit	Mathiola annua, Sommarlökföjor
pr 25 st., 25 öre.	pr 25 st., 60 öre.
Amaranthus bicolor fol. purpureis	" incana, Vinterlökföjor, pr 25 st., 60 öre. 2 —
pr 25 st., 60 öre.	Mimulus , fl. sort. i krukor, pr 12 st., 2 rdr 16 —
Antirrhinum majus, <i>Lejongap</i>	Mirabilis , fl. sort. i kr., pr 12 st., 50 ö. 4 —
pr 25 st., 60 öre.	Perilla nankinensis, med bruna blad, i krukor, pr 12 st., rdr 1,50 12 —
" majus nanissimum, dvergformiga	Petunia , flera sorter, pr 25 st., 60 öre 2 —
pr 25 st., 70 öre.	Phlox Drummondii, flera sorter
Artemisia annua, i krukor, till bladgr. 16 —	pr 25 st., 60 öre.
pr 12 st., 2 rdr.	Pyrethrum parthenifol. aur., utmärkt till infatning, . . pr 25 st., 80 öre. 3 —
" gracilis, i krukor, pr 12 st., 2 rdr 16 —	Ricinus , Underträd, flera sorter i kruk. 24 —
Aster , olika sorter, pr 25 st., 50 öre 1,75	pr 12 st., 3 rdr.
Brachycome iberidifolia, pr 25 st., 30 ö. 1 —	Salpiglossis , fl. sorter, pr 25 st., 80 ö. 3 —
Cacalia (Emilia) sonchifolia.	Sanvitalia procumbens fl. pl., lågväxt 1 —
pr 25 st., 25 öre.	pr 25 st., 30 öre.
Cheiranthus Cheiri, <i>Gyllenlack</i>	Scabiosa atropurpurea, pr 25 st., 25 ö. — 75
pr 25 st., 60 öre.	Senecio elegans, i fl. färg., pr 25 st., 30 ö. 1 —
Större exemplar, se krukväxter.	Solanum , flera sorter till bladgrupper, i kruk, pr 12 st., 3 rdr 24 —
Celosia cristata. <i>Tuppam</i> , i krukor	Tagetes , i flera färger, pr 25 st., 25 öre — 75
pr 12 st., 2 rdr.	Tropaeolum Lobbianum, flera sorter i krukor, pr 12 st., 3 rdr 24 —
Chrysanthemum carinatum, olika.	Viola tricolor maxima, pr 25 st., 60 öre 2 —
pr 25 st., 30 öre.	Zinnia elegans, . . pr 25 st., 60 öre 2 —
Clarkia , flera sorter, pr 25 st., 30 öre. 1 —	" elegans fl. pl., . . pr 25 st., 70 öre 2,50
Coreopsis , flera sorter, pr 25 st., 30 öre 1 —	Zeja , Majs i krukor, till bladgrupper . 16 —
Dianthus chinensis, flera sorter	pr 12 st., 2 rdr.
pr 25 st., 30 öre.	" " fol. var., i kruk., pr 12 st., 2 rdr 16 —
Helichrysum , flera sorter, pr 25 st., 25 ö. — 75	
Impatiens Balsamina, i krukor	
pr 12 st., 2 rdr.	
Lobelia Erinus, flera sorter i krukor 16 —	
pr 12 st., 2 rdr.	

VI. Två- och fleråriga Blomsterväxter:

Till grupper, rabatter och infatningar. Behandling m. m., se Fröföreteckningen, pag. 50 till 62.

Pr st., Rmt Rd. ö.	Pr st., Rmt Rd. ö.
Achillea ; <i>Rölleka</i> , (Senecionideæ)	En hos oss allm. förekommande, vild växt, som för sina vackert bildade blad förtje- nar att användas till infatningar.
" filipendula (tanacetif.) $2\frac{1}{2}$ à 3 f. h., gul — 30	Allium ; <i>Lök</i> , (Asphodelæ)
" Millefolium fl. roseo, $1\frac{1}{2}$ f. h., rosemr. — 20	" Moly, 1 fot hög, gul, pr 12 st., 50 öre — —
" nobilis, $1\frac{1}{2}$ fot hög, hvit 35	" Victoriaalis, <i>Ornölk</i> , 1 f. hög, hvitaktig — 30
Aconitum ; <i>Stormhatt</i> ; <i>Blåskor</i> ; <i>Junfru</i> <i>Mariae</i> sho, (Ranunculaceæ)	Alstroemeria se krukväxter.
flera sorter — 25	Althaea ; <i>Stockros</i> , (Malvaceæ)
Actaea ; <i>Paddbär</i> ; <i>Christoffersört</i> , (Ra- nunculaceæ)	" rosea, förbättrade, s. k. <i>Skottiska Malver</i> :
racemos, 4 à 6 fot hög, hvit 50	100 st. i 12 olika, särsk. färger rdr 20 — — —
Adonis ; <i>Gossen i det gröna</i> , (Ranunculaceæ)	50 " i 12 " särskilda färger " 12 — — —
vernalis, 1 fot hög, guldgul 30	12 " i 12 " färger 3,50 — 35
Ajuga ; <i>Käringkruka</i> , (Labiataeæ)	100 " alla färgerna blandade 15 — — —
repans, pr 100 st., 4 rdr —	25 " färgerna blandade 4,50 — — —
Lågväxt, krypande infatningsv. m. blå blmr. Bör kanthugas hyarje är, att den ej för mycket utbreder sig.	12 " blandade 2,75 — 25
Alchemilla ; <i>Daggkåpa</i> , (Rosaceæ)	Dessa utmärkta praktväxter fördra en 16s, närande, djupt bearbetad jordmän; se äf- ven rubr. modebilr i fröföreteckningen.
" vulgaris, pr 100 st., 2 rdr; 12 st., 25 ö. — —	Alyssum ; <i>Stenört</i> ; <i>Grådådra</i> , (Cruciferæ)
	" Wierzbeckii, 1 à $1\frac{1}{2}$ fot hög, gul — 35

	Pr st., Rmt Rd. ö.	Pr st., Rmt Rd. ö.
Amsonia; (Apocynæ)		
„ salicifolia, 1½ fot hög, blå	— 40	
Anemone; Sippa; Anemon, (Ranunculaceæ)		
„ alba, 1 f. h., hvit storbl., pr 12 st., 2 rdr — 25		
„ albana (Pulsatilla)	— 45	
„ coronaria, dubbla i flera färger		
pr 100 st., 5 rdr; 12 st., 65 öre.		
„ enkla i flera färger		
pr 100 st., 4 rdr; 12 st., 50 öre.		
„ dubb. m. namn, pr 12 st., 1 rdr — 10		
„ japonica, (Atragene) fl. roseo	1 —	
„ Honorige Jobert, hvit	1,25	
„ rosea	1 —	
„ multifida, 1 fot hög, rödaktig	— 40	
„ nemorosa, pr 100 st., 1 rdr —		
„ sylvestris, 1 fot hög, hvit	— 50	
Vackra växter; A. jap. m. variet. hafva ganska stora hvita eller ljusröda blm. och kunna öfverv. i oeldadt boningsrrm; på vissa ställen, under god betäckning, äfven på fritt land.		
Anericum; Sandlilja, (Asphodelaceæ)		
„ Liliago, 1 à 2 fot hög, hvit	— 40	
„ ramosum, 1 à 2 fot hög, hvit	— 40	
Antirrhinum; se föreg. rubrik: frö- plantor till ettåriga blomsterväxter.		
Aquilegia; Åkeleja, (Ranunculaceæ)		
„ många olika sorter med dubbla och enkla blommor, pr 12 st., rdr 2,50 — 25		
„ Verveneana, med brokiga blad	— 40	
Aralia; Bergangelika, (Araliacæ)		
„ racemosa, vacker bladväxt	— 50	
Aristolochia; Pipblomster, Aristolochieæ)		
„ Clematis.	— 20	
En sällsynt, svensk växt med vackra blad, men oansenliga blommor.		
Armeria; Gräsneglika; Sandneglika, (Plumbaginæ)		
„ maritima, Engelskt gräs, låg med ljusröda blommor	— 15	
„ pinifolia, 1 fot hög, ljusröd	— 25	
„ plantaginea	— 35	
Arundo, se krukväxter.		
Asarum; Hasselört, (Asaroïdeæ)		
„ europeum	— 40	
En sällsynt, svensk växt; användbar till bredare infattningar.		
Asclepias; Svalrot, (Asclepiadæ)		
„ syriaca, 4 à 5 fot hög, ljusröd.	— 25	
Astrantia; Stjernfloka, (Umbelliferæ)		
„ major, 1½ à 2 fot hög, rödlett	— 35	
Aubrieta; (Cruciferæ)		
„ græca, lågväxt, violet	— 30	
Baptisia; (Papilionaceæ)		
„ australis, 2 à 3 fot hög, blå	— 50	
„ exaltata, 2 à 3 fot hög, blå.	— 50	
Bellis; Tusensköna, (Asteroïdeæ)		
„ perennis, pr 100 st., 5 rdr; 12 st., 75 ö. —		
Bryonia; Hundrofva, (Cucurbitaceæ)		
„ alba, känd slingerv., pr 12 st., 5 rdr — 50		
Caltha; Kabbalik; Käffla, (Ranunculaceæ)		
„ palustris fl. pl., 1 fot hög, gul.	1 —	
Calystegia; Björnrefva, (Convolvulaceæ)		
„ pubescens, pr 12 st., 50 öre —		
Calystegia sepium, . . . pr 12 st., 50 öre —		
Rankväxter med vackra blm. som dock lätt kunna urarta till besvärliga ogräs.		
Campanula; Klockblomster, (Campa- nulaceæ)		
„ alliariifolia (lamifol.) 1 à 2 f. h., hvit — 50		
„ carpatica, 1 f. h., blå, pr 12 st. 1 rdr — 10		
Vacker till infattningar.		
„ fl. alba, 1 fot hög, hvit	— 20	
„ gummifera, 1 fot hög, blå	— 35	
„ lactiflora, 3 à 4 fot hög, blåhvit.	— 45	
„ latifolia, 3 à 4 fot hög, blå	— 30	
„ Medium, 3 fot hög, blå eller hvit — 10		
pr 12 st., 1 rdr.		
„ fl. pl., dubbel, pr 12 st., rdr 1,50 — 15		
„ nitida, 2 fot hög, blå vacker	— 25	
„ persicifolia, 1½ fot hög, blå	— 20	
„ fl. pl., dubbel	— 50	
„ rhomboidea, låg, blå	— 25	
„ soldanelliflora pl., dubbel.	— 50	
„ rotundifolia, 1 fot hög, blå	— 20	
Cedronella; Cedronell, (Labiateæ)		
cana, 1 fot hög, röd	— 50	
Cerastium; Ceras, (Caryophyllæ)		
„ Biebersteinii, pr 100 st., 6 rdr;		
pr 12 st., 80 öre —		
„ tomentosum, pr 100 st., 6 rdr;		
pr 12 st., 80 öre —		
Låga, aldeles hvita, vackra växter till infatt. och ornamentala anordningar på finare gräsmattor.		
Chelone; Sköldblomster, (Scrophulariaceæ)		
„ barbata, 4 fot hög, röd.	— 40	
Clematis, se Träd och buskar till alléer, park- och trädgårdsanläggningar.		
Colchicum; Tidlösja, Nakna Jungfrun, (Melanthiaceæ)		
„ autumnale, violett	— 30	
„ fl. albo, hvit	— 15	
„ purpurea pl., dubbel, röd.	— 15	
„ variegata, varierande	— 30	
Convallaria; Liljekonvalje, (Smilacineæ)		
„ majalis, vanlig, pr 100 st., rdr 3,50;		
pr 12 st., 50 öre —		
„ fl. roseo, rödaktiga blommor	— 50	
„ Polygonatum	— 25	
Crocus; Saffranblomster, (Iridæ)		
„ i rummel, . . pr 100 st., rdr 1,50.		
pr 12 st., 25 öre —		
„ sativus, pr 100 st., 3 rdr; 12 st., 50 öre —		
Expedieras blott om hösten.		
Crucianella; Korsblad, (Rubiaceæ)		
„ stylosa, låg, röd	— 25	
Cyclamen, se krukväxter.		
Cynoglossum; Hundunga, (Boragineæ)		
„ coeruleum, 1 à 2 fot hög, blå	— 40	
„ glochidiatum, 2 à 3 fot, blå.	— 40	
Dahlia, se Gorgina.		
Delphinium; Riddarsporre, (Ranunculaceæ)		
„ chinense, 1 fot hög, blå eller hvit. — 25		
„ formosum, 2 à 3 fot, blå, praktfull — 25		
pr 12 st., rdr 2,50.		
„ album coeruleum	— 50	

Pr st., Rmt Rd. ö.	Pr st., Rmt Rd. ö.
Delphinium flera andra, högwäxta sorter — 25	Funkia lancifolia fol. marg., m. brok. blad — 50
Desmodium; <i>Ejeterskida</i> , (<i>Hedysareæ</i>)	" ovata — 50
" canadense, 2 à 3 fot hög, röd — 40	" fol. var., med brokiga blad 1 —
Dianthus; <i>Neglika</i> , (<i>Carophylleaæ</i>)	" subcordata — 50
" atrorubens, 1 à 2 fot hög, mörkröd — 40	" undulata — 50
" barbatus, <i>Borstneglika</i> , pr 12 st. rdr 1,50 — 15	" fol. eleg. var., med vackra blad — 75
" <i>Caryophyllus</i> , starka blombarna plantor efter 1:ma sort frö, pr 100 st. 8 rdr; 50 st., 4,50; 25 st., 2,50; 12 st., 1,50 — 15	Präktiga rabattv. m. vackra blad och prydl. blmr. Fordra tunn betäckning mot mycket stark köld.
" dentosus, 1 fot hög, ljusröd — 50	Ganthus; <i>Snödroppe</i> , (<i>Liliaceæ</i>)
" deltoideus, <i>Ängsneglika</i> , till infattn. — 20	" nivalis, dubbla, pr 100 st., 5 rdr: pr 12 st., 70 öre —
" plumarius, <i>Ijäderneglika</i> — 15	" enkla, pr 100 st., rdr 2,50; pr 12 st., 40 öre —
pr 12 st., rdr 1,50.	Expedieras endast från September till och med November.
Diclytra; <i>Blomsterlyra</i> , (<i>Fumariaceæ</i>)	Galega. (<i>Leguminosæ</i>)
" spectabilis, pr 12 st., 4 rdr — 40	" officinalis, 3 à 5 fot h., blå eller hvit — 25
Digitalis; <i>Fingerborgsblomster</i> , <i>Scrophu-</i> <i>lariaceæ</i>)	" orientalis, 2 à 4 fot hög, blå — 35
" aurea, 2 à 3 fot hög, gul — 35	" persica, 2 à 3 fot hög, hvit — 35
" Buxbaumii, 5 à 6 fot hög, gulvit — 50	Gentiana; <i>Höstklocka</i> , (<i>Gentianææ</i>)
" ferruginea, 4 à 5 fot hög, gulaktig — 40	" Pseumonanthe, 8 à 12 tun hög, blå — 50
" purpurea, 2 à 4 fot, pr 12 st., 2 rdr — 20	Georgina; <i>Georgin</i> ; <i>Dahlia</i> , (<i>Asteroideæ</i>)
" gloxiniaeflora, pr 12 st., rdr 2,50 — 25	200 vackra sorter med namn, rdr 70 — —
Dodecatheon; <i>Gudsgräv</i> ; <i>Gudsblomster</i> , (<i>Primulaceæ</i>)	100 " sorter med namn 36 — —
" Meadia, 1 fot hög, hvit eller röd — 50	25 " med namn 9,50 — —
" integrifolia, 1 fot hög, röd — 50	12 " namn 5 — —
Doronicum; <i>Gemsrot</i> , (<i>Senecionideæ</i>)	100 " utan namn, i rummel 18 — —
" caucasicum, 1 à 1½ fot hög, gul — 20	25 " namn, i rummel 5 — —
" pardalanches, 2 à 3 fot hög, gul — 20	12 " , i rummel 2,50 — 25
" plantagineum, 1½ fot hög, gul — 20	200 sticklingpl. med namn 40 — —
Dracocephalum; <i>Drakhufvud</i> , (<i>Labiateæ</i>)	100 " vackra sorter m. namn 22 — —
" argunense, blå — 25	25 " sorter med namn 5,75 — —
" altaicense, blå — 25	12 " med namn 3 — — 30
Epilobium; <i>Mjölke</i> , (<i>Onagrarieæ</i>)	Sticklingplantorna expedieras i Maj.
" angustifolium, 3 à 4 fot hög, röd — 15	Geranium; <i>Storknäbb</i> , (<i>Geraniacææ</i>)
" hirsutum, 3 à 4 fot hög, röd — 15	" macrorrhizone, 1 fot hög, röd — 40
Svenska växter m. vackra blmr. Kunna lätt urarta till besv. ogräs, om man ej af- skär fröstänglarna innan fröet hunnit mög- na, eller om man försummar att utrotta alla överflödiga plantor.	" pratense, 1 à 2 fot hög, blå — 25
Epimedium; (<i>Berberideæ</i>)	Geum , se krukväxter.
" alpinum, 1 fot hög — 50	Gladiolus; (<i>Iridææ</i>)
" chrysanthum, ½ fot hög — 50	" blandus pr 12 st., 3 rdr — 30
" macranthum, ½ fot hög — 50	" Brenchleyensis pr 12 st., rdr 1,50 — 15
Erythronium; <i>Hundtand</i> , (<i>Liliaceæ</i>)	" cardinalis pr 12 st., rdr 3,50 — 35
" dens canis, vacker, tål vintern — 25	" Collvillii pr 12 st., 3 rdr — 30
Fritillaria; (<i>Liliaceæ</i>)	" communis pr 12 st., 50 öre — —
" imperialis Aurora, röd — 45	" byzantinus pr 12 st., 1 rdr — 10
" fl. pl., dubbelt, röd 1,50	" floribundus pr 12 st., rdr 2,50 — 25
" enkel, röd — 40	" gandavensis pr 12 st., rdr 2,50 — 25
" enkel, gul — 80	" med namn pr 12 st., 4 rdr — 40
" Krone auf Krone — 45	" psittacinus pr 12 st., rdr 2,50 — 25
" Meleagris. <i>Damspelsblomster</i> — 35	Dessa växter tillhörta trädgårdens förr. prydndssblmr. Pl. i April uti krukor i god, sandbl. löjfjord och ställas sedan i ljum (ej varm) driftbänk samt luftas och vattn. rikl. Utpl. i slutet af Maj eller början af Juni på fritt land i fet, lucker, men ej nygödslad jord. Lökarne uppt. om hösten och öfverv. torra. Expedieras till här anf. priser blotti från Okt. till April; under den öf. tiden exp. de i krukor och ärö dyrare.
Funkia (<i>Liliaceæ</i>)	Globularia; <i>Bergskrabba</i> , (<i>Globularieæ</i>)
" cueculata — 75	" trichosantha, vacker — 50
" alba marg., med hvitrandiga blad 1 —	Gymnerium, se krukväxter.
" viridi-maculata 1,50	Gypsophila; <i>Gipsblomster</i> , (<i>Caryophylleaæ</i>)
" grandiflora 1 —	" paniculata, 3 à 4 fot hög, hvit — 40
" fol. var., med brokiga blad 1,50	
" lancifolia — 50	
" fl. albo — 50	

	Pr st., Rmt Rd. ö.
Gypsophila Stevenii, 3 fot hög, hvit	— 40
Helleborus; <i>Prastrot; Nysrot,</i> (Ranunculaceæ)	
viridis	— 50
Hemerocallis; <i>Daglilja,</i> (Liliaceæ)	
flava, 2 fot hög, gul	— 50
" fulva, 2 fot hög, orangefärgad	— 50
" fol. var. med brokiga blad	— 50
" graminea, 1 à 1½ fot hög, gul	— 50
" Kvanso fol. var. med brokiga blad 1 —	
" fl. pl. dubbel	1,50
De tvemne sistn. kunnna äfven oddas i krukor i god löft & driftbänkjord. Ha vackra blad & blmr. Uthårdta vintern under god beträckning.	

Hepatica; <i>Sippa,</i> Ranunculaceæ)	
" triloba (Amemone Hep.) vanlig blå	— 25
" " fl. alba, hvit	— 35
" " rubra, röd	— 35
Heraclium; <i>Björnflöka;</i> <i>Herkulesört,</i> (Umbellifereæ)	
" giganteum, vack. bladv., pr 12 st. 2 rdr — 20	
Hesperis; <i>Nattviol,</i> (Crucifereæ)	
" matronalis, 3 fot hög, hvit eller röd — 25	
" tristis, 2 fot hög, grå, välluktande	— 25
Hieracium; <i>Hökblomster,</i> (Cichoraceæ)	
aurantiacum, 1 fot hög, orangefärgad — 25	
Hyacinthus; <i>Hyacint,</i> (Asphodeloeæ)	
" orientalis, 1:ma, pr 100 st, 10 rdr; — 15	
pr 12 st., rdr 1,50	
" 2:da, pr 100 st, 6 rdr; 12 st., 1 rdr — 10	
Expedieras blott om hösten.	

Hyoscyamus; <i>Bolmört,</i> (Solanaceæ)	
" orientalis, 2 fot hög, violett	— 50
Iris; <i>Svärdslijja,</i> (Iridæ)	
" florentina	— 40
" germanica, nya, praktfulla, variet. — 50	
pr 25 st. med namn, 10 rdr.	
" graminea	— 40
" hungarica	— 40
" pumila	— 50
" sibirica	— 30

" Öfriga sorter, se krukväxter.	
Lalemantia, (Labiateæ)	
" canescens (Dracocephalum)	— 40
Lathyrus; <i>Ärtblomster,</i> (Papilionaceæ)	
latifolius	— 50
Ligularia; <i>Bandblomster,</i> (Senecionideæ)	
" macrophylla, 5 à 6 fot hög, gul	— 30
Lilium, <i>Lilja,</i> (Liliaceæ)	
" atrosanguineum	— 50
" auratum, se krukväxter.	
" bulbiferum, brandgul, pr 12 st., 2 rdr — 20	
" " aurantiacum, pr 12 st., 5 rdr	— 50
" " punctatum	— 50
" " umbellatum, pr 12 st., 5 rdr	— 50
" candidum, <i>Hvit Lilja</i> , pr 12 st., 3 rdr — 30	
" fl. pl.	— 50
" speciosum	— 50
" striatum	— 50
" croceum, saffrangul, pr 12 st., rdr 3,50 — 35	
" exelsum, gulaktig	1 —
" fulgens	— 50

Lilium fulgens umbellatum erectum	— 50
" fulgens umbellatum incomparabile	— 60
" lancifolium, pr 12 st., 10 rdr 1 —	
" " album, pr 12 st., 10 rdr 1 —	
" " punctatum	2,50
" " rubrum	1 —
" longiflorum, pr 12 st., rdr 2,50 — 25	
" Martagon, pr 12 st., 7 rdr — 70	
" sibiricum	— 50
" " splendens	— 75
" superbum	— 1 —
" tigrinum	— 50
" venustum	— 1 —

Efter vårt val lemnas:

25 sorter Liljor med namn, 12 rdr.

12 vackra sorter med namn, 8 "

Lupinus; <i>Vargböna,</i> (Leguminosæ)	
" grandifolius (macroph.) 3 f. h., violett — 25	
" laxiflorus, 2 à 3 fot hög, purpuröd — 35	
" mexicanus, 2 à 3 fot hög, violett	— 40
" polypyllus, 2 à 3 f. h., blå; violett — 25	
Lychins; <i>Studentneglika;</i> <i>Tjärblomster,</i> (Caryophyllæ)	
" chalcedonica, 3 fot hög, högröd	— 25
" " fl. albo, hvit	— 25
" coronaria (Agrostemma), 1 f. h., röd — 15	
pr 12 st., rdr 1,50.	
" " alba, hvit, . . . pr 12 st., rdr 1,50 — 15	
" " bicolor, . . . pr 12 st., rdr 1,50 — 15	
" fulgens, 2 fot hög röd	— 50
" " Hageana, 2 f. h., röd eller hvit — 50	
" " grandifl., 2 f. h., röd eller hvit — 50	
" Sieboldii, 1 fot hög, hvit	— 50
" viscaria splendens, 1 fot hög, röd.	— 15
pr 12 st., rdr 1,50	

Lythrum; <i>Fackelblomster,</i> (Lythrarieæ)	
" Salicaria roseum superbum, 3 à 4 fot	
hög, röd	— 25
" virgatum, 3 à 4 fot hög, röd	— 25
Malva; <i>Kattost,</i> (Malvaceæ)	
" Morenii, 1 à 2 fot hög, rosenröd	— 25
" moschata, 2 fot hög, röd eller hvit	— 30
Mentha; <i>Mynta,</i> (Labiateæ)	
" rotundifol., fol. var., pr 12 st. 1 rdr — 10	
Starkt välväxt. m. brokiga blad. Särdeles passande till infattn. Fordrar svag beträckning under barfrost.	

Meum, (Umbellifereæ)	
" athamanticum, 1 fot hög, hvit	— 40
Blirna obetydl; bladen mycket vackra.	
Mimulus, se krukväxter.	
Mulgedium, (Cichoraceæ)	
" floridanum, 4 à 5 fot hög, violett	— 25
Muscari; <i>Perlyacinth,</i> Asphodeloeæ)	
" botryoides alba	— 65
" coerulea	— 10
Myosotis; <i>Förgät-mig-ej,</i> (Boragineæ)	
" alpestris, 1 f. h., blå, pr 12 st., 50 ö. —	
" " fl. roseo, rödaktig	— 15
Narcissus; <i>Narciss,</i> (Amaryllideæ)	
" poeticus, <i>Pingstlilja</i> , hvit	—
pr 100 st., 4 rdr.	

	Pr st., Rmt Rd. ö.
Narcissus poeticus fl. pl., dubbelt, hvit	15
pr 12 st., rdr 1,50.	
„ Pseudonarcissus <i>Fäsklilia</i>	15
pr 12 st., rdr 1,50.	
Oenothera; <i>Nattljus</i> , (<i>Onagraceæ</i>)	
„ fruticosa, 2 fot hög, höggul	20
„ glauca, 1 f. h., gul, pr 12 st., rdr 1,50 — 15	
„ Jomesii, 2 à 3 fot hög, gul	15
Omphalodes; <i>Venusblomster</i> , (<i>Boragineæ</i>)	
„ verna, $\frac{1}{2}$ f. h., blå, pr 12 st., rdr 1,50 — 15	
Ornithogalum; <i>Fågelmyjölk</i> , (<i>Asphodelæ</i>)	
„ narbonense, 2 fot hög, hvit	50
Orobus; <i>Skogsärt</i> , (<i>Papilionaceæ</i>)	
„ lathyroides, 2 à 3 fot hög, blå	40
„ venosus, 12 à 16 tum hög, blå	40
Oxalis, se krukväxter.	
Paeonia; <i>Pion</i> ; <i>Bondros</i> , (<i>Ranunculaceæ</i>)	
„ chinensis & herbacea med namn	1 —
pr 12 st., utm. sort. m. namn 10 rdr.	
Papaver; <i>Wallmo</i> , (<i>Papaveraceæ</i>)	
„ bracteatum, 2 fot hög, högröd	25
„ orientale, 2 fot hög, skarlakanröd	25
Pelargonium, se krukväxter.	
Penstemon, se krukväxter.	
Petasites; <i>Pestrot</i> , (<i>Eupatorineæ</i>)	
„ officinalis	25
Bladv.; trifvas p. fuktiga, skugg. ställen.	
Phalaris; <i>Rörflen</i> , (<i>Gramineæ</i>)	
„ arundinacea var. coerulea, <i>Bandgräs</i> —	
pr 12 st., 75 öre.	
Phlox; <i>Höstsyrten</i> , (<i>Polemoniacæ</i>)	
„ perennis & suffruticosa med namn — 45	
25 vackra sorter med namn rdr 9 —	
12 „ sorter med namn	4,50 —
Plantago; <i>Vägvärda</i> , (<i>Plantagineæ</i>)	
„ major fol. purpureis	25
Polemonium; <i>Tvensvagn</i> , (<i>Polemoniacæ</i>)	
coerulea, 2 fot hög, blå och hvit	15
„ fol. var., utmärkt väcker	50
Den sistn., som har brokiga blad, är äf- ven en präktig krukväxt.	
Polygonum; <i>Bohwe</i> , (<i>Polygonaceæ</i>)	
Bistorta, 1 à 2 fot hög, ljusröd	25
polymorphum ajanense, $\frac{1}{2}$ fot hög	25
Potentilla; <i>Fingerört</i> , (<i>Rosaceæ</i>)	
„ alba, 1 fot hög, hvit	40
„ atrosanguinea, 2 fot hög, mörkröd	30
„ aurea, 1 fot hög, gul	25
formosa, 2 à 3 fot hög, ljusröd	30
„ hybrida, flera sorter, 2 à 3 fot hög	30
„ Mac Nabiana, 2 fot hög, mörkröd	40
Primula; <i>Majayckel</i> ; <i>Gullvifja</i> ; <i>Oxlägga</i> , (<i>Primulaceæ</i>)	
„ acaulis fl. luteo, utmärkt väcker	50
„ fl. rubro, röda blommor, väcker	50
„ Auricula, plantor efter bästa sort frö — 15	
pr 12 st., rdr 1,50.	
„ elatior, pr 100 st., 6 rdr —	
„ luteola	50
„ mollis, mörkcarmosinröd	50
„ suaveolens, pr 100 st., 9 rdr — 12	
	Pr st., Rmt Rd. ö.
Primula veris, vanl., gul, pr 100 st., 6 rdr —	
Ptarmica, (<i>Senecionideæ</i>)	
„ Clavennæ fl. pl., 2 fot hög, hvit	50
„ vulgaris fl. pl., 2 à 3 fot hög, hvit	25
Särdeles användbara till buketter.	
Pulmonaria; <i>Lefverört</i> , (<i>Boragineæ</i>)	
officinalis, 1 fot hög, violet	25
Pyrethrum; <i>Batrantsört</i> , (<i>Senecionideæ</i>)	
„ carneum, 2 fot hög, ljusröd	20
pr 12 st., 2 rdr.	
„ roseum, 2 fot hög, rosenröd	20
pr 12 st., 2 rdr.	
„ hybridum i flera praktfulla färger	40
pr 12 st., 4 rdr.	
De båda förstn. sorterna lemma det be- kanta, persiska insektpulfret.	
Ranunculus; <i>Ranunkel</i> ; <i>Smörblomster</i>	
„ acris fl. pl., gul, dubb., pr 12 st., 2 rdr — 20	
„ asiaticus fl. pl., praktfull i rummel	
pr 100 st., 3 rdr	
„ fl. pl., pr 12 st. i 6 sort. m. n. 1 rdr — 12	
„ cecius, 4 à 5 fot hög, gul	25
„ gramineus, 1 fot hög, gul	25
„ repens fl. pl., . . . pr 12 st., 50 öre —	
Rheum; <i>Rhabarber</i> , (<i>Polygonæ</i>)	
australe (Emodii) 6 à 7 fot hög	50
„ undulatum, 5 à 6 fot hög	15
„ Queen Victoria, 5 à 6 fot hög	30
Salvia, se krukväxter.	
Saponaria; <i>Såpört</i> , (<i>Caryophylleæ</i>)	
officinalis fl. pl., pr 12 st., 1 rdr	10
Saxifraga; <i>Stenbräcka</i> , (<i>Saxifrageæ</i>)	
„ crassifolia, ljusröd	75
„ muscoïdes	50
Scilla; <i>Hafslök</i> , (<i>Asphodelæ</i>)	
„ amoena, blå pr 12 st., rdr 1,50 — 15	
„ campanulata, utm. prydlig	1 —
„ sibirica, blå pr 12 st., rdr 2,50 — 25	
Vackra, tidigt blommande växter.	
Scutellaria; <i>Hjälmiört</i> ; <i>Getnos</i> , (<i>Labiatae</i>)	
macrantha, 1 f. h., hög, mörkviolett	25
Sedum; <i>Fetört</i> ; <i>Fetknoppar</i> , (<i>Crassulaceæ</i>)	
„ Aizoon, 1 fot hög, gul	25
„ hybridum, kryp., röd, pr 12 st., 1 rdr — 10	
„ spurium, kryp., gul, pr 12 st., 1 rdr — 10	
„ Sieboldii	50
Senecio; <i>Boört</i> , (<i>Senecionideæ</i>)	
Doria, 7 à 8 fot hög, gul	50
Silphium, (<i>Senecionideæ</i>)	
„ perfoliatum, 7 à 8 fot hög, gul	50
Solidago; <i>Guldris</i> , (<i>Asteroidæ</i>)	
canadense, 3 à 4 fot hög, gul	30
Spiraea; <i>Brudspira</i> , (<i>Rosaceæ</i>)	
Auruncus mas, 3 fot hög, hvit	50
„ foem., 3 fot hög, hvit	50
„ rosea, 3 fot hög, rödaktig	50
„ japonica, (Hoteia) 1 à 2 f. h., hvit 1,25	
„ Ulmaria, 2 fot hög, hvit	25
„ fl. pl., 2 fot hög, dubbel	50
„ „ fol. arg. var. med brokiga blad	50
„ „ aureis var., utmärkt	1,50
Stevia, se krukväxter.	

	Pr st., Rmt Rd. ö.
Stipa; <i>Ejädergräs,</i> (Gramineæ)	
" pennata	— 25
Symphytum; <i>Svartrot,</i> (Boragineæ)	
" officinalis, 4 à 5 fot hög, violett	— 25
Teleckia, (Asteroideæ)	
" cordifolia, 6 à 7 fot hög, gul	— 25
" speciosa, 6 à 7 fot hög, gul	— 25
Thalictrum; <i>Ångsurt,</i> (Ranunculaceæ)	
" acutilobum 3 à 4 fot hög	— 25
" aquilegiformium, 4 fot hög	— 50
" appendiculatum, 2 à 3 fot hög	— 25
" angustifolium	— 30
" calabricum, 2 à 3 fot hög	— 30
" Chelidoniumii 3 à 5 fot hög	— 25
" galioides, 2 fot hög	— 35
" laserpitifolium, 3 à 4 fot hög	— 25
" lucidum, 4 à 6 fot hög	— 50
" minus, 1½ fot hög	— 50
" sparciflorum	— 25
" trigynum	— 25
Alla hafya små, men ytterst talar, blnr, kvilka, liksom de sköna örtbladen äro mycket brukbara till buketter.	
Tradescantia, (Commelinaceæ)	
" virginica, pr 12 st., 2 rdr.	— 20
Trollius; <i>Ångboll,</i> (Ranunculaceæ)	
" asiaticus, 1½ fot hög, gul	— 50
" giganteus, 2 fot hög, gul	— 50
Tulipa; <i>Tulpan,</i> (Liliaceæ)	
" dubbla i fl. färger, pr 100 st., rdr 5 — —	
" enkla i fl. färger, pr 100 st., rdr 7 — —	
" dubbla & enkla bl., pr 100 st., rdr 4,50 — —	

VII. Krukväxter:

T. betyder: att de växter, vid hvars namn det står, fördra om vintern + 3 à 6° Cels. och kunna under sommarmånaderna utställas på lugna, något skuggiga ställen i det fria, hvarvid krukorna till hälften nedgräfvas i sand; V.: att de böra övervintras vid + 10 à 15° C.; B.: att växterna trifvas i boningsrum och F.: att de kannas under sommaren upplanteras på kalfjord, i hvilket fall de åter inplanteras i krukor i medio af September. Då dessa tecken är ofta anförla vid slägtnamnet, gälla de även för alla arterna. Växternas familjnamn och hemland finnes äfven angifvet.

	Pr st. Rmt Rd. ö.
Abelia, (Caprifoliaceæ) T. F.	
" floribunda. Mexiko	— 50
Abutilon, (Malvaceæ) T. B.	
" brasiliense, Brasilien	— 1
" striatum, Brasilien	— 50
" " Thompsonii, med gulft. blad	— 1
" vexillarium (megapotanicum) Brasil.	— 30
Bekanta tacksamt bl. prydnadsväxter.	
Acacia; <i>Akasia,</i> (Mimosæ) T. B.	
" albicans, Nya Holland	— 50
" armata, Nya Holland	— 50
" undulata (paradoxa)	— 75
" Brownonii (ciliata) Nya Holland	— 1
" capensis, Godahoppsudden	— 1
" calamifolia, Nya Holland	— 75
" celastrifolia, Nya Holland	— 75
" cultiformis, Nya Holland	— 50

	Pr st., Rmt Rd. ö.
Acacia cuneata, Nya Holland	— 75
" cyanophylla, Nya Holland	— 1
" dealbata (affinis) Nya Holland	— 75
" descipiens, Nya Holland	— 75
" dolabriformis, Nya Holland	— 50
" falcatá, Nya Holland	— 75
" falciformis, Nya Holland	— 75
" floribunda, Nya Sydwales	— 1
" glaucescens, Nya Holland	— 50
" glomerata, Nya Holland	— 75
" heteroclada, Nya Holland	— 75
" homomalla, Nya Holland	— 75
" lanata, Nya Holland	— 1
" la Trobeii, Nya Holland	— 75
" leprosa, Nya Holland	— 50
" linearis, Nya Holland	— 1
" longifolia, Nya Holland	— 50

	Pr st., Rmt Rd. öre.	Pr st., Rmt Rd. ö.
<i>Acacia longifolia magnifica</i>	1,50	Vackra blmr, hvita m. rödt och blekblått; fördra kraftig jord & mättl. vattning.
„ <i>longifolia pendula</i>	1	
„ <i>longissima elegans, Nya Holland</i>	75	
„ <i>lophanta, Nya Holland</i>	50	
„ <i>speciosa</i>	75	
„ <i>lunata, Nya Holland</i>	50	
<i>Melanoxyton Van Diemens land</i>	1	
„ <i>mollissima, Nya Holland</i>	1	
„ <i>muclronata, Nya Holland</i>	75	
„ <i>myriobotrya, Nya Holland</i>	75	
„ <i>myrtilifolia, Nya Holland</i>	1	
„ <i>nematophylla, Nya Holland</i>	1	
<i>Neumanniana, Nya Holland</i>	50	
„ <i>platyptera, Nya Holland</i>	75	
„ <i>plumosa, Nya Holland</i>	2	
„ <i>retinoides, Nya Holland</i>	75	
„ <i>Sophora, Nya Holland</i>	50	
„ <i>xylophyloides, Nya Holland</i>	75	
25 sorter efter vårt val, 15 rdr.		
12 vackra sorter.	8	
Utom de här anfördta finns gamla, starka exemplar om 6 & 20 fot höjd, hvarav priser uppgiftas på begärani. Akasierna höra till de kalla växthusens fön. prydnadsträd. De pl. i sandbl. löf- och ljungjord; förra om vintern svala platser och spars. vattn. Utställas om sommaren i det fria.		
<i>Acanthus; Björnklocka, (Acanthaceæ) T. F.</i>		
„ <i>spinosa, S. Europa</i>	100	
<i>Achimenes, (Gesneriaceæ) V. B.</i>		
„ många praktfulla sorter; från Sept. till Maj expedieras endast torra rhizomer, 12 sorter à 1, 2 & 3 rh, 1,50 — 15		
Från Maj till Sept. exp. bl. exempl. i krukor, hvarje kruka inneh. 10, 15 à 20 rhizomer, pr 12 st 5 rdr — 50		
Nästa, tacksamma blmr, som trivas bäst i halfrutten skogsjord, bland. m. sönderhackad hvitmossa & sand. Fordra för öfr. jemn värme, fuktighet och skugga. Kunna under blom. inflyttas i boningsrum.		
<i>Achyranthes, (Amaranthaceæ) V. F.</i>		
„ <i>acuminata, S. Amerika</i>	50	
„ <i>bourbonica, Ostindien</i>	50	
„ <i>Lindenii, S. Amerika</i>	50	
„ <i>Verschaffeltii, . . pr 100 st, 12 rdr — 20</i>		
pr 12 st, 2 rdr		
Alla hafta blodrunda blad och äro mycket användb. till dekorat. såväl inom-, som utomhus. Fortpl. lätt genom sticklingar.		
<i>Acorus; Kalmus, (Aroideæ) T. F.</i>		
„ <i>gramineus, Kina</i>	50	
„ <i>fol. arg. var., med brokiga blad</i>	75	
Användbar till infattningar.		
<i>Acrostichum, (Polypodiæ) V.</i>		
„ <i>brevipes (Elaphoglossum callaf.) Java</i>	75	
„ <i>melanopus (Elaphogl.) Mell. Amerika</i>	1	
Egendoml. ormbunkar m. breda läderartade blad.		
<i>Acropora, (Orchidæ) V.</i>		
„ <i>fuscata, Mexiko</i>	10	
„ <i>Loddigesii, Mexiko</i>	10	
Egendomliga, starkt vällukt. blommor.		
<i>Adamia, (Saxifrageæ) T. B. F.</i>		
„ <i>cyanæa, Nepal</i>	75	
„ <i>versicolor, Nepal</i>	75	

Pr st., Rmt Rd. ö.
Agathosma purpurea, Godahoppsudden. — 50
 Småbuskar m. fint, arom. juktande blad och violetta blmr. Pl. i ljunghjord.
Agave; *Hundrärs-aloe,* (Liliaceæ)
 „ *americana* fol. luteis marg., S. Eur. & S.
 Amer., mycket starka ex., 2 st., 90 rdr. 50 —
 „ *aplanata*, Mexiko, unga planter 2,50
 „ *atrovirens*, Mexiko, starka pl. 15 —
 „ *coccinea*, Mexiko, mycket starka ex. 30 —
 pr 2 st., 50 rdr.
 „ *filifera*, Mexiko, starka 50 —
 „ *lurida*, Mexiko, mycket stora ex. 100 —
 „ „ unga fröplanter 1 —
 „ *Vérchaffeltii*, Mexiko, unga pl. 1 —
 Dessa jättelika växter, passa förträffl. till dekorat. i det fria om sommaren. De tälasol- och stark bläst. Hålla om vintern tillgodo med anspråkslösa platser i temp. växthus, boningsrum eller torra, luftiga källare. A. filifera uppår ej samma kolossal storlek, som de öfriga; Dessa styvfa blad, från hvaras kanter nedhänga talrika hvita trädar, bildar en vacker bukett.

Alocasia. (Aroideæ) V.

„ *gigantea*, ny, utm., unga pl. 5 —
 „ *Jenningei*, ny 5 —
 „ *macrorrhiza*, vackra exemplar 1 à 5 —
 „ *metallica*, unga, vackra exemplar 5 —
 „ *zebrina*, vackra exemplar 2 à 10 —
 Härstamma från tropiska länder, Borneo, Java, Ost. & Vestindien etc. och fördra, för att trivvas väl, fuktiga, varma växthus. Pl. i löjfjord. A. Jenningei har smaragdgöra, svartfl. blad; macrorrh. har vackra, hvitmarorerade blad och zebrina utm. sig genom praktf. marmoreraade bladskaft. Utmärkt dekorationsväxter.

Alpinia. (Scittamineæ) V.

„ *Cardamommum, Malabar* 1 —
 Hvilas om vintern; bör då ej vattn. Omplanteras om vintern.

Alsophila. (Polypodiæ)

„ *australis*, Nya Holland, V. T., starka, vackra exemplar 5, 10 à 15 —
 „ *Miquelianii*, Java, V. 5 —
 „ *radens* Brasiliens, V. 5 —
 Bland dessa stäfl., trädartade ombunkar utm. sig synnerl. den första, hvars stam blifver ganska hög och tjock och hvars blad uppnå en längd af 6 à 8 fot och deröver. Den trivfes i växthus v. + 8 à 10° C., men kan äfven odlas i varmare lokaler. Tål ej drag eller torr atmosphär.

Alstroemeria. (Amaryllideæ) T. F.

„ *chilensis*, Peru, Chili, 12 st., 5 rdr — 50
 „ *psittacinus*, Peru, Chili, 12 st., 5 rdr — 50
 Ofver, torrt och vid sätta låg temperatur, som mälj. I Februari omph. de och stillas nära glaset i ett temp. rum. Mot slutet af Maj nedgr. krukkorna på grupper å fritt land. Blomna äro utm. vackra, och skifta i otaliga färger.

Althernanthera. (Amarantaceæ) V.

„ *amabilis* fol. majoribus, S. Amerika — 20
 pr 12 st., 2 rdr.
 „ *ficoidea versicolor*, S. Am., 12 st., 2 rdr — 20
 „ *sessilis amoena*, S. Am., 12 st., rdr 2,50 — 25
 „ *spathulata*, S. Amer., 12 st., rdr 2,50 — 25
 Dessa växters blad vexla i rödt, gult och grönt. De blifva blott några tim höga och grena sig starkt. Utm. användb. till

Pr st., Rmt Rd. ö.
 dekoreration inom- och uteomhus. Fortpl. lätts genom sticklingar.

Amaryllis. (Amaryllideæ)

„ *alba lineata*, V. 1 —
 „ *Belladonna*, Vestindien, V. unga lökar 1,50 —
 „ *formosissima*, S. Amerika, T. B. 30
 pr 12 st., 3 rdr.
 „ *Johnsonii* (Bastard) V. B. 1,50 à 3,50
 „ *vittata*, Godahoppsudden. Vestindien, V. B. 1,50 à 3,50
 Fordra under vegetationstiden + 15 a 20° C. och rikl. vattn. Under vintern, då lökarne hvila, böra de stå aldeles torra. Ompl. om vintern i kraftig jord. A. formosiss. kan om vintern driftas derigenom att man lägger dem på ett torrt, varmt ställe. Då blomknopparne framkomma inplanteras lökarne i krukor och vattnas.

Amomum; *Ingefura*, (Scittamineæ) V.

„ *zingiber*, vanlig, Ostindien 1,50
 Hvilas om hösten; vattnas då sparsamt; omplanteras om vintern.

Amorphophallus. (Aroideæ)

„ *campanulatus*, T. 2 —
 „ *giganteus*, V. 5 —
 „ *gigas*, V. 5 —
 Märvk. växter, hvars rotknölar ligga torra om vintern; omplanteras om vintern.

Anagallis; *Ajve*, (Primulaceæ) T. B.

„ *collina* (grandifl.) Marokko 30
 „ *Monelli*, Afrika 30
 Nätta, blå eller röda blmr, särdeles passande till ödl. i rum; omplanteras om våren i lät, god jord.

Andropogon; *Skägg-gräs*, (Gramineæ) V. F.

„ *argenteus*, Mexiko? 75
 Vackett gräs; kan om sommaren användas i bladgrupper.

Anemone, se två- & fleråriga blomsterv.

Anguloa. (Orchidæ) V.

„ *Clovesii*, Columbien 10 —
 Besynnerligr. stora, gula, starkt vällukt. blommor. Planteras i mossa.

Anthurium. (Aroideæ) V.

„ *membranuliferum*, Trop. Amerika 3 —
 „ *magnificum*, Brasilien 6 —
 „ *Miquelianum*, Trop. Amerika 5 —
 „ *radiato-pedatum*, Trop. Amerika 5 —
 „ *regale*, Trop. Amerika 6 —
 „ *Scherzerianum*, Guatemala, stor 10 —
 „ „ ettåriga fröplanter 1,50 —
 „ *signaturem*, Trop. Amerika 3 —
 Utm. sig dels för vackra blad och dels för vackra blmr. A. Scherzerian har cinnoberröda blmr, hvilka hålla sig friska flera månader. Alla fordra varm, fuktig intt.

Aphelandra. (Acanthaceæ) V.

„ *Leopoldii*, Rio Janeiro 1 —
 Vackra, hvitrandiga blad och högödablmr.

Aralia; *Bergangeliaka*, (Araliaceæ)

„ *crassifolia*, Nya Zeeland, T. gamla ex 5 —
 „ *japonica* (Faitzia) Japan, T. F. B. 2,50 —
 „ „ starka praktexemplar 5 —
 „ *papyrifera*, Kina, T. F. B. 1 —
 Allesamman utm. för sina blad. A. papyrifera lemnar materialet till det bekanta kinesiska sidenpapperet.

Araucaria. (Abietinæ) T.

„ *Biddwillii*, Nya Holland, 4 à 5 f. h. 25 —

	Pr st., Rmt Rd. ö.	Pr st., Rmt Rd. ö.
<i>Araucaria Biddivillii</i> 1½ f. h. exemplar 10—		
„ brasiliensis, <i>Brasilien</i> , starka 10—		
„ <i>Cookii</i> , <i>Nya kaledonien</i> , 1 fot höga 8—		
„ <i>Cunninghamii</i> , <i>N. Holland</i> , 1½ f. h. 10—		
„ <i>exelsa</i> , <i>Norfolk</i> , 6 à 7 f. h., praktex. 50—		
„ „ 2 fot höga exemplar 10—		
„ <i>imbricata</i> , <i>Chili</i> , starka ex., 30, 40 à 50—		
„ „ <i>yngre</i> exemplar 6, 8 à 10—		
Araucarierna anses vara de vackraste af alla barrträd. Pl. i god, närrande äljfjord; behöfva om vintern blott + 5 a 6°C; utställas om sommaren i det fria. Af A. brasili. & exelsa finnas mycket stora, här ej anfördta exempl., hvara priser meddelas på begärana.		
Areca; Betelpalm, (Palmeæ) V. B.		
„ <i>aurea</i> (<i>Hyophorbe ind.</i>) <i>Ön Bourbon</i> 5—		
„ <i>rubra</i> , <i>Maskarenerna</i> , starka 10—		
Kunna odlas i boningsr. Böra ofta besprutas m. vatten och ej utsättas för kalla luftdrag		
Arenga; Sockerpalm, (Palmeæ) V.		
saccharifera, <i>Sundaöarna</i> , starka 10—		
Uppnär betydlig storlek och är en af de stälgäste palmer.		
Arisema, (Aroideæ) T. B.		
„ <i>ringens</i> , <i>Japan</i> 75		
„ <i>præcox</i> , <i>Japan</i> 1—		
Vackra blad och egendoml. blmr. Rotknölarna hylta om vintern, böra då ej vattnas. Omplanteras om våren.		
Aristea, (Irideæ) T.		
„ <i>cyanea</i> (<i>Ixia afric.</i>) <i>Godahoppsudden</i> — 50		
Aristolochia; Pipblomster, (Aristolochieæ) V.		
„ <i>fimbriata</i> , <i>Trop. Amerika</i> 1,50		
„ <i>grandiflora</i> , <i>Jamaica</i> 2,50		
Slingerväxt för fuktiga växthus; böra ej vattnas om vintern.		
Artemisia; Gräddo, Malört, (Senecionideæ)		
„ <i>argentea</i> , <i>Madeira</i> , T. F., 12 st., 4 rdr — 40		
„ „ stora exemplar, pr 12 st., 10 rdr 1—		
„ <i>Stelleriana</i> , <i>S. Europa</i> , T. F. 30		
pr 12 st., 3 rdr.		
Hafva findelta, rent silvärhrita blad; anv. fördelaktigt i sälvt blad, som blomstergrupper. Fortplantas genom sticklingar.		
Arundo; Rör, (Gramineæ)		
„ <i>Donax</i> , <i>Jätterör</i> , <i>S. Europa</i> , T. F. . . 2—		
„ „ fol. alv. var., praktf., T. F. 2,50		
Gigantiska grässlag. Pl. i växthusens fria grund uppnå de ofta 12 à 15 fots höjd.		
Aspidistra; Sköldblomster, (Smilacineæ)		
„ <i>punctata</i> , <i>Kina</i> , V. B. 1—		
Bladen breda, oljiform. tecknade m. hvit strimmor. Pl. i löf- & driftbänkjord.		
Aspidium; Taggbräken, (Polypodieæ)		
Bertuchianum, T. F. 1—		
caripense, <i>Brasilien</i> , T. V. 1—		
chrysolobum, <i>Brasilien</i> , V. 75		
erythrosorum, <i>S. Amerika</i> , T. V. . . . 1—		
fraxinifolium, <i>Brasilien</i> , V. 1,50		
glabellum, <i>Nya Zeeland</i> , T. F. 1—		
macrophyllum, <i>Antillererna</i> , V. 1,50		
molle, <i>Tropikerna</i> , V. 75		
trifoliatum, <i>Sandwichöarne</i> , V. 1,50		
violascens, <i>Brasilien</i> , V. 50		
Tropiska ormbunkar, som för sina vackra blad förtjena mycken uppmärksamhet. Pl. i halvfrutten skogsjord.		
Asplenium, (Polypodieæ)		
„ <i>alternifolium</i> , <i>Java</i> , V. 2—		
„ <i>bulbiferum</i> , <i>N. Holl.</i> , T. B., 50 öre à 5—		
Belangerii, <i>Java</i> , V., vacker 1 à 5—		
„ <i>canariense</i> , <i>Canariöarne</i> . T. 50		
„ <i>caudatum</i> , <i>Trop. Amerika</i> , V. 2—		
„ <i>cyrtophyton</i> , <i>Trop. Amerika</i> , V. 1,50		
„ <i>dispersum</i> , <i>Java</i> , etc., V. 1,50		
„ <i>ebenum</i> , <i>N. Amerika</i> , T. 1—		
„ <i>erectum</i> , <i>Trop. Amerika</i> , V. 1,50		
„ <i>foeniculaceum</i> , <i>Venezuela</i> , V. 1,50		
„ <i>firmum</i> , <i>Venezuela</i> , V. 1,50		
„ <i>Filix foem.</i> , <i>Sverige</i> , T. F. 1,25		
„ „ <i>foem. coronatum</i> 1—		
„ „ <i>diffusum</i> 1,25		
„ „ „ <i>multifidum</i> 2—		
„ „ <i>Fieldii</i> 2—		
„ „ <i>flexuosum</i> 1,50		
„ „ <i>furcans</i> 1,50		
„ „ <i>laciniatum dissectum</i> 1,50		
„ „ <i>multiceps</i> 2—		
„ „ <i>purpurea</i> 2—		
„ <i>flabellifolium</i> , <i>Mauritius</i> , V. 2—		
„ <i>glaberrimum</i> , <i>Java</i> , V. 1,50		
„ <i>marinum</i> , <i>S. Europa</i> , <i>N. Afrika</i> , T. — 75		
„ <i>Nidus</i> , <i>Australien</i> , V., starka ex. 25—		
„ <i>præmorosum</i> , <i>Trop. Amerika</i> , V. 1,50		
„ <i>Trichromes</i> , <i>Sverige</i> , T. F. 50		
„ <i>viviparum</i> , <i>Mauritius</i> , V. 1—		
„ <i>viride</i> , <i>Mell. Eur.</i> , <i>N. Indien</i> , T. F. 1—		
Vackra ormbunkar. Pl. i halvfrutten skogsjord. De med T. F. beteckn., hvartill höra alla A. <i>Filix foem.</i> kunnas om sommaren utplanteras på kalljord.		
Ataccia, (Taccaceæ) V.		
„ <i>aculeata</i> , <i>Indien</i> 5—		
Praktf. varmhusv. Pl. i löf- & driftbänkjord, hålls torr under hviloftiden.		
Attalea; Palmæ V.		
„ <i>maracaibensis</i> , <i>Maracaiberna</i> 10—		
Aucuba, se Träd & buskar till anläggan.		
Azalea; Ejjelros, (Rhododraceæ) T. B.		
„ <i>indica</i> , nya vackra varieteter 1,50		
pr 12 st., 15 rdr.		
„ <i>gamla</i> ex. med stora kronor 10—		
Azaleerna tillhörda de kalla växthusens förn, prydnadsv. Blommor variera i alla nyanser från hvitt till mörkrött och utbildas sig i April & Maj; men om man tid. inställer ex. i varma lokaler, så blomma de redan i Januari, Febr. & Mars, Pl. i ljungh- & löjfjord; böra ej för starkt torka.		
Balanitium, (Polypodieæ) T.		
„ <i>antareticum</i> , <i>Australien</i> 2,50		
Praktf. ormbunkar. Uppnär en betydlig storlek. Se abildningen på omslagsyttersida.		
Bambusa; Bambu, (Gramineæ) T. F.		
„ <i>Fortunei</i> fol. alb. vitt. 50		
Vackert hystrrand, gräs; passar till infattningar och dekorationer.		
Beaufortia, (Myrtaceæ) T.		
„ <i>decussata</i> , <i>Nya Holland</i> 50		
Blifver 4 à 6 fot hög m skarlaanur, blmr. Planteras i löf- & ljungsjord.		
Begonia, (Begoniaceæ) V. B.		
„ <i>argentea</i> 1,50		

	Pr st.	Rmt	Rd. ö.
Begonia argentea splendens		1,50	
" boliviensis, Bolivia, T.		2 —	
" Dagswelliana		— 50	
" discolor, Kina, T.		— 50	
" erecta multiflora		— 2,50	
" grandis		— 50	
" gracilis		— 50	
" incarnata, Brasilien		— 50	
" imperialis, Mexiko		— 1 —	
" " smaragdina		— 1 —	
" Madame Camille Decandolle		— 1 —	
" Wagner		— 75	
" marginata		— 75	
" nobilis		— 1 —	
Pearceii, Mexiko, starka		— 2 —	
Professeur Lemaire, silfverhv. blad . . .		— 75	
quadricolor		— 1 —	
Queen Victoria		— 1 —	
Rex, Mexiko?		— 50	
" magnifica		— 75	
" ricinifolia, Mexiko		— 75	
" robusta		— 50	
Santa Maria		— 75	
" splendens atrosanguinea		— 1,50	
" Knerkii		— 1 —	

12 st. efter vårt val, 10 rdr.

De sorter hvare hemländer ej finnas uppgifta äro inom trädgårdar uppdragna hybrider och varieteter. Några sorter harva vackra blmr, men de flesta odlas för de vackra, metallglänsande bladen. B. boliviensis, som har skarlakanr. blmr, kan ses för del pl. på fritt land på lugna, skyddade platser. B. Dagsw. blommor hela året, men rikast i Oktober & Nov. B. discolor är en länge känd sort m. vackra, på baksidan röda blad och ljusröda blmr. B. Pearceii utm. sig gen. smaragdgröna, svartmarm. blad och vackra, gula blmr.

Berberis; Surtörne, (Berberideæ) T.

" Bealii, Nepal	1 —
" Darwyntii, Chili	1 —

Hafva om våren vackra, gula blmr i rika klasar. Planteras i löjfjord.

Bignonia; Trumptblomster, (Bignonia- ceæ) T. V.

" jasminifolia, Orinoko	1 —
Prydl. rankv. m. vackra, ljusröda blmr. Planteras i löjfjord.	

Billardiera, (Pittosporaceæ) T.

" scandens, Nya Holland	1 —
Planteras i sandblandad, lätt ljungjord.	

Billbergia, (Bromeliaceæ) V.

" alba, S. Amerika	— 50
" amoena, Vestindien	— 75

" aurantiaca rosea, S. Amerika	— 1 —
" coelestis, S. Amerika	— 75

" Liboniana, Brasilien	— 75
" nutans, S. Amerika	— 3 —

" pyramidalis	— 50
" versicolor, S. Amerika	— 75

" Viottiana, S. Amerika	— 75
Ananaslikta m. praktf. blmr. Pl. i halfrutten skogsjord m. hackad hvitmossa, eller fästas med messingtråd vid obarkade trädklossar med mossa kring rötterna. Förra värme och fuktighet.	

Biota, se Thuja bland Träd och buskar till trädgårdsanläggningar.

Blechnum, (Polypodiæ)

" boreale, Europa, T. F.	— 50
" lancifolium	— 1,50
" ramosum	— 1,50
" brasiliense, Brasilien, V.	— 5 —
" fraxineum, Columbien, V.	— 50
" gracile, Brasilien, V.	— 50
" latifolium, Caracas, V.	— 1 —
" occidentale, Vestindien, V.	— 50
" Patersonii, Nya Holland, T.	— 2 —
Ormbunkar. B. brasili. får stam; de öf- riga äro låga, passande till odling i s. k. terrarier.	

Bletia, (Orchidæ) V.

" hyacinthina, Kina	— 3 —
" verecunda, Vestindien	— 3 —
Pl. i halfrunda skogsjord, bl. med hac- kad hvitmossa.	

Bocconia, (Papaveraceæ) T. F.

" frutescens, S. Amerika	— 50
" japonica, Kina; Japan	— 50
Odlas hufvuds. för bladen. Användb. till bladgrupper på kalljord. Den sistn. ut- härdar vintern på en del ställen i södra och mellersta Sverige.	

Boehmeria, (Urticaceæ) V. B.

" argentea, Mexiko	— 1 —
" gigantea, Mexiko?	— 50
" macrophylla, Nepal	— 50

Bladväxter. Pl. i närlande, lös jord.

Bonapartia, (Asphodeloeæ) T.

" gracilis, Mexiko, mycket vackra och	
stora, starka praktexemplar	— 50 —
" mindre planter	— 5 —
" glauca, starka exemplar	— 10 à 15 —
" juncea (Agave geminiflora) Peru	— 2,50

Utmärkt praktf. dekorationsväxter. Plan- teras i kraftig löjfjord.

Brassia, (Orchidæ) V.

" maculata, Jamaica	— 5 —
" verrucosa, Guatemaala	— 5 —
Egendomliga, vackra blmr. Pl. i hackad hvitmossa eller fastb. på trädklossar med rötterna omlindade med mossa. Fordra fuktig och varm atmospher.	

Brexia, (Brexieæ) V.

" chrysophylla	— 1,50
Brugmansia, (Solanaceæ) T. B.	

" knightii, S. Amerika	— 1 —
suaveolens (Datura arborea) Mexiko	— 75

Länge kända växter m. långa, vita, trumpetform, vällukt. blmr. Pl. i närlande jord och vattnas sparsamt om vintern.

Brunia, (Bruniaceæ) T. B.

" lanuginosa (Berzelia) Godah.-udden . . .	— 50
Odlas för sin ovala, fina grönsv. Pl. i lätt lösf. & ljungjord; vattnas måttligt.	

Caladium, (Aroidæ) V.

" bicolor	— 1 —
" picturatum	— 1 —
" Chantinii	— 2,50
" cupreatum	— 2 —
" Enkeanum	— 2,50
" Haageanum	— 2 —
" hastatum	— 1 —

	Pr st., Rmt Rd. ö.
Caladium Houletii	1,50
" marmoratum	1--
" mirabile	2--
" Neumannii	2 --
" mymphaeolum	— 50
" pictum	1 --
" rubricaula	2 --
" rubrovenium	1,50
" Wallisii	2 --
" Whigtii	1 --
6 sorter efter vårt val, 6 rdr.	
Härtamma från tropiska Amerika, synnerligen fr. trakterna kring Amazonfloden.	
Rotknölarne liggia torra om vintern och ompl. i Mars eller April i kraftig löjfjord.	
Förda under växttiden värme, fiktig luft, rikl. vattn. och skydd mot solen. Utan sig för sina underbart färgade väckra blad.	
Se afbildningen, som framställer en gemensam typ för de fiesta arterna.	



Caladium.

Calathea, se Macrantha.

Calceolaria; Toffelblomster, (Serophula- riaceæ) T. B. F.	
" hybrida pr 12 st. 5 rdr	— 50
Expedieras blott under April & Maj.	
" floribunda, gula . . pr 12 st. 4 rdr	— 40
" Prince Albert, brunla, pr 12 st. 4 rdr	— 40
" salicifolia, Peru, gula, pr 12 st. 4 rdr	— 40
De trene sistn. sorterna tillhörde de vackraste gruppväxter. Trifvas båst på grupper, som är skyddade mot den starkaste solen. Fortpl. likt genom sticklingar.	

Calla, (Aroidæ) T. B.


" atropurpurea (Richardia africana) Afrika	1 --
" mindre exemplar	— 50
Bekant prydnadsv. Svaga ex. kunna om sommaren pl. på fritt land, då de morändels mot hösten bliiva krattiga och blombara. Inpl. i slutet af Sept. Förra kraftig jord och mycket vatten.	

Callistemon; Praktmössa, (Myrtaceæ) T.
" lanceolata, Nya Holland — 50

	Pr st., Rmt Rd. ö.
Callistemon lanceolata semperflorens (Me- trosideros).	— 50
" linearifolium, Nya Holland	— 50
" rigidus, Nya Holland	1 --
Prydl. träd eller buskar för kalla växthus, blma under sommaren. Planteras i lått ljungjord; vattnas måttligt.	
Callitris, (Cupressineæ) T.	
" cupressiformis (Frenela triquetra) Nya Holland	— 50
" quadrivalvis, (Thuja articul.) N. Afr. — 50	
Vackra träd. Plant. i ljung- & löjfjord; vattnas måttligt.	
Camellia, (Theaceæ) T. B.	
" japonica, Japan; Kina, utm. sorter i vackra exemplar med knoppar	3 --
" " store praktexemplar	— 25 à 100
Campionula; Klockblomster, (Campanu- laceæ) T. B.	
" Vidalii, Azoriska örane	— 50
Vackra, hvita, klockf., hängande blomr. Planteras i sandblandad driftbänkjord.	
Campioneuron, (Polypodiæ) V.	
" Phyllitis, Trop. Amerika	1 --
" caespitosum, Trop. Amerika	1 --
" nitidum, Trop. Amerika	1,50
Vackra, egendomliga ormbunkar.	
Canarina, (Campanulaceæ) T.	
" Campanula, Kanariöarne	75
Den knubblige rotén hyltar om vintern; hä- les då torr; om våren i driftbänkjord. Blommorna hängande, guld- eller orangef.	
Canna; Blomsterrör, (Cannaceæ) V. F. B.	
" discolor, Trinidad, pr 12 st. 4 rdr	— 40
En av de vackraste för fritt land till gr.	
25 sorter m. namn, efter vårt val 12 rdr.	
12 " med namn, efter vårt val 7 "	
6 " namn, efter vårt val 4 "	
100 st. div. sort, t bladgr. utan n. 15 "	
50 " sorter till gr. utan n. 10 "	
25 " " till gr. utan namn, 5 "	
12 " " bladgr. utan namn, 3 "	
Cannaarterna förtjona i hög grad blom- sterodlars uppmarksamhet. Använd, sär- sällt vackra bladgrupper på fritt land, som till dekorat. i växthus, boningar och på blomsterbord. Förra under växttiden rikl. vatten. Om hösten uppt. de på fritt land stående ex. och öfverv. på samma sätt som Dahlia. Större delen af de nya- re sorterna utm. sig både för vackra blad och blommor.	
Caraguata, (Bromeliaceæ) V.	
" ligulata, Jamaica	1,50
Behandlas som Billbergia.	
Carludovica, (Cyclanthæ) V.	
" atrovirens, Nya Granada	1,50
" humilis, Peru	2 --
" rotundifolia, Trop. Amerika	5 --
Dekorativa bladv. för varma växthus.	
Caryota; Brännpalm, (Palmeæ) V.	
" urens, Ostindien, starka ex.	10 --
Cassia; Senneträd, (Legum.-Cassieæ) T.	
" corymbosa, Buenos Ayres	— 50
" levigata, Nya Spanien	— 50
" Sophora, Egypten; Indien	— 50
Blirna vackra, gula. Pl. i löjf. & ljung- jord. Böra ofta beskäras.	

Pr st., Rmt Rd. ö.	
Castanea; <i>Kastanje</i> , (Amentaceæ) T.	
" chrysophylla, Kalifornien	1 —
Blifver ett af kallhusens prydligaste träd.	
Casuarina; <i>Kasuariträd</i> , (Coniferae)	
" equisetifolia, Öerne i Stilla havet	1 —
" quadrivalvis, Van Diemens Land	1 —
Egendoml., bladlösa träd med hårfrina grenor. Pl. i löf- & ljunagjord; vatten. mättl.	
Cattleya, (Orchideæ) V.	
" amethystina, St. Catharina	10 —
" crispa (Laelia) Brasilién	10 —
" Forbesii, Brasilien	5 —
Mossiea, La Guayra	15 —
Tropiska Orchidéer m. praktif. blmr. Odla s i fukt. varmhus; Pl. i mossa, eller fastbindas vid träkl., med rötterna inlinnade i mossa.	
Cedrus, se Träd och buskar till anlägggn.	
Centaurea; <i>Klint</i> , (Cynareæ) T. F.	
" candidissima pr 12 st, 6 rdr = 60	
" gymnocarpa pr 12 st, 5 rdr = 50	
Väckra, rent silfverhrita blad. Anv. till blad- och blomstergr. Pl. i löfjord; vattnas mättligt.	
Cereus, (Cactæ) V. B.	
" Bomplandii, Södra Amerika	1 —
" eriophorus, Cuba	1 —
" grandis, S. Amerika	1,50
" raridus, S. Amerika	1 —
" subrepandus, Karaiberna	1 —
" tortuosus, Buenos Ayres	1 —
" truncatus (Epiphyllum)	1,50
6 sorter efter vårt val, 5 rdr.	
Chamæstes, (Solanaceæ) V. T.	
" lanceolata, Nya Granada	1 —
Chamæcypris, se Thuipopsis.	

Pr st., Rmt Rd. ö.	
Chamaedorea, (Palmeæ) V. B.	
" Ahrembergii, Guatemala	5 —
" desmoneoides, Guatemala, unga	5 —
" elatior, Xalappa, stora	10 —
" elegans, Mexiko, unga, vackra	5 —
" Ernesti-Augusti; Guatemala, stora	15 —
" glaucifolia, Guatemala, starka	10 —
Nätta palmer, som kunna odlas i boningsrum. Pl. i löf- och driftbänkjord; vattnas riktigt särdeles under sommaren.	
Chamarops; <i>Dvergpalm</i> , (Palmeæ) V. B.	
" Fortuneii (exelsa) Kina, stora exempl. 50 —	
" " unga fröplantor	5 —
" humilis, S. Europa, Afrika; starka 45 —	
" mindre exemplar	10 à 25 —
" Palmetto Carolina, Florida,	10 —
Praktf. palmer med solfjäderlik blad. Pas. till odl. i boningsrum. Se avbildningen.	
Chamæpeuce, (Cichoraceæ) T. F.	
" cassebonae	50
Tistelartad, vacker växt, hväri rosettilkt sittande blad prydas med hyltaktaiga taggar. Planteras i löfjord.	
Charlwodia, se Cordyline & Dracena.	
Cheiranthus; <i>Gyllenlaek</i> , (Cruciferae) T. B.	
" Cheiri, Engl. Frankr. Spanien etc. — 40	
pr 12 st, 4 rdr.	
Starka, buskiga plantor, efter bästa sort frö; expederias från Oktober till April.	
Chlorophytum, (Asphodelæ) V. B.	
" Sternbergianum, Godahoppsudden. — 50	
Intressant ampelväxt; Planteras i löfjord.	
Chrysanthemum; <i>Prestkrage</i> , (Senecionideæ) T. B.	
" indicum, Kina, Japan, pr 12 st, 4 rdr — 40	
" " Sensation, m. vackra, hvitbr. blad — 50	



Chaerops Fortunei (exelsa.)

	Pr st., Rmt Rd. ö.	Pr st., Rmt Rd. ö.
Cibotium , (Polypodiæ)		Coffea ; <i>Kaffeträd</i> , (Rubiaceæ) V.
" glaucescens, Kina etc., V. T., starka 15 —		" arabica, Arabien; <i>Nubien</i> , unga pl. 2 —
" regale? V. T., starka 35 —		Colea , (Bignoniaceæ) V.
" Schideii, Mexiko, V., mycket starka 50 —		" floribunda, <i>Madagascar</i> 2 —
Praktf. ormb. ar jättelika dimensioner.		De gulhvita blommor framkomma ur stammen. Planteras i löjfjord.
Planteras i halfruttens skogsjord.		Coleus , (Labiatae) V. B.
Cineraria ; <i>Askört</i> , (Senecionideæ) T. B. F.		" 12 sorter med namn, 5 rdr 50
" candidissima . . . pr 12 st., rdr 1,50 — 15		De nyare varieteterna av detta växtsläkte utm. sig för bladens praktf. färger, varierande i alla nyanser från svartbrunt till hörgrödt, gult, violett o. s. v. De är mycket lätt att sköta och förökta. Trifivas särdeles väl i boningsrum. Om de på våren pl. i större krukor i god, kraftig jord, uppnå de under sommaren en betydlig storlek. Fordra sol.
" hybrida . . . pr 12 st., 4 rdr — 40		Colocasia , (Aroideæ) V.
" maritima . . . pr 12 st., rdr 1,50 — 15		" antiquorum (Arum) <i>Egypten</i> 1 —
Fröplantor efter bästa sort frö. Exped. blott från April till Juni. Prakt. till blad- & blomstergrupper. Den först- och sistn. hafva silfverhvita, vackra blad.		" cuprea, <i>Trop. Amer.</i> , kopparf. blad. 1,50
Cissus , (Ampellideæ)		" macrorrhiza, hvit med vackra blad 1 —
" antarcticus, Nya Holland, T. 1 —		" nymphæfolia, <i>Ostindien</i> 75
" argentea, Brasilien, V. 2,50		" odora 1 à 10 —
" discolor, Java, V. 1,50		Dekorativa växter m. antikt form. blad. Pl. i kraftig vegetabilisk jord; fordra om sommaren riklig vattning.
" elegans, T. 1,50		Coniogramma , (Polypodiæ) V.
" porphyrophyllus, Indien, V. 2,50		" javanica (Gymnogramma) Java 2 —
Rankväxter, hvilka, m. und. af den förstn. utm. sig för utm. brilljanta blad. Pl. i sandblandad löjfjord; vattnas måttligt.		Egendoml. ormb.; pl. i halfruttens skogsj.
Cistus ; <i>Cistusros</i> , (Cistineæ) T.		Conoclinium , (Eupatorineæ) V.
" candidissimus, Kanariörne 1 —		" (Hebeclina) atrorubens, Amerika 50
" ladaniferus, Södra Europa 1 —		" janthinum, St. Catharina 50
Stora, vackra, hvita blmr. Fordra sol. Pl. i god löf- & ljungjord; vattnas måttligt.		Båda hafva vackra, gredelna blommor. Planteras i löjfjord.
Clematis ; <i>Skogsrefva</i> , (Ranunculaceæ) T.		Conophallus , (Aroideæ) V.
" aristata, Nya Sydwales 1 —		" nivosus, <i>Hemland</i> ? 5 —
" lanuginosa Regina, Kina 2,50		" bulbiferus, <i>Hemland</i> ? 2,50
" microphylla, Nya Holland 1 —		Egendoml. växter; Vattnas ej om vintern. Omplanteras om våren i kraftig löjfjord.
Palasii 50		Convolvulus ; <i>Vinda</i> , (Convolvulaceæ) T.
Rankväxter m. vackra blmr. Pl. i löjfjord. se vidare; Träd och buskar till anl.		" eneorum, Spanien; Syrien 50
Clerodendron ; <i>Presträdd</i> , (Verbenaceæ)		" mauritanicum, Norra Afrika 50
" fragrans (Valkomeria jap.) Japan, V. B. 1 —		Den förstn. har hvita, den sistn. blå blmr. Planteras i löjfjord.
Clethra , (Ericaccæ-Andromedæ) T.		Corchorus, se Träd och buskar till anlägggn.
" arborea, Madeira 1, 2 à 10 —		Cordyline (<i>Dracæna</i>), (Asphodelæ)
" fol. var., med brokiga blad 2 —		" angustifolia (Dr. paniculata) T. B. 50
Vackra träd m. konvaljelika, vällukt. blmr. Pl. i ljungjord; vattnas måttl. om vintern.		" australis, Nya Zeeland, T. B., 1, 15 à 50 —
Chianthus ; <i>Praktvicka</i> , (Papilionaceæ) T.		" canneefolia, N. Holl., T. B., 2,50; 10 à 15 —
" puniceus, Nya Zealand 50		" congesta (Charlwodia) N. Holl., T. B. — 50
" magnificus, Nya Caledonien 75		" Cooperii, Kina, V. B., röda blad 1,50
Bekanta praktv. m. sköna skarakanr. blmr i rika klasar. Plant. i löf- & ljungjord.		" ferrea, Kina, V. B. blodröda blad 1,50
Clivia , (Amaryllideæ) V. B.		" grandis (Drac.) V. B., starka, 1,50 à 5 —
" miniata (Imatophyllum; Vallotta) Columbian, starka exemplar 5 —		" latifolia pendula, Moluckerna, V. B. 1,50
" nobilis, Columbian 1,50		" nutans, Australien, T. B. 3 —
Praktf. liljelika, röda blmr. Planteras i närrande, sandblandad jord.		" rubra, Australien, V. B. 1 —
Cobaea , (Bignoniaceæ) T.		" siamensis, V. B., vackra exempl., 1 à 5 —
" scandens 75		" superbiens (Dianella austral.; Dracænopsis superb.; Dracæna indivisa) T. B.
" penduliflora, Mexiko? 5 —		starka, utmärkta exemplar 10 à 50 —
Den förstn. är en bekant slingerv. den senare en ny sort med egendomliga blmr. Planteras i löjfjord.		" terminalis, Moluckerna, V. B. 1,50 —
Cocos ; <i>Kokospalm</i> , (Palmeæ) V.		" Veitchii (aurea linata) T. B., pryd. 5 —
" botryophora (Syagrus) <i>Trop. Amer.</i> . 15 —		Höra till växthusens förnämsta dekorationsv. Pl. i kraftig jordmän och vattnas måttl. om vintern. De rödbl. sorterar är ömtäliga för dropp. De m. T.B. beteckn. kunna om som. utställas på lugna platser i det fria. De övriga odlas bäst i varm drifkast.
" plumosa, <i>Tropiska Amerika</i> 15 —		
Ståtliga, sköna palmer.		
Codiaeum , se Croton.		
Coelia , (Orchideæ) V.		
" Baueriana, Jamaica; pl. i mossa 3 —		

Pr st., Rmt Rd. ö.

Coronilla; <i>Koronill,</i> (Papilionaceæ) T.	
” <i>glaucia,</i> S. Europa	— 50
” ” <i>fol. var.</i> med brokiga blad	— 75
Gula Blommor. Planteras i löfjord.	
Correa; (<i>Rutaceæ</i>) T.	
” <i>alba, Nya Holland</i>	— 50
” <i>cardinalis, Nya Holland</i>	1,50
Den första har hvita, den senare gulröda, cylinderform. blmr. Planteras i löfjord.	
Corypha; <i>Solfjäderpalm,</i> (Palmeæ) V.	
” <i>australis, Nya Holland,</i> starka	15 —
Låter med lätthet odlas sig i boningsrum; har vackra, solfjäderl. blad. Pl. i kraftig, ej för lät jord. Fordrar rikl. men ej öf- verflödig fuktighet.	
Crassula, (Crassulaceæ) T. B.	
” <i>coccinea, Godah.-udden,</i> pr 12 st., 5 rdr —	50
” <i>falcata (Rochea) Godahoppsudden</i>	1,50
” <i>odorata, Godahoppsudden</i>	— 50
Plant. i god löfjord i ej för stora krukor. Vattnas sparsamt synnerligen om vintern.	
Crescentia; <i>Kalabasträd,</i> (Solanaceæ) V.	
” <i>Cujete, Vestindien</i>	1,50
Planteras i löfjord; vattnas mäktigt.	
Crinum; (<i>Amaryllidæ</i>) V. B.	
” <i>americanum, S. Amerika</i>	3 —
” <i>australe, Port Jackson</i>	2,50 à 25 —
” <i>capense (Amaryll. longif.) Godah.-udd.</i> 3 —	
Nära beslägt. med Amaryllis; utm. sig för Nära hvita, vällukt. blmr och uppnå be- tyd. dimensioner. Plant i kraftig löf- & drift.-jord; vattn. spars. under hylotiden.	
Croton; <i>Kräfbuske,</i> (Euphorbiaceæ) V.	
” <i>pictum superbum, Ostindien</i>	1,50
” <i>irregulare, Ostindien?</i>	3 —
Båda utm. för vackra, gulfäckiga blad, Planteras i sandbanor löfjord.	
Cryptomeria, se Träd & buskar till anläggan.	
Cupressus; <i>Cypress,</i> (Cupressinæ) T. B.	
” <i>fastigiata (sempervir.) Grekl., Asien;</i> 2 fot höga exempl., pr 12 st., 10 rdr 1 —	
” <i>stricta elegans</i>	— 75
” <i>funebris (pendula) Tatariet</i>	— 75
” <i>glaucia pendula, Ostindien</i>	— 75
” <i>horizontalis (Tournefortii) Creta, Persi- en;</i> 2 fot höga exempl., pr 12 st., 10 rdr 1 —	
” <i>majestica, unga plantor</i>	1 —
” <i>torullosa, Nepal</i>	— 50
” <i>Lawsonii,</i> se Träd & buskar till anl. Alla dessa Cypresser härst till kallhusens förn. dekorationsv. Af den äkta Cypressen (<i>C. fastigiata</i> & horiz.) finnas mycket stora ex. hvarå pris meddelas på begär.	
Curculigo; <i>Snabellila,</i> (Hypoxidæ) V. B.	
” <i>recurvata, Java</i>	50 öre, 1 à 2 —
Praktig dekorationsv. m. långa, breda, vacker veckade blad. Plant. i löfjord.	
Cureuma, (Scitamineæ) V.	
” <i>Roscoœana, Ostindien</i>	2 —
Vackra blad; egendoml. praktif. blmr. Pl. i löfjord; bör under hylotiden ej vattnas.	
Cycas; <i>Sagopalm,</i> (Cycadæ) V. B.	
” <i>circinalis, Ostindien</i>	10 —
” <i>revoluta, Ostindien</i>	5 à 25 —
Praktfulla dekorationsväxter.	
Cyclamen; <i>Jordbröd,</i> (Primulaceæ) T. B.	
” <i>Coum, S. Europa, Taurien</i>	1 —
” <i>europæum, S. Europa</i>	— 75

Pr st., Rmt Rd. ö.

Cyclamen <i>macrophyllum, S. Eur., N. Afr.</i> 1 —	
” <i>persicum, Persien, Grekl., Cypern</i>	— 75
Särdeles nätt, röda eller hvita blommor. Planteras i löfjord.	
Cyperus; <i>Cypergräs; Pappersväxt; Pap- persgräs,</i> (Cyperaceæ) V.	
” <i>alternifolius, Madagascar</i>	— 50
” <i>Papyrus (Papyr. antiquor.) Egypten</i> 2,50	
Dekorativt halvgräs; Pl. i löfjord; förra riklig växning, synnerligen om sommaren.	
Cypripedium; <i>Venusko,</i> (Orchideæ) V.	
” <i>barbatum, Malacka</i>	3 —
” <i>insigne, Nepal, vackra</i>	3 à 10 —
” <i>venustum, Nepal</i>	3 —
Intréssanta blmr. Plant. i mossa och god torfjord.	
Cyrtomium, (Polypodiæ) T.	
” <i>falcatum, Japan, Kina</i>	2 —
” <i>Fortunei, Japan</i>	1 —
Utm. praktif. ormbunkar. Kunna om som- maren utpl. på skuggiga platser å kalljord.	
Cystopteris, (Polypodiæ) T.	
” <i>fragilis var. obtusa</i>	1,50
Ormbunkar; kan om som. utplanteras.	
Cytisus; <i>Gullregn, Bönträd,</i> (Papilio- naceæ) T. B.	
” <i>attleyanus, Hemland?</i>	— 50
” <i>candicans, Candia?</i>	1 —
” <i>racemosus, Hemland?</i>	— 50
Fint, vacker löfwerk, prydl., gula, vällukt. blmr under större delen af året. Plant. i löf- & löngjord, vattnas mäktigt.	
Demonorrhops, (Palmeæ) V.	
” <i>melanochætes microcarpus, Java</i>	15 —
Vacker och sällsynt palm.	
Datura, se Brugmansia.	
Davallia, (Polypodiæ)	
” <i>alpina, Hemland? T. F.</i>	1 —
” <i>hemipætra, Trop. Amerika, V.</i>	5 —
” <i>tenuifolia var. cristata, Vestind., V.</i> 3 —	
Vackra, sällsynta ormbunkar.	
Dendrobium, (Orchideæ) V.	
” <i>speciosum, Nya Holland,</i> starka	10 —
Gula blmr i rika klasar. Plant. i mossa.	
Desmoncus; <i>Bandpalm,</i> (Palmeæ) V.	
” <i>major, Trop. Amerika</i>	10 —
Sällsynt och, såsom utbild, vacker palm.	
Deutzia, se Träd och buskar till anläggan.	
Dianella, (Asphodelæ) T.	
” <i>longifolia, Nya Holland</i>	— 50
” <i>australensis, se Cordyline superbiens.</i>	
Didymocarpus, se Streptocarpus.	
Didymochlæna, (Polypodiæ) V.	
” <i>lunulata, Trop. Amerika,</i> starka	15 —
Stätfig, storväxt, sällsynt ormbunk.	
Diffenbachia, (Aroidæ) V.	
” <i>Baraquinii, Trop. Amerika</i>	1 —
” <i>conspurcata, Trop. Amerika, ny</i>	5 —
” <i>grandis, Trop. Amerika</i>	1 —
” <i>Seguina, Vestindien</i>	— 50
” <i>Weiri, Tr. Am., ny m. fl. blad, utm.</i> 5 —	
Utm. sig endast för vackra blad. Pl. närande löfjord; hållas varmt & fuktigt.	
Dion, (Cycadæ) V. T.	
” <i>edule, Mexiko</i>	10 —
13	

<p style="text-align: right;">Pr st., Rmt Rd. ö.</p> <p>Utm. prydnadsv. för temp. has. I Mexiko ätes dess frukter, hyvaraf beredes ett hel- sosamt, välsmakande mjölk.</p> <p>Diosma, (Diosmeæ) T.</p> <ul style="list-style-type: none"> " alba, Godahoppsudden 50 " fl. sort., se Adenandra & Agathosma. Buske m. små hyvita blom & vackert löf- verk, passande till bukettförnt. <p>Diplacus, (Scrophulariaceæ) T. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> " glutinosus, Kalifornien 50 " atropurpureus 50 " Godronii 50 " Ingelrestii 50 " Verschaffeltii 50 Tackslant blom., för boningsr. lämpli väx- ter. Pl. i löjfjord; vattnas måttl., särde- les vinterdelen. <p>Diplazium, (Polypodieæ) V.</p> <ul style="list-style-type: none"> Shefferdii, Antillerna 1,50 sylvaticum, Java 50 Vackra ormbunkar. <p>Dircea, (Gesneriacæ) V.</p> <ul style="list-style-type: none"> " bulbosa (Gesneria) Brasilien 50 " cardinalis (Gesn.) Mell. Amerika . . . 1 — Rotknölarna ligga torra om vintern; ompl. om våren i frisk, god löjfjord och ställas varmt. Behandlas eljest som Gesneria. <p>Disandra, (Schrophularineæ) T.</p> <ul style="list-style-type: none"> " prostrata, Orienten 50 Passande till amplar; små, gula blmr. Pl. i löjfjord. <p>Disemma, (Passifloræ) T.</p> <ul style="list-style-type: none"> " aurantiaca (Passiflora) Nya Kaledon. 1 — " coccinea, Nya Holland 75 Slingerv. m. egend. bildade blmr. Plan- teras i löjfjord; vattnas måttligt. <p>Dodecatheon; Gudsgröße, Gudsblomster, (Primulaceæ) T. F.</p> <ul style="list-style-type: none"> " Jeffreyanum, N. Amerika? 1,50 andra, se fleråriga blomsterväxter. Fleråriga växter m. näpta, hvita eller ljus- röda blmr. Pl. i löjfjord; kuuna under be- täckning odlas på kalljord. <p>Doodia, (Polypodieæ) T. F.</p> <ul style="list-style-type: none"> " aspera, Nya Holland 50 " caudata, Nya Holland 1 — " lunulata, Nya Holland 50 " rupestris, Nya Holland 50 Smånätta ormbunkar; passa till plante- ringar i terranier. <p>Doryopteris, (Polypodieæ) V.</p> <ul style="list-style-type: none"> " geraniefolia, Vestindien 75 " nobilis, Vestindien 2,50 " pedata, Brasilien 1 — Ormbunkar m. vackra, egendomliga blad. <p>Dracæna; Drakblodsträd, (Asphodelæ) V. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> " arborea (Aletris) Afrika 1 — " brasiliensis, Brasilien 1, 5 à 10 — " Draco, Åkta Drakblod, Ostindien, efter exemplarens storlek . 1,50; 15; 25 à 50 — " fragrans, Guiana 1 — " Haageana, ny 5 — " limbata, Hemland? 1,50 " nigra, ny, sällsynt, unga plantor . 10 — " robusta, Trop. Amerika . . . 1,50 à 5 — " Regina, ny, sällsynt, unga plantor . 15 — " Rhumphii, Java, starka exemplar . 10 — 	<p style="text-align: right;">Pr st., Rmt Rd. ö.</p> <p>Dracæna umbraculifera, Mauritius, starka 20 — andra sorter, se Cordyline.</p> <p>Liksom Cordyline är även Dracæna bland de varma växthusens skönaste prydnadsv. De fiesta arterna låta odla sig i bonings- rum. Behandlas som Cordyline.</p> <p>Durantha, (Verbenaceæ) V.</p> <ul style="list-style-type: none"> Plumieriæ. Vestindien 1 — <p>Dyckia, (Bromeliaceæ) V.</p> <ul style="list-style-type: none"> " remotiflora, Brasilien 1,50 Behandlas som Billbergia. <p>Echeveria, (Crassulaceæ) T.</p> <ul style="list-style-type: none"> " metallica, Mexiko? 5 — " pumila, Mexiko, pr 12 st., rdr 2,50 — 25 " secunda, Mexiko, pr 12 st., 3 rdr — 30 Smånätta, rosettlikväxter med vackra blmr. Begagnas till infatn. af smågrupper, till planteringar på bergpartier etc. <p>Echinocactus & Echinopsis; Igel- kaktus, (Cactæ) V. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> Decaisneana, Brasilien 1 — " mammulosus, Brasilien 1 — " multiplex, Brasilien 1 — " oxygona, Brasilien 1 — " Schellhazii, Brasilien 1 — " tubiflora, Brasilien 1 — " turbinata, Brasilien 1 — Pl. i med grof sand rikligt bland. löjfjord; vattnas om vintern foga eller intet. <p>Echites, (Apocynæ) V.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaleuca, Trop. Amerika 1,50 Nägot slingr. m. mörkröna, hvidträdrade blad. Plant. i löjfjord; vattnas måttligt. <p>Edwardsia, (Papilionaceæ) T.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mac Nabiana, Australien 1,50 Fint löfverk; vackra, gula blmr. Pl. i ljung- & löjfjord; vattnas måttligt. <p>Elaphoglossum, (Polypodieæ) V.</p> <ul style="list-style-type: none"> " callaeolum (Acrostichum) Java 75 " melanopus (Acrostich.) Tr. Amerika 1 — Egend. ormbunkar m. breda, läderakt. blad. <p>Entelea, (Tiliaceæ) T. F.</p> <ul style="list-style-type: none"> arborescens, Nya Zealand 50 — Anv. om som i bladgrupper. Även vac- ker till dekor. inomhus. Pl. i kraftig löfj. <p>Epacris, (Epacridæ) T.</p> <ul style="list-style-type: none"> " flera vackra sorter, starka exemplar. 1,50 " mycket stora praktexemplar . 25 à 30 — Hafva talr., vackra, röda eller hvita ey- linderform, blmr. Plant. i god ljungjord; vattnas alltid försiktig. Fordra om vin- tern så mycket ljus och frisk luft, som möjligt. <p>Epidendron, (Orchidæ) V.</p> <ul style="list-style-type: none"> " biflorum, Vestindien 3 — " ciliare, Vestindien 3 — " cochleatum, Vestindien 3 — " radiatum, Brasilien 3 — " tuberculatum, Brasilien 2,50 Trifvas bilst om de, m. rötterna inlinnade i mossa, fastb. vid trädlossar. Fordra varm och fuktig atmosphær. <p>Epiphyllum truncatum, se Cereus.</p> <p>Episcia, (Gesneriacæ) V.</p> <ul style="list-style-type: none"> " nægelioides, Brasilien 50 Behandlas som Achimenes & Gesneria. <p>Eranthemum, (Acanthaceæ) V.</p> <ul style="list-style-type: none"> " sanguinolentum, Madagascar 1 —
---	--

Pr st., Rmt Rd ö.

Eranthemum tuberculatum, Trop. Amer. — 75
Den första utm. för sina blad, den senare
för sina blmr. Planteras i löjfjord.

Erica; Ijung, (Ericaceæ) T.

" arborea, S. Europa	50 öre à 2,50
" australis, S. Europa	1,50
" blanda, Godahoppsudden	— 75
" Boviei, Godahoppsudden	1,50
" concinna, Godahoppsudden	1 —
" conferta, Godahoppsudden	1 —
" cruenta, Godahoppsudden	1,50
" gracilis, Godahoppsudden	1,25
" imbricata, Godahoppsudden	1 —
" mediterranea, S. Europa	50 öre à 2,50
" mammosa, Godahoppsudden	1,50
" paniculata, Godahoppsudden	1 —
" persoluta alba, Godahoppsudden . . .	1 —
" stricta, Korsika	— 75
" transparent, Godahoppsudden	1,50

Utom dessa finnes flera andra sorter,
och lemnas då urvalet af sorterna
öfverlätes å oss:

25 sorter Erica med namn, 20 rdr.

12 " Erica med namn . . 12 "

Pl. i ren, god ljungjord; böra om vintern
stå just & luftigt och vattnas försiktig.

Erythrina; Korallträdet, (Papilionaceæ)

" caffra, S. Afrika, V.	1,50
" corallodendron, Antillerna, V.	2,50
" crista galli, Brasilien, V. T. F.	1,50
" galli, stora praktexemplar, 5, 10 à 15 —	
" laurifolia, Vestindien, V. T.	2,50
" speciosa, Vestindien, V.	2,50
" viarum, Hemland? V.	2 —

Alla sorterna utm. sig gen. stora, i rika
klasar sittande blmr. Pl. i kraftig löf- &
drifbänkjord. De sorter, som under vinter-
torn falla bladen böra, till dess de åter börja
vegetera, vattnas föga eller intet. E. crista
galli, kan, såsom tecknen antyda, under
sommaren äfven plant. på ett varmt skyd-
dadt ställe å kalljord.

Eucalyptus; Praktmössa, (Myrtaceæ) T.

" diversicolor, Nya Holland	— 50
" globulus, Nya Holland	— 50
" robustus, Nya Holland	1 —
" viminalis, Nya Holland	— 50

Höra till verldens största träd och blifva
betydlig stora äfven i växthus. Pl. i löf- &
ljungjord; böra ej beskåras. E. globulus,
som finnes afbildad i fröföreteckn., pag. 28,
är af god effekt i bladgrupper.

Eucharis, (Amaryllidæ) V.

" amazonica, Trakten vid Amazonfl. . . .	1,50
Praktf. hvita, lijeleka blmr. Pl. i löjfjord.	

Eugenia, (Myrtaceæ) T. B.

" australis (Jambosa; Myrtus) N. Hol- land, vackra ex., efter storlek, 1,5 à 10 —	
" Ugnii, Chili	— 75

Eupatorium; Flockblomster, (Eupato-
riaceæ) T. B.

" omphaliaefolium? Mexiko	— 50
Hvita, välukt blmr i Oktob. & November Planteras i kraftig lerjord.	

Euphorbia; Värmjölk, (Euphorbiaceæ) V.

" splendens, Madagascar	1 —
-----------------------------------	-----

Pr st., Rmt Rd ö.

Taggig, nästan bladlös växt med vackra,
högröda blmr under större delen af året.

Pl. i löjfjord; vattn. spars. om vintern.

Pr st., Rmt Rd ö.

Taggig, nästan bladlös växt med vackra,
högröda blmr under större delen af året.

Pl. i löjfjord; vattn. spars. om vintern.

Eonymus; Benved; Spindelträdd,
(Rhamnæe) T.

" japonicus, Japan	— 50
" " fol. arg. var.	— 50
" " lateis var.	1 —
" radicans fol. arg. var., pr 12 st, 5 rdr —	50
" fol. arg. & roseis pictus	— 50

E. japon. är en härdig dekorationsv. för

kalla växthus; E. radic. kan fördelat. anv.

till infanta. af grupper. Pl. i löf- & gräs-

torfjord.

Fabiana, (Solanaceæ) T.

" imbricata, Chili	— 50
Fin grönka, talr., hvita, cylinderf. blmr. Planteras i löjfjord.	

Fabricia, (Myrtaceæ) T. F.

" laevigata, Nya Holland	5 öre à 1 —
Vacket bukettrönt. Pl. i löf- & ljungjord.	

Fadyenia, (Polypodiæ) V.

" proliera, Jamaika	2,50
Högst egendomlig ormbunke.	

Farfugium, (Senecionideæ) T. F.

" grande, N. Kina	50 öre, 2 à 10 —
Mörkröna, gulfl. blad. Pl. i kraftig drif- bänkjord; fordrar skugga & fuktighet.	

Ferdinanda, (Senecionideæ) T. F.

" eminens, Mexiko	— 75
Praktig bladv. m. stora ljusgröna, välukt. blad. Pl. i kraftig jord, vattn. rikl. Ut- markt i bladgrupper.	

Ferraria; Tigerlilja, (Irideæ) T. F.

" tigrida, Mexiko, pr 12 st, rdr 2,50 —	25
Mycket egendoml. prakt. blmr. Pl. om vä- ren i kruckor, sedan på kalljord, upp. om hösten och öfverv. i torr sand.	

Ficus, Filkonträdd, (Urticaceæ)

" carica, vanlig; S. Europa, Asien, T.,	
stora, fruktbarande exemplar.	2,50

" Cooperii, V. B.	1 —
" elasticia, Gummiträd, Ostindien	2,50

" Porteana, V. B.	2,50
" rubiginosa (religiosa) N. Holland, V.	1 —

" stipularis, Kina, Japan, V.	— 50
" Suringari, ny	5 —

Utm. sig för stora vackra blad. Härifrån

gör dock F. stipul. ett undant. endr dess

blad äro små, men är för öfr. en af de ba-

sta växter till beklädn. af fula väggar etc.

i fuktiga varmhusr.

Fittonia, (Acanthaceæ) V.

" argyrea, Brasilien	1 —
" gigantea, Brasilien	2 —

" Verschaffeltii	1 —
Bladen genomväfsda af röda eller hvitvådror. Fässer till planteringar i s. k. terrarier.	

Foucroya, (Asphodelæ) T.

" gigantea, S. Amerika, stora, starka 10 —	
" rigida, S. Amerika	1,50 à 5 —

Agavelika, prakt. dekorationsv. Pl. i med

grof sand bl. löf & drifbänkjord. Vattn.

försiktigigt om vintern. Se afbildningen i

fröföreteckningen, pag. 29.

Frenela, se Callitris.

Freycinetia, (Pandanæ) T. V.

" Bauerniana? Norfolk	6 —
Passande till stora ampler.	

	Pr st., Rmt Rd. ö.	Pr st., Rmt Rd. ö.
Fuchsia; <i>Bloddroppe, (Onagraceæ) T. B. F.</i>		
„ <i>corymbiflora, Anderna i Peru</i>	— 50	Slingerv. m. stora vackra blmr och köttiga rotknölar, hvilka vid ompl. ej böra särás emedan de derigenom lät ruttna. Ligga torra om vintern; ompl. om våren i god, kraftig löf- & driftbänkjörd, i väl dränerade, ej för små krukor.
„ <i>f. alba</i>	1 —	
„ <i>fol. var. med brokiga blad</i>	1 —	
„ <i>fulgens, Mexiko</i>	— 50	Gloxinia, (Gesneriaceæ) V.
„ <i>gracilis, Mexiko</i>	— 50	„ nya, storbl., praktf. varieteter i rum- mel, med uppstående & lutande blmr — 75
„ <i>globosa, fol. var. med brokiga blad</i> — 75		pr 12 st., rdr 7,50
„ <i>hybrida, stamform.</i> , 50 öre; 2, 3 à 10 —		„ yngre rotknölar af samma sorter . . . — 40
„ <i>till amplar</i> 1; 5 à 10 —		pr 12 st., 4 rdr.
„ <i>microphylla, Mexiko</i>	— 50	Utm. praktf. blmr i alla nyanser af hvitt och rödt, blått och violet. Rotknölarne ligga torra om vintern; ompl. om våren i god löfjörd. Böra under växttiden stå nära glaset, men skyddas mot solen. Ömfälliga för tvärdrag och blixta vackrast i ett växthus med varm, fuktig luft.
„ <i>Pillar of Gold, med brokiga blad</i> . . . — 50		
„ <i>pumila</i> pr 12 st., 5 rdr — 50		
„ <i>serratifolia, Peru</i>	— 50	
25 sort. Fuchsia hybr. m. namn, rdr 10 —		
12 „ Fuchsia hybr. med namn „ 5,50		
6 „ „ hybrida med namn „ 3 —		
Vår samling af Fuchsia består af omkr. 150 de bästa nyare och äldre varieteter. F. pu-mila är småblomm. lägv., rikblomning, utm. vacker till grupper. F. serratif. blommor om hösten och en god del af vintern. Lättta att odla.		
Gazania, (Cynareae) T.		Gnidia, (Thymelæe) T.
„ <i>splendens, Godahoppsudden</i> — 25		„ <i>sericea, Godahoppsudden</i> 1 —
pr 12 st., rdr 2,50.		Gröngrula blmr om våren. Pl. i löf- & ljungj.
Låg, präktig gruppv. m. stora, gula blmr, som dock blott åro öppna då solen skiner.		Gonathanthus, (Aroeidae) V.
Genista; Ginstbuske, (Papilionaceæ) T.		„ <i>sarmentosus, Himalaya</i> — 50
„ <i>prostrata, Frankrike, Spanien</i> 1 —		Torrta om vintern; ompl. om våren i löfj.
Kan avven odias på kalljord. Har gula blmr; vacker till amplar. Pl. i löfjörd.		Goniophlebium, (Polypodiæ) V.
Geonomia; Jordpalm, Palmæe) V.		„ <i>appendiculatum, Trop. Amerika</i> . . . 1,50
„ <i>fenestrata, Trop. Amerika, unga</i> . . . 10 —		Vacker ormb. Pl. i halfrutten skogsjörd.
„ <i>sarapiquensis, Trop. Amerika, unga</i> 10 —		
„ <i>spicigera, Brasilien, unga exemplar</i> 10 —		Goodia, (Loteæ) T.
Georgina; Georgi, Dahlia, (Asteroideæ)		„ <i>lotifolia, Nya Holland</i> 1 —
„ <i>imperialis, Mexiko, T. F.</i> 1 —		Talrika, gula blmr. Planteras i ljungjörd.
Denna georginsort har hvita, klockform., enkelta blmr, hvilka dock sällan utvecklas hos oss. Den blommor särskräst om man på våren gör stickningar; ompl. dessa under löppet af som. i allt större krukor och inflyttar den mot hösten, i ett varmhus, der de hela vintern få vegetera. I Juni kunna de upph. på kalljord. Behandlad som de vanliga dahlialerna, blirver den en utmärkt vacker bladväxt.		Goodiera, (Orchidæ) T.
Geranium; Storknäbb, (Geraniaceæ) T.		„ <i>repens, S. Europa, N. Amerika</i> . . . 1,50
„ <i>anemonifolium, Madeira</i> 1 —		Pl. i grof torrfjörd och hackad hvitmossa.
„ <i>canariense, Kanariöarna</i> 1 —		
Vackra dekorationsv. m. carmosinr. blmr. Planteras i löfjörd.		Grevillea, (Proteaceæ) T.
Gesneria, (Gesneriaceæ) V.		„ <i>pyramidata</i> 1 —
„ <i>Bethmannii (hybrid)</i> 1 —		„ <i>robusta, Godahoppsudden</i> 1 —
„ <i>splendens, Brasilien</i> 1 —		Träd m. utm. vackert löfverk. Pl. i ljung-jörd; vattn. försiktig, särdeles om vintern.
„ <i>tuberosa, Brasilien</i> 1 —		
„ <i>andra sorter, se Diræa & Næglelia; behandl. som Achimenes eller Diræa.</i>		Grifflinia, (Amaryllidæ) V.
Geum; Neglikrot, (Rosaceæ) T. F.		„ <i>Blumenavia, Brasilien</i> 5 —
„ <i>chiloense, Chili</i> 50		Praktf. lökväxt. Pl. i god löfjörd; vattnas ej under hvilotionen.
„ <i>coccineum, Mindre Asien</i> 50		
Båda hafta vackra skarrika blmr. Pl. i löfjörd; kunne användas till rabatter.		Gunnera, (Urticaceæ) T. F.
Gladiolus, se fleråriga blomsterväxter.		„ <i>scabra, Chili</i> 2,50
Gloriosa; Praktlilia, (Liliacæ) V.		Bladv. af kollossala dimensioner. Under omsorgsfull betäckn. täl. den vintern ute i södra och mell. Sverige. Pt. eljest i stora korgar, som under som. nedrävfas i jorden och öfver. I celdadt boningserum eller torrt källare.
„ <i>superba, Malabar</i> 2 —		Gymnogramma, (Polypodiæ) V.
„ <i>virescens, Senegambien</i> 2 —		„ <i>chrysophylla, Vestindien</i> 1,50
		„ <i>davallioides (hybrid?)</i> 2 —
		„ <i>Laucheana (hybrid)</i> 1,50
		„ <i>l'Herminierii, Guadelope</i> 1,50
		„ <i>Martensi (hybrid)</i> 75
		„ <i>tatarica, Södra Amerika</i> 50
		Praktf. ormbunkar, hvars blad på under-sidan åro betäckta af ett tjockt guldgult eller silfverhvita ludd.
		Gymnostachya, se Fittonia.
		Gynniemium; Pampas- eller Prairiegräs, (Gramineæ) T. F.
		„ <i>argenteum, Chili m. fl.</i> , pr 12 st., 10 rdr 1 —
		Stål. gräs m. silfverhvita, 5 à 6 fot långa blomvippor. Utm. till bladgrupper och de-korationer, såväl inne som ute. Uthårdar, under omsorgsfull betäckn, vintern på kallj.

Pr st., Rmt Rd. ö.

Hæmanthus; *Blodlilja*, (Amaryllidæ)

" albiflos, Godahoppsudden, T.	1 —
" coccineus, Godahoppsudden, T.	2 —
" natalensis, Natal, V.	5 —
" puniceus, Godahoppsudden, T.	1,50
Praktf. liljeväxter m. blodröda (den förstn. hvita) blmr. Pl. i kraftig löf- & driftbänk-jord; vattnas ej under hylotiden.	

Hakea, (Proteaceæ) T.

" saligna, Nya Holland	1 —
Planteras i ljungjord; vattn. måttligt om vintern; ljus och frisk luft.	

Hardenbergia, (Papilionaceæ) T.

" Comptoniana, Nya Holland	1 —
" monophylla, Nya Holland	1 —

Något slingr. prydnadsv. m. vackra blmr.

Planteras i ljusjord.

Hebeclinium, se Conoclinium.**Hedera,** se Träd och buskar till anlägggn.**Hedychium;** *Kransblomster*, (Scitamineæ)

" coronarium, Ostindien, V. B.	— 75
" Gardnerianum, Ostindien, V. B.	1 —

Vackra dekorationsv. m. praktf. gulröda, starkt vällukt. blmr. Pl. i löf- & driftbänk.

Hedysarum; *Tuppufvud*, (Leguminosæ)

" coronarium, Södra Europa, T. F. 25
" fl. albo	— 25

De knöldlika rötterna överb. torra frost-fritt. Utplanteras om våren i god jord.

Heliconia, (Musaceæ) V.

" aurantiaca, Mexiko	1 —
Dekorationsv. m. vackra blmr. Pl. i löfj.	

Heliotropium; *Heliotrop*, (Verbenaceæ)

" peruvianum, Chili, Peru, T. B. F. 50
" diverse storblom. sorter till grupper	— 40

pr 12 st., 4 rdr.

Starkt vaniljliktande, allm. omt. blmr såväl till odl. i boningsr., som till grupper på fritt land. Fordra på kalljord varma, sötliga platser och lös, fet jordmån.

Hemerocallis, se fleråriga blomsterväxter.**Hepatica;** *Anemon*; *Sippa*; *Blåsippa*, (Ranunculaceæ) T. F.

" angulosa, Ungern	1,25
Sällsynt, liknande vär blåsippa, men till alla delar större. Kan odias på fritt land.	

Hibiscus; *Ibisblomster*, (Malvaceæ) V.

" Cooperii, Australien	1 —
" rosa sinensis, Ostindien, Kina	1 —

Den förstn. har vackra blad, marm. i röd och hvit samt höggröda blmr. Den senare stora skarlakanr. blmr. Plant. i löfjord.

Hippeastrum, se Amaryllis.**Hoja;** *Porslinsblomster*, (Asclepiadæ) V.

" bella, Java	1 —
" carnosia, Ostindien	1 —

Slingerv. m. utm. vackra, vällukt. blmr. Pl. i lucker, sandb. jord; vattnas sparsamt om vintern.

Hoteia, se *Spiraea* jap., flerår., blomsterv.**Hydrangea,** se Träd och buskar till park- och trädgårdsanläggningar.**Hyophorbe,** (Palmeæ) V. B.

" indica (Areca lutescens) Bourbon;	
" Mauritius, unga exemplar	5 —

Mycket vacker palm. Pl. i löf- & gräs-torfjord; fordrar mycket vatten.

Pr st., Rmt Rd. ö.

Ilex, se Träd och buskar till anlägggn.

Imatophyllum, se Clivia.**Iris;** *Svärdsilja*, (Irideæ) T. F.

" cristata, Carolina	— 50
" foetida fol. var.	— 75

" persica, Mindre Asien

" Susiana; Enkan i sorg; Mindre Asien

" tuberosa, S. Europa

Utm. vackra, intressanta blmr. Pl. i kraftig löfjord. De sorter som under vintern fälla bladen, börda då ej vattnas.

Isolepis. (Cyperaceæ) V. B.

" tenuissimus, Ostindien	— 50
Fint, vackert halvgräs, passande till am- plar o. s. v. Fordrar värme & fuktighet.	

Ixia, (Irideæ) T. B.

" flera sorter i rummel	— 25
Lökärne vattnas ej under hylotiden.	

Jambosa, se Eugenia.**Jasminum,** *Jasmin*, (Jasminæ) V.

" Zambae, Arabien, Ostindien	1 —
Hvita, starkt vällukt. blmr. Pl. i löfjord.	

Jatropha; *Kråknöt*, (Euphorbiaceæ) V.

" multifida, S. Amerika	1,50
Vackra, findelta blad. Planteras i löfjord.	

Juniperus; *En*, (Cupressinæ) T.

" sphærica (Fortunei) Kina, stora ex.	6 —
Kalmia, se Träd och buskar till anlägggn.	

Kennedyra, se Hardenbergia.**Keria,** se Corchorus; Träd och buskar etc.**Koniga,** (Crucifereæ) T. F.

" variegata (Alyssum) pr 12 st., 3 rdr	— 30
Hvitbrok. blad. Utm. till inf. af blom- stergrupper. Fortpl. lätt gen. sticklingar.	

Kunzea, (Myrtaceæ) T.

" leptospermoides, Nya Holland	— 50
Fint bladverk, passande till buketter; hvita blommor. Planteras i ljungjord.	

Laelia, (Orchideæ) V.

" acuminata, Mexiko	6 —
" purpurata, Brasilien	10 —

" superbiens, Guatemala	6 —
Mycket praktf. blmr. Pl. i mossa eller fastb. i mossa på trädklossar. Hällas varmt, fuktigt och skyddas mot solen.	

Lamprocoecus, se Achmea.**Lantana,** (Verbenaceæ) V. F. B.

" flera olika sorter, pr 12 st., 3 rdr	— 30
En af de bästa växter att under som. uppl. på soligt beläggna grupper. Blimerna varie- ra i röd, gult och lila, framkomma hela sommaren. Fordra kraftig jord.	

Lastrea, (Polypodiæ)

" semula, Europa; Madeira, T. F.	1,50
" augescens (Asp. Ottom.) Trop. Am., V.	— 50

" chrysoloza (Aspidium) Brasilien, V.

" dilatata, Europa; N. Amerika, T. F.

" angustiloba T. F.	1,50
" nana, T. F.	1,50

" dumetorum, Hemland? T. F.

" Filix mas, Sverige, T. F.


" " mas crispa, T. F.

" " spinulosa, T. F.

Ormbunkar; de m. T. F. kunna naturl. upplanteras på kalljord. Pl. i halfrutten skogajord.

Pr st., Rmt Rd. ö.

Latania; Bourbonpalm, (Palmeæ) V. B.
 " bourbonica (Livistona chin.) efter stor-
 lek från 5, 10, 15, 25 till och med 50 —
 Stora, vackra, solfjäderlika blad. Pl. i
 löf- & torfjord; vattnas ymnigt.



Livistona (Latania)

Pr st., Rmt Rd. ö.

Laurus; Lager, (Laurineæ) T. B.
 " nobilis, vanlig, S. Eur., 5 à 6 f. h. 10 —
 Dessutom finns mycket stora ex. m. vack-
 ra runda kronor. Priset, efter ex. ålder
 och storlek, meddelas på begärnan.

Lavatera; Poppelros, (Malvaceæ)
 arborea, S. Europa, F. T. — 50
 Talar. röda blmr användb. i bladgrupper.

Leptospermum; Söderhafsmyrten, (Myr-
 taceæ) T.
 " bacatum, Nya Holland 1 —
 " flavescens, Nya Holland 1 —
 " grandiflorum, Nya Holland 1 —
 " lanigerum, Nya Holland 1 —
 " scoparium, Nya Holland 1 —
 Fint löfverk, hvita, stund. något rödakt.
 blmr. Planteras i löfjord.

Libocedrus; Liboceder, (Cupressinæ) T.
 " chilensis, Chili 1,50
 " viridis, Hemland? 1,50
 Vackra barrträd till dekorationer i kalla
 växthus. Planteras i löfjord.

Libonia; (Acanthaceæ) V. B.
 " floribunda, Brasilien — 50
 Gulröda, cylinderform. blmr vid olika ti-
 der. Pl. i ljungjord.

Licuala; Likualapalm, (Palmeæ) V. B.
 " spinosa, Java, Zingapore 10 —

Vackra, starka ex. Pl. i löf- & torfjord.
Ligularia; Båndblomster, (Senecionideæ)
 " Kämpfferii fol. var., Japan, T. F. . 1,50
 Utm. vackra, hvitmarm. blad. Pl. i kraf-
 tig jord; vattnas rikligt.

Pr st., Rmt Rd. ö.

Ligustrum, se Träd och buskar till anl.

Lilium; Lilja, (Liliaceæ) T.
 " auratum, Japan 4 —

Obestridd. den vackraste af alla liljer; be-
 handl. som L. lancifolium. De andra sort.
 finns upptagna bland fleråriga blomsterv.

Lippia; (Verbenaceæ) T.
 " citriodora (Verbena triph.) Buen. Ayres 1,50
 Utm. välluktande blad, men obetydliga
 blmr. Planteras i löfjord.

Livistona; Solfjäderpalm, (Palmeæ) V. B.

" australis, se Corypha australis.
 " chinensis, se Latania bourbonica.
 " olivæformis, Java 10 —
 " rotundifolia (Corypha; Saribus) Java 6 —
 Praktf. palmer. Lätta att odla i boningsr.
 Pl. i kraftig, ej för lätt jord; vattn. ymn.,
 men ej öfverfl. Se afbildningen, som är
 en typ af Solfjäderpalmerna.

Lochera; (Gesneriacæ) V.
 " hirsuta (Achimenes). Trop. Amerika — 50
 Vackra blmr. Behandl. som Achimenes.

Lomatophyllum; (Asparagineæ) T.
 bourbonicum (Agave marg.) Bourbon 8 —
 Praktf. dekorationsv., likn. Agave, m. röd-
 kantiga blad. Pl. i kraftig löfjord, vatt-
 nas sparsamt under vintern.

Lomaria, (Polypodiæ) V.
 " Boryana (cycadeifol.) S. Afr., starka 60 —
 " capensis, S. Afrika 1,50
 " ciliata, S. Afrika 1,50
 " gibba, Hemland? V. B., praktfull . 1 —
 Utm. ormbunkar. Pl. i halfrutten skogs-
 jord. Hällas varmt och fuktigt.

Lophospermum; Kamfrö, (Scrophu-
 liariaceæ) T. F.

" scandens, Mexiko 1 —
 Slinger. m. vackra blmr. Rotknölarne
 hvila om vintern: vattnas då ej; ompl.
 om vären i god löfjord.

Lycastea; (Orchidæ) V.
 " aromatica, Mexiko 5 —
 " cruenta, Guatemala 5 —
 " Skinnerii, Brasilien 10 —
 De båda förstn. havfa mörkgula, starkt
 vällukt. blmr. den senare svagt vällukt.
 blmr. hvita m. rödt. De pl. i mossa samt
 hällas varmt och fuktigt.

Lycopodium; Lummer, (Lycopodiæ) V.
 " phlegmarium, Hemland? unga 5 —
 En ytterst sällsynt växt, tillhörande samma
 släkte, som de hos oss förek. s. k. Lum-
 merväxterna. Pl. i halfrutten skogsjord.
 Andra, för tillh. arter, se Selaginella.

Lygodium; (Osmundaceæ) V.

" japonicum, Japan 1,50
 " scandens, Java 1,50
 Egendoml., slingr. ormbunkar. Pl. i half-
 rutten skogsjord.

Magnolia; se Träd och buskar till anläggan.

Mahonia; (Berberideæ) T.
 " Bealii (Berberis) Norra Kina 1 —
 Vackra blad, gula blmr i klasar. Pl. i löfj.

Malva; Kattost, (Malvaceæ) T.

" californica, Kalifornien — 50
 Blmrna röda, framk. ofta om vintern. Pl.
 i löfjord.

Mammillaria; Värtakaktus, (Cacteæ) V. B.
 " angularis, Mexiko 1 —

Pr st., Rmt Rd. ö.

Mammillaria acicularis, Mexiko	1 —
" polythele, Mexiko	1 —
" quadrispina	1 —
" aciculata	1 —
" rhodantha, Mexiko	1 —
Egendoml. kaktusv. Pl. i med grof sand och kalkgrus bl. löjfjord; vattnas försigt om vintern.	
Mandevilla, (Gesneriaceæ) V.	
" lanata, Trop. Amerika	50
Blå blmr. Behandlas som Achimenes.	
Marantha, (Scitamineæ) V.	
Fagoreana, Trop. Amerika	1 —
" flavescentia (Phrynum) Brasilien	1 —
" ornata (alba lineata) Columbien	2,50
" Legrelleana, Trop. Amerika	2,50
" regalis, Central-Amerika	3 —
" roseo-picta, Central-Amerika	4 —
" tubispatha, Central-Amerika	10 —
" Warzezewiezi, Brasilien	2,50
" van der Heekii, Brasilien	3 —
" virginialis, Brasilien	6 —
" Zebrina, Brasilien	2,50
Utm. för sina praktf. blad, som stundom varierar i åtsk. färger. Pl. i god löf., torf- och ljungjord; hållas varmt & fuktigt. En svag bottenvärme är för dem alla mycket välgörande.	

Maurandia, (Schrophularineæ) T. B.	
" antirrhinifolia, Mexiko	50
" Barklayana, Mexiko	50
" semperflorens, Mexiko	50
Slinger. m. vackra, viol. & röda blmr. Pl. i löjfjord; anv. till ampler eller bekl. af mindre korgar, flätverk, spalier m. m.	

Medeola, (Asparagineæ) T.	
" asparagooides, Hemland?	50
Kan anv. till ampler. Planteras i löjfjord.	
Medicago; Luzern, (Leguminosæ) T. F.	
" arborea, S. Europa	50
Melaleuca; Cajeputträd, (Myrtaceæ) T.	
" armillaris, Nya Holland	75
" decussata, Nya Holland	1 —
" circifolia, Nya Holland	50
" hypericifolia, Nya Holland	50
" linearifolia, Nya Holland	75
Dessa träd lemmna fint bukettgrönt. De viol., gulhvita eller röda blmrna äro ofta ganska vackra. Pl. i löf- & ljungjord; beskäras årligen.	

Melanoselinum, (Umbelliferæ) T. F.	
" discipiens, Madeira	50
Användbar till pl. i bladgrupper.	

Melianthus; Honungsblomster, (Rutaceæ)	
" major, Godahoppsudden, T. F.	5 —
Träd med vackra, blåakt. blad; vacker i bladgrupper.	

Meniscium, (Polypodiæ) V.	
" giganteum, Hemland?	5 —
Egendomlig och sällsynt ormbunke.	

Mentha, se fleråriga blomsterväxter.	
Mesembryanthemum; Isplanta, (Ficoidæ) T. B.	
" caulescens	50
" conspicuum	50
" cruciatum	50
" coccineum	50

Pr st., Rmt Rd. ö.

Mesembryanthemum diffusum	50
" depressum	50
" linguiforme	50
" medium	50
" mustellinam	50
" muricatum	50
" marginatum	50
" microphyllum	50
" roseum	50
" scabrum	50
" purpureum	50
" " roseum	50
" " violaceum	50
" " variegatum	50
" violaceum	50

15 olika sorter med namn, rdr 5,50.

6 sorter med namn " 2,25

Dessa från Godahoppsudden härstam. växter odlades ford. ofta i boningsrum, hvar till de äro särdeles lämpl. Utm. sig icke allenast för vackra, ofta briljanta blmr, utan äfven gen. egendomliga bladformer. Pl. i god, sandbl. löjfjord; vattn. obetydl. om vintern.

Metrosideros, se Callistemon.

Mikania, (Eupatoriaceæ)

Guako, Ormört, Södra Amerika, V. —	50
" scandens, Carolina, Mexiko, T.	50

Tacks. slingerväxter. Planteras i löjfjord.

Mimulus; Muskusbłomster; Gyckelblomster, (Scrophularineæ) T. F.

cardinalis, Nordv. Amerika	35
" cupreatus, Chili, pr 12 st., rdr 1,50 —	25
" luteus, Chili . . pr 12 st., 2 rdr —	20
" " tigrinus . . pr 12 st., rdr 2,50 —	25
" moschatus, Columbien	25

M. cupr. & lut. tigrinus är utm. gruppv. Den förra har röda, den sen. gula, m. rödt tigrerade blmr. M. cardin. är en vacker rabattv. och M. moschat. är utm. för sin starka, rena muskuslukt. Allesamman vackra för krukor.

Mitraria; Biskopsmössa, (Gesneriaceæ) T.

coccinea, Chili	1 —
Skarlaakaun. blmr. Pl. i löf- & ljungjord.	

Monstera, (Aroidæ) V.

deliciosa, Guatemala, stora exemplar . . .	3 —
Utm., m. stora, mörkröda utskurna blad. Planteras i löjfjord.	

Musa; Pisang; Bananas (Musaceæ) V.

Cavendishii, Kina	5 à 10 —
" fol. var.	2,50
Dacea, Ostindien.	5 à 10 —
" rosacea, Mauritius	5 —
" speciosa, Java	3 —

zebrina, Hemland? 10 —

Präktiga dekorationsv., hvars blad ofta uppnå flera alnars längd och proportionerl. bred. Frukterna ätbbara, kända under ofvanst. namn. Pl. i kraftig löf- & drif-bänkjord; vattn. ymnigt om sommaren.

Muschia, (Campanulaceæ) T.

Wollastonii, Madeira	1 --
Vackra blad och tair. gulakt. blmr. Pl. i kraftig löjfjord.	

Myrsiphyllum, se Medeola.

Pr st., Rmt Rd. ö.	Pr st., Rmt Rd. ö.
Myrtus; Myrten, (Myrtaceæ) T. B.	Pandanus; Spiralpalm, (Pandaneæ) V.
" communis, S. Europa, storbl., 50 öre à 2 —	" caricosus, Ostindien 5 —
" finbladig. 50 öre t. o. m. 10 —	" javanicus fol. var, Java 5 —
" " fol. var. med brokiga blad. 75 —	" mauritanicus (elegantissimus) Mauritius, starka praktexemplar. 75 —
" bullata, Nya Zeeland 75 —	" utilis, Madagascar 5; 75 à 100 —
Planteras i kraftig löf- & driftbänkjord.	Utm. prakt. dekorationsv. för större varmlands. Planteras i kraftig löf- & torfjord.
Nægelia, (Gesneriaceæ) V.	Panicum; Hirz, (Gramineæ) V.
" flera sorter med namn . . . 50 öre à 1 —	" plicatum, Ostindien 50 —
Dessa, från de varmare delarna av Amerika härst. växter utm. sig för vackra blad och blmr. Behandlas som Gesneria, till hvilket släkte de fordon räknades.	" sulcatum, Ostindien 50 —
Nephrolepis, (Polypodiæ) V.	" variegatum 50 —
" davallioides, Malaiska örne . . . 1,50 —	De båda förstn. utm. sig gen. palmiska, breda, veckade blad och äro sköna dekorationsv. Den sistn, hvars blad äro hvitröda, är låg, krypande och kan anv. till ampler, infattn. af stellager o. s. v. i varma växthus.
" exaltata, S. Amerika, Java . . . 1,50 —	Papyrus antiquorum, se Cyperus.
Prydl. ormb. Pl. i halfruttens skogsjord.	Passerina; Fågelhusvud, (Thymeleæ) T.
Nerium; Oleanderbuske, (Apocynæ) T. B.	" filiformis, Godahoppsudden 75 —
" Oleander fl. pl, Södra Europa . . . 50 —	Vacker dekorationsv. Pl. i ljung- & löfj.
Pl. i kraftig löf- & torfjord; vattnas ymnigt under sommaren.	Passiflora; Passionsblomster, (Passifloræ)
Nierembergia, (Solanaceæ) T. F.	" alba, Brasilien, V. T.
" frutescens, Buenos Ayres 50 —	" coerulea, Brasilien, V. T. 75 —
Fin buskv. m. talrika, hvita, med ljusblätttecknade blmr. Pl. i löfjord; toppas ofta.	" edulis, Brasilien, V. T. 75 —
Niphobolus, se Polypodium.	" lunata, Jamaika, V. T. 50 —
Olea; Oljeträd; Olifträd, (Oleineæ) T.	" kermesina, Trop. Amerika, V. 2,50 —
" europea, S. Europa, N. Afrika . . . 50 —	" trifasciata, Trop. Amerika, V. 2,50 —
Planteras i löfjord; beskäres årligen.	Praktf. slingerv. med vackra, underbara blommor. Planteras i god löfjord.
Oncidium, (Orchideæ) V.	Peirescia, (Cactæ) V.
" altissimum, Vestindien 2,50 —	" aculeata, Vestindien 50 —
" bicallousum, Guatemala 5 —	Denna växt odlas hufudsakl. för att derutti inympa andra cactusarter.
" leucochilum Mexiko 5 —	Pelargonium, (Geraniaceæ) T. F.
" Papilio, Trinidad 15 —	Storblom. engl. & Odiérska; diadem- och fantasipelargoner med namn : 60
Märkvärdiga, fjärilslika blmr. Fastb. vid trädskor. Fordra varm och fuktig atmosphær.	" 50 olika sorter m. namn, rdr 25 —
Ophrys; Flugyxne, (Orchideæ) T.	" 25 " vackra sorter m. namn " 13 —
" arachnites, Mell. och Södra Europa 1,50 —	" 12 " sorter med namn " 7 —
" aranifera, Södra Europa 1,50 —	" 25 " " i rum: l, utan namn " 7 —
" ferrum equinum, Orienten. 1,50 —	" 12 " " i rummel, utan n. " 4 — 40
Pl. i grof torfjord, bland. m. hackad hvitmossa, barkbitar och trädskor; Vattnas ej under hvitlotiden.	" Scarletpelargonier, enkla med namn — 60
Opuntia; Fikonkaktus, (Cactæ) V. B.	" 25 olika sort. enkla m. namn rdr 10 —
" Ficus indica, Mell. & S. Amerika . 1 —	" 12 " sorter enkla m. namn " 6 — —
" cylindrica, Peru 1 —	" 12 st. med tvåfärgade blad " 6 — — 60
Behandlas som Cactus.	" 6 " m. tre o. flerfärg. blad " 5 — 1 —
Oreodoxa; Bergpalm, (Palmeæ) V.	" 6 " med dubbla blommor " 5 — 1 —
" Regia, Cuba, unga ex. 5 —	" 100 " enkla i rum: till grupp. " 20 — —
Stättig palm. Pl. i kraftig löf- & grästorffjord; vattn rikl.; fuktig, varm atmosfer.	" 50 " i rummel till grup. " 12 — —
Osmunda, (Osmundaceæ) T.	" 25 " " till grupper " 6,50 —
" regalis, Sverige, sällsynt. 2 —	" 12 " " " " grupper " 3,50 — 35
" spectabilis var. gracilis, N. Amerika 3 —	Vår pelargonesamling består af såväl nyare och nyaste, som de hästa äldre sorterna. Särsk. förtjena de s. k. scarletpelarg. uppmärks., emedan de äro lika vackra till grupper, som till odl. i krukor och med en samling sådana kan man åstadkomma de vackraste sammantällningar. Blommorna härla året, med undantag af de mörkaste vinternmånaderna.
Utm. vackra ombukar. Den förstn. tål vintern p. kalljord, de sen. öfverf. frostfritt men upplanteras under sommaren.	Penstemon, (Scrophulariaceæ) T. F.
Oxalis; Harklöver, (Oxalidæ)	" diverse sorter i rummel till grupper — 30
" Bovieii, Godahoppsudden, V. 75 —	pr 12 st., 3 rdr.
" caprina, Godahoppsudden, T. 50 —	Blimra variera i rödt och violet. Utm. vackra och tacksamma för frilandsgrupper. Fortplantas genom stielklingar.
" esculenta, T. F., pr 100 st., 1 rdr —	
Den förstn. har stora, vackra carmosinr. blmr., O. capr. gulakt. blmr. Vattnas ej om vintern, då de hvila; ompl. om våren i sandb. löfjord. O. esculenta hvars rötter äro ätbare any. till inf. kring blomstergr.; uppl. om våren på 2-3 tums årst. fr. hvarandra; upptagas då frost inträffar.	

Pr st., Rmt Rd. ö.

Peristeria, (Orchidæa) V.

" Humboldtii (Acinetum) Venezuela . . 10 —

Orehidé m. märkv. blmr. Pl. i mossa.

Persea; Kamfersträd, (Laurinæ) T.

" Camphora (Laurus) Kina, Japan . . 2,50

Luktar starkt kamfert. Pl. i löf- & ljungjord.

Petunia, (Solanaceæ) T. F.

" öfver exemplar, pr 12 st., 5 rdr — 50

En af de tacks. och vackraste grupper. Od-

lade i kruka blmr den äfven länge och

rikligt. Planteras i fat löfjord.

Phalacraea, (Eupatoriaceæ) T. F.

" Wendlandii, S. Am., pr 12 st., 3 rdr — 30

Väckra, blå blmr i rika flockar. Unga

frö- eller stielklingpl. blommor, om de un-

der som, vil behandl., i Oktob. och Nov.,

en tid då alla blmr äro välvkomma. För

öfrikt förträfflig till grupper.

Phegopteris, (Polypodiæa)

" Dryopteris, Sverige, F. — 25

" spectabilis trädartad, Trop. Am., V.

unga fröplantor, 50 öre, praktexempl. 30 —

" tetragona, Hemland? V. T. — 50

Bland dessa ormb. utm sig isymerhet

Ph. spectab. för flera almar långa, vackra

blad. Planteras i halfrutten skogsjord.

Phillyrea, se träd och buskar till anläggan.**Philodendron, (Aroideæ) V.**

" bipinnatifolium, Brasilien 2,50

" Limnei, Tropiska Amerika 2,50

Utm. bladväxter. Planteras i god löfjord.

Phoenix; Daddelpalm, (Palmeæ) V. T.

" canariensis, Kanariörne?, unga ex. 2,50

" cycadeifolia, Hemland?, unga exempl. 3 —

" dactylifera, vanl., Asien, Afrika, 10 à 75 —

" reclinata, S. Afrika, Kafferlandet . . 10 —

" sylvestris, Ostindien 6 —

Praktf. palmer, hvilka såsom stora kunna

odlas i temp. växthus. Som smä förrda

de mera värme. Pl. i kraftig löf- och

drifbänkjord; vattnas ymnigt.

Phormium; Ny-Zeelandslin, (Asphodelæa)

" tenax, Nya Zealand, T., 2,50; 5 à 10 —

Dekorationsv. m. långa, smala, ljusgröna

blad. Planteras i löf- och torrfjord.

Phrynum, (Scitamineæ) V.

" Porteanum, Brasilien 1,50

Behandl. som Marantha, hvartill den stun-

dom riknäs; andra sorter, se Marantha.

Phyllica; Ljungmyrten, (Rhamnæa) T.

" ericoides, Godahoppsudden — 50

" paniculata, Godahoppsudden — 75

Fint grönt; hrvta blmr. Pl. i ljung- & löfj.

Phyllanthus; Bladblomster, (Eupatoriaceæ)

" angustifolius, Vestindien, V. 1,50

De smä blmrna framk. i bladkanterna.

Planteras i löfjord.

Phymatodes, (Polypodiæa) V. T.

" Billardierii, Nya Zealand — 75

" longipes, Malaiska örne 1,50

" pustulata, Nya Zealand 1,50

Ormbunkar. Pl. i halfrutten skogsjord.

Pilogene, (Cucurbitaceæ) T. F.

" suavis, Godahoppsudden — 50

Slingerv. m. vackra blad och smä grön-

aktiga välluktande blommor.

Pimelea, (Thymelæa) T.

" decussata, Nya Holland 1 —

Vackra roseur. blmr. Plant. i ljungjord.

Pr st., Rmt Rd. ö.

Pincenecticia, (Asphodelæa) T.

" glauca (Beaucarnea stricta) Mexiko 2,50

" tuberculata (Beauc. recurvata) Mexiko 2,50

Stöt. dekorationsv. med smala blad och
egendoml. stampbildn. Pl. i löfjord.

Pinus, halep., se Träd o. busk. t. anläggan.

Piperonia; Pepparväxt, (Piperaceæ) V.

" ariifolia var. argyreia, Brasilien . . . 1 —

" magnoliifolia, S. Amerika 1 —

Båda odlas för sina blad. Pl. i ljungjord.

Pitcairnea, (Bromeliaceæ) V.

" leionema, Trop. Amerika 2 —

Pl. i halfrutten skogsjord; fordrar skugga,
värme och fuktighet.**Pittosporum, Klubbfrö, (Pittosporaceæ) T.**

" Tabira, Kina 1 —

" undulatum, Nya Holland 1 —

Vackra blad; hvita vällukt. blmr. Pl. i
ljung- & löfjord.**Platycerium, (Polypodiæa) V.**

" alcicorne, Ostindien 1,50

Märkv. ormbunkar. Fastb. vid trädskor; hälles ständigt varm och fuktig.

Plumbago; Blårot, (Plumbagineæ) T.

" capensis, Godahoppsudden 1 —

Vackra blå blmr. Pl. i ljung- & löfjord.

Podocarpus, (Coniferae-Podocarpeæ) T.

" acicularis, Nya Zealand 3 —

" coreana (Toreya nucifera) Japan . . . 5 —

" latifolius, Hemland? 1,50

" nerifolius, Nepal 2 —

" Mockii, Japan 1,50

" nubigense, Nubien 1,50

Ständ. gröna träd. Pl. i löf- & jungefjord.

Polygonthus; Tuberos, (Hemerocallideæ)

" tuberosus, Java; Ceylon T. 50

Stora, hvita, vällukt. stund. dubbla blmr
på långa stielkar. Rötterna hylla om vintern,
böra då ej vattnas; ompl. om våren
i god löfjord.

Polemonium, se fleråriga blomsterväxter.

Polygala; Jungfrulin; Fägelört, (Polygalæa) T. B.

" Dalmasianna, Godahoppsudden 1 —

" grandis, Godahoppsudden 1 —

" latifolia, Godahoppsudden 1 —

Vackra, viol. blmr under nästan hela året.
Planteras i ljung- & löfjord.**Polyodium; Bergsöta, (Polypodiæa)**

" aureum, Trop. Amerika, V. 1 —

" Gardnerii (Niphob.) Ost- & Vestind., V. 1,25

" glaucum (Phlebodium sporadocarpum)

Mexiko, V. 1,50

" irioides (Microsorum) Vestindien, V. 1 —

" latipes (Goniophleb. loriceum) Trop.

Amerika, V. 1 —

" lingua (Niphobolus) Ceylon, V. . . . 1,25

" metamorphum (Goniophlebium sub-

auriculatum) Malaiska, örne, V. . . . 2,50

" nitidulum, Honduras, V. 2 —

" Paradise, Brasilien, V. 1,50

" temiosum (Campyl. angustif.) T. Am., V. 1,50

" tetragonum (Goniopteris) Vestind., V. — 50

" vulgare, S. Europa, N. Amerika, F. — 25

" " cristatum, N. Amerika, T. F. . . . 1 —

" " serratum, N. Amerika, T. F. . . . 1 —

	Pr st., Rmt Rd. ö.	Pr st., Rmt Rd. ö.	
Vackra, intressanta ormbunkar. Plant. i halfruttens skogsjord.			
Polystichum , (Polypodiæ) T. F.		Retinospora , (Cupressinæ) T.	
„ angulare var. grandidens, Europa	1,50	“ ericoides, Japan	1,25
„ „ var. interrupta	1,50	“ leptoclada, Japan	1,50
„ „ imbricatum	1,50	Vackra, cypresslikta. Plant. i ljunghjord.	
“ coriacium, Mauritius	1,50	Rhodea , (Aspidistree) T.	
Intressanta ormbunkar.		“ japonica, Japan	1 —
Pothos , (Aroideæ) V.		Dekorationsväxt. Plant. i löf- & torfjord.	
„ ventricosus, Trop. Amerika	1,50	Rhododendron, se Träd & buskar till anl.	
Märkvärdiga för sina uppblåsta bladskäft.			
Primula ; Majnöckel; Gullvifva, (Primulaceæ)		Richardia ; Calla , (Aroideæ)	
„ cortusoides, Sibirien, T. F.	50	“ africana, se Calla ethiopica.	
„ chinensis (premitens) i många utmärkta		“ albo-maculata, Nepal	1 —
sorter, T. B., pr 12 st., 5 rdr	50	Vackra, hyttfläckiga blad och mindre blmr än den vanliga. Planteras i löfjord.	
„ „ fi. pl., dubbla, utm. vackra, T. B.	1,50		
“ andra sorter (acaulis & mollis) till odl.		Rivinia , (Phytolacæa) V.	
i krukor, se fleråriga blomsterväxter.		“ brasiliensis, Brasilien	50
Den förstn. har rosentr. blmr. Den s. k. kinesiska primulan är bland de vackraste och tacksammastaka vinterblommor vi äga.		“ humilis, Vestindien	— 50
De dubbla sorterna äro synnerl. vackra i buketter. Pl. i löfjord; forda jemn, ej ofverdigt fuktighet och skugga om som.		Vackra, högröda frukter. Pl. i löfjord.	
Protea ; Silfverträd, (Proteaceæ) T.		Ruscus ; Mustörne, (Smilacineæ)	
„ Scolymus, Godahoppsudden	50	“ aculeatus, England, T.	1 —
Vackert träd m. gulgröna blmr. Planteras i ljunghjord.		Ständigt grönk., låg växt, som i södra Sverige utl. vintern på kalljord. Planteras i ljungh. & löfjord.	
Prunus chin., se Träd & buskar till anl.		Russelia , (Schrophularineæ) V.	
Pteris , (Polypodiæ)		“ juncea, Mexiko	— 75
„ arguta (flabellata) Afrika, S. Amerika, m. fl., V.	50	Trädhina, nästan bladlösa grenar och röda blommor. Planteras i löfjord.	
„ aspericaluis, Ostindien, V.	75	Sabal ; Sabalpalm, (Palmeæ) V.	
„ argyrophylla, Trop. Amerika, V.	1 —	“ Adansonii, Georgia etc., starka	15 —
„ aurita, Java, V.	50	“ Palmetto, Florida, starka	10 —
„ Blumeana (repandula) Ostindien, V.	50	Vackra. Planteras i löf- & grästorfjord.	
„ crenata, Kina, Ostindien, V.	75	Saccharum ; Sockerrör, (Gramineæ) V.	
„ cretica, S. Eur., Or., Afr., Bras., T. V.	50	“ officinarum, Ost- & Vestindien	1,50
„ geranifolia (Pellæa) Vestindien, V.	1 —	Pl. i löfjord; vattn. ymn. om sommaren.	
„ gigantea, Guatemala, V.	1,50	Salvia ; (Labiateæ) T. F.	
„ glancovirens, Ceylon, V.	1 —	“ argentea, Orienten, pr 12 st., 5 rdr	50
„ hirsuta, Vestindien, V.	1,50	“ patens, Mexiko	1,50
„ longifolia, S. Eur., Afr., Orient, T. V.	50	Den förstn. har stora, silverbry. blad och anv. fördelat. till grupper. Den sen. har rent ultramarinklä. vackra blmr. Plant. i löfjord; vattnas ej om vintern.	
„ nemoralis, Brasilien, V.	50	Sanchezia , (Acanthaceæ) V.	
„ palmata (Doryopteris) Brasilien, V.	1 —	“ nobilis, Ecuador	1,50
„ semipinnata, Kina, Ostindien, T. V.	75	“ spectabilis, Ecuador	2,50
„ serrulata, Kina, Japan, m. fl., V. T.	50	Dessa växter utm. sig för stora m. guld-gula tvärådror prydda blad och skarlakan-röda blmr. Planteras i god löfjord.	
„ „ var. cristata, T. V.	2,50	Sansevieria , (Asphodeloæ) V.	
„ „ polydactyla, T. V.	2,50	“ guineensis, Guinea	1,50
„ tremula, Nya Holland, T. V.	50	Aloellik m. grälvita, vällukt. blmr. Pl. i löfjord; vattnas sparsamt om vintern.	
„ umbrosa, Nya Holland, T. V.	50	Santolina ; Helgonört, (Senecionideæ)	
Alla vackra, intressanta ormbunkar.		“ chamæcyprissus, S. Europa, T. B.	50
Punica ; Granatäpple, (Granateæ) T.		Luktar starkt. Planteras i löfjord.	
„ Granatum, S. Europa, Mell. Asien	1,50	Sauromatum , (Aroideæ) V.	
Fäller bladen om vintern; bör då spars. vattnas. Planteras i löf- och grästorfjord.		“ cornutum, Hemland?	50
Puya , (Bromeliaceæ) V.		“ pedatum, Hemland?	1 —
„ Altensteinii, Columbian	1 —	“ pulchrum, Hemland?	2,50
Vackra skarl.-röda blmr. Pl. i löfjord.		Ha märkt, illaluktande blmr, men stora, vackra blad. Rotknölarne ligga torra om vintern; omplanteras om våren i löfjord.	
Raphis , (Palmeæ) V. B.		Saxifraga ; Stenbröcka, (Saxifrageæ)	
„ flabelliformis, Kina; Japan,	10 à 25 —	“ sarmentosa, Kina, Japan, T. B.	50
Vacker palm. Pl. i löf- och grästorfjord.		“ tricolor, T. B.	— 50
Remusatia , (Aroideæ) V.		Begagn. ofta i boningsr. till amplantar. Pl. i löfjord; vattnas mättligt om vintern.	
„ vivipara, Malabar	1 —	Scheeria , se Mandriola.	
Stora, vackra blad, bör under hylilotiden ej vattna, under växtdelen deremot ymnigt.		Schizocacia , (Aroideæ) T.	
Planteras i löfjord.		“ Portii, Hemland? Pl. i löfjord	2,50

Pr st., Rmt Rd ö.

Schizostylus, (Irideæ) T.

" *coccinea*, S. Afrika — 75
Vackra höggröda blmr. i Okt. & Novemb.
Planteras i löjfjord.

Scilla; *Hafslök*, (Asphodelææ) T.

" *maritima*, S. Europa, stora lökar . 3,50
Vattnas ej under hyltiden. Planteras i
löf- och driftbänkjord.
Scolopendrium; *Hjortunga*, (Polypo-
dææ) T. F.
" *officinarum*, Europa — 75
" *digitatum* 1,50
Märkv. ormb. Täta vintern ute med bet.

Scutellaria; *Hjelmört*; *Getnos*, (Labiateæ)

" *Mociniana*, Nya Spanien, V. . . . 1 —
" *scarlatina*, Nya Granada, V. — 50
Den förstn. är en verklig praktv. m. stora
knippor av eldröda blmr; den senare äf-
ven ganska vacker. Pl. i god löjfjord;
fordra varm, fuktig luft och skugga.

Seafertia, (Palmeæ) V.

" *elegans*, Trop. del. af Nya Holland,
mycket starka och vackra exemplar 45 —
Praktf. palm. Planteras i löf- och gräs-
torfjord; vattnas ymnigt.

Sedum; *Fetört*; *Fetkupper*, (Crassulaceæ) T.

" *Fabarium*, Hemland? — 50
" *Sieboldii*, Japan — 50
Pl. i sandbl. löjfjord; vattn. måttligt om
vintern.

Selaginella; *Lummer*, (Lycopodiaceæ) V.

" *apoda* (S. apus; Lycopod. bras.) Bras. — 50
" *caulescens* (S. peltata; Lycopod. fruti-
cula) Java 1 —

" *convoluta* (S. paradoxa; Lycopod. hy-
geometricum) Brasilien 1 —

" *cuspidata* (S. pallescens; Lycopod. cir-
cinatum) Guatemala 1 —

" *denticulata* (Lycopodium) S. Eur., T. — 50

" " fol. var., praktfull, ljusgrön . . 1 —

" *erythropus* (L. umbrosum) S. Amer., 1,25

" *haematoxides* (S. filicina, Karsteniana;
Lycopodium haematoxides) Peru 1,25

" *Lobbii* (Lycopodium) Borneo 2 —

" *Lyallii* (Lycopodium) Madagascari . 1,50

" *Martensii* (L. stolonif. flabellat.) Mex. — 50

" " *compacta* (L. asplenif.) Mexiko . — 75

" " fol. var. med brokiga blad — 75

" *pilifera* (S. lepidophylla) Texas . . 1 —

" *Poulterii* (Lycopod.) Brasilien . . . 1 —

" *serpens* (S. variab.; L. Serp.) Mexiko — 50

" *uncinata* (S. cæsia; L. uncinat.) Kina — 50

" *Wildenowii* (S. & L. pubescens) Ostind. 1 —

Utm. nätta, mosslikta ormunkartade väx-
ter; till mycket prydln. i varma växthus

och umbärliga i s. k. terrarier. Några

sorter, såsom S. denticulata, apoda, uncina-

nata m. fl. äro krypande och blifva knappt

ett par tum höga; andra, såsom S. cau-

lescens och Martensii m. fl. växa upprätt

och likna de egentl. ormb. Od. är ej svår;

de förra lätt, halfrutten jord och fram-

förråt jemn, men ej överfl. fuktighet. S.

denticulata kan äfven odias i kalla och

tempererade växthus.

Senecio; *Boört*, (Senecionideæ) T.

" *Petasites* (Cin. platanif.) Mexiko . . — 50

Pr st., Rmt Rd ö.

Senecio Ghiesbrechtii, Mexiko 1 —

" andra sortcr, se Cineraria.

" Stora, vackra blad och gula blmr; passa
till bladgrupper.

Sequoja, se Taxodium & Wellingtonia.**Solanum**; *Trollbär*, (Solanaceæ) V. T. F.

" *crinitum*, Cayenne — 50

" *laciniatum*, Nya Zeeland — 50

" *robustum*, Trop. Amerika — 50

verbascifolium, Hemland? — 50

12 st. i flera sorter, till bladgrupper, 4 rdr.

Sollya, (Pittosporaceæ) T.

" *heterophylla*, Nya Holland — 50

Vackra högbl. blmr. Pl. i ljungh- och löfj.

Sparmannia, (Tiliaceæ) T.

" *africana*, Godahoppssudden 1 —

Storv. m. ljungröna blad. Pl. i ljunghjord.

Spatiphyllum, (Aroidæ) V.

" *cannifolium*, Hemland? 2 —

Vacker dekorationsväxt. Plant. i löjfjord.

Spreckelia, se Amaryllis formosissima.**Stanhopea**, (Orchidæ) V.

" *aurea*, Guatemala 10 —

" *eburnea*, Brasilien 10 —

" *graveolens*, Brasilien 10 —

" *insignis*, Brasilien 10 —

" *Jenischi*, Brasilien 15 —

" *Lindleyana*, Mexiko 10 —

" *oculata*, Mexiko 10 —

" *tigrina*, Mexiko 15 —

" *Wardii aurea*, La Guayra 10 —

Märkv. praktf. starkt vaniljukt. blmr.

Pl. i hackad hvitmosa, uppbl. m. grof

torfjord och trädol, uti korgar af öfver

hyvaranda lagda trädplinnar.

Stevia, (Eupatoriaceæ) T. F.

" *Eupatoria*, Mexiko 50

" *Lindleyana*, Mexiko 50

" *purpurea*, Mexiko 50

Flerär, m. vackra blmr. Plant. i löjfjord.

Kunna under omsorgsf. betäckn. uthärdा

vintern på fritt land.

Strelitzia, (Musaceæ) V.

" *Augusta* (Heliconia alba) Godah.-udd. 10 —

" *Regina*, Godahoppssudden 5 —

Den förstn. uppnå äfven i växthus, be-
tydl. storlek. Den andra har hvarje år

märkv. blå och gula blmr, men blifver ej

så stor. Pl. i kraftig löf- och grästorfjord.

Streptocarpus; *Spiralfrukt*, (Gesne-
riaceæ) V.

" *polyanthus*, Port Natal 1 —

" *Rexii*, S. Afrika 1 —

Bla blommor. Planteras i löjfjord.

Struthiopteris; *Strubräken*, (Polypodieæ)

" *germanica*, Sverige, T. F. 50

Utm. i ormbunkagrupper och i krukor.

Syagrus, se Cocos.**Tacsonia**, (Passifloreæ) T. V.

" *splendens*, Nya Granada 1 —

" von Volxemii, Nya Granada 2,50

Slingerv. m. vackra, röda blmr. Planteras

i god löjfjord.

Tapeinotes, (Gesneriaceæ) V.

" *Carolina* (Gesneria barbata) Brasilien 2 —

Taxodium semperv., se Träd till anlägggn.

	Pr st., Rmt Rd. ö.	Pr st., Rmt Rd. ö.
Tecoma, (Bignoniaceæ) T.		
" jasminoides, Nya Holland	1 —	
" Slingerv. med stora, vackra blmr. Planteras i löfjord.		
Templetonia, (Papilionaceæ) T.		
" glauca, Nya Holland	1 —	
" retusa, Nya Holland	1 —	
" Vackra röda blmr. Planteras i ljungjord.		
Teturium; Kattört, (Labiateæ) T. B.		
" Marum, Spanien, Syrien m. fl.	50	
" Starkt lukt., gråakt. buskv. Pl. i löfjord.		
Thalia, (Cannaceæ) V.		
" dealbata, Carolina	1 —	
" Vackra blad. Pl. i löf- & grästorffjord;		
" vattn. ymn. eller ställes i vattnet.		
Thrinax; Trinaxpalm, (Palmeæ) V.		
" radiata (elegans) Antillerna, stora	20 —	
" parviflora, Trop. Amerika, små pl.	2,50	
" Praktf. palmer m. cirkef., solfjäderlikta blad. Pl. i löf- & torffjord; vattn. ymn.		
Thuja, se Träd & buskar till anläggan.		
Thujopsis, (Cupressineæ) T.		
" dolabrata, Japan, vackra	50 öre à 10 —	
" borealis, se Träd & buskar till anl.		
" Vackra, ständigt gröna, cypresslikta träd.		
Tigrida, se Ferraria.		
Tillandsia, (Bromeliaceæ) V.		
" brachystachys, Trop. Amerika	2,50	
" Pl. i halfruttn. löfj.; fordr. värme & fukt.		
Torenia, (Scrophularineæ) V. B.		
" asiatica, Ostindien	1 —	
" Vacker amplyv. m. blå blmr. Pl. i löfj.		
Tradescantia, (Commelinæ) V. B.		
" discolor, S. Amerika	75	
" zebra, S. Amerika	50	
" Den sista. passar till ampl. Pl. i löfjord.		
Trithrinax, (Palmeæ) V.		
" mauritiiformis, Venezuela, starka	10 —	
" Praktf. palm. Planteras i löf- & torffjord.		
Tritomanthe, (Asphodelæ) T. B. F.		
" Uvaria, Godahoppsudden	1 —	
" Praktf. orangröda blmr. Plant. i löfjord.		
Tropæolum; Krasse, (Tropæoleæ) T. B.		
" azureum, Chili	3 —	
" Jarattii, Chili	1,25	
" tricolorum, Peru	1,25	
" pentaphyllum, Monte Video	1,25	
" Utm. vackra, talrika, blmr. tidigt om våren. Hvila under sommaren, böra då ej vattn. I Sept. börjar den trädfröna stängeln att åter växa, då rotknöl. böra ompl. i god löfjord, ställas i just och vattn. försiktig. Rankorna ledas uppeter fina, gröniga, i krukkorna nedstcknna (qvistar, eller oek uppåt fina stälträdespalier).		
Tupa, (Lobeliaceæ) T.		
" crassicaulis, Vestindien	50	
" Pl. i löf- och grästorffjord; vattn. ymnigt.		
Tydæa, (Gesneriaceæ)		
" flera vackra sorter, pr. rhizom	50	
" " vackra sorter, pr kruka, 1 rdr.		
" Praktf. blmr. Behandlas som Achimenes eller Gesneria.		
Udhea, (Compositæ) T. F.		
" bipinnatifida, Mexiko	1 —	
" Vacker till upplantering i bladgrupper.		
Urania, (Musaceæ) V.		
" speciosa, Madagascar	5 à 25 —	
" Sällsynt, praktf. Har, såsom stor, flera fot långa, breda, ljusgröna blad. Fordrar mycket utrymme; pl. i löf- & grästorffjord.		
Urtica; Nässla, (Urticaceæ) V.		
" macrophylla, Japan	— 50	
" Utm. vackra blad. Planteras i löfjord.		
Vallofa, (Amaryllideæ) V. B.		
" purpurea, Godah-udd., pr 12 st. 10 rdr	1 —	
" Denma. tacksam. lökvixt utvecklar sina praktf. skarlkänslor. blmr. i Okt. & Nov. Förtjent att alim. odlas. Pl. i god löfj.		
Veltheimia, (Asphodelæ) V. B.		
" glauca, Godahoppsudden	2 —	
" viridiflora, Godahoppsudden	1 —	
" Lök. m. ljusröda blmr i rika klasar. Pl. i löfjord; vattnas ej under hvilodeten.		
Verbena; Jernört, (Verbenaceæ) T. F.		
" fl. vackra sort. t. gr. pr 12 st. 4 rdr	— 40	
" Imperatrice Elisabeth, vacker till infattn. pr 100 st. 20 rdr; 12 st., 3 rdr	— 30	
Veronica; Årenpris, (Scrophularineæ)		
" fl. vackra hybrider och varieteter T. B. — 50		
" Blimra variora i blått och violettt; utm. vackra. Pl. i kraftig löf- & drabankjord.		
Viburnum; Snöboll, (Caprifoliaceæ)		
" Tinus, S. Europa, T. B.	— 50	
" Dessutom finnes starka exemplar, liknande lagerträd, m. stora, runda kronor; priserna derför meddelas på begärna.		
Wellingtonia, se Träd till anläggningar.		
Wigandia, (Convolvulaceæ) V. F.		
" caracassana, Caracas, pr 12 st. 5 rdr	— 50	
" Vigierii, Tr. Amer., pr 12 st. 5 rdr	— 50	
Höra till de aldra vackraste bladv. för fr. land under sommaren. Fordra fet jord och varma, skyddade platser.		
Yucca; Palmlijfa, (Liliaceæ) T. F.		
" aloefolia, Jamaica; Vera Cruz	2,50	
" " stora, blombara exemplar, 20 à 30 —		
" fol. var. efter storlek, 2,50; 50 à 75 —		
" Draconis, Syd-Carolina, unga starka	2,50	
" flaeccida, Hemland? unga planter	1 —	
" meldenensis, unga exemplar	1,50	
" gloriosa, Virginien, unga, starka ex.	5 —	
" plicata, Virginien, unga starka ex.	5 —	
" recurvata, Georgien, starka exemplar	5 —	
Palmlijorna är utm. dekorationsv. med hvita eller hyltinga, liljelijka, välukt. blmr. Kunna anv. om som i det fria. Plant. i kraftig, humusrik jord; vattnas sparsamt om vintern.		
Zingiber, se Amomum.		
Zygopetalum, (Orchidæ) T. F.		
" erinatum, Brasilien	5 —	
" Utmarkt vackra, blå blommor om hösten. Planteras i mossa.		
Då urvalt af sorterna överlätes åt oss, lemnas vackra krukväxter i unga, men fullkomligt friska & starka exempl. med namn:		
300 olika, vackra krukväxter	100 rdr.	
200 " vackra krukväxter	75 "	
100 " krukväxter	40 "	
50 " " "	25 "	
25 " " "	15 "	
12 " " "	8 "	

R e g i s t e r


öfver i katalogen förekommande svenska och utländska, mera allmänt begagnade växtnamn:

Pagina.	Pagina.	Pagina.	Pagina.
Aarons skägg 44	Bergfur 75	Bukett-löfkoja 20	Dverggranat 71
Afodill 52	Bergpalm 104	Bukettros 81. 83	Dverggyllenlack 21
Afvenbok 78	Bergskrabba 56. 86	Buxbom 78. 83	Dverg-löfkoja 20. 21
Akasia 63. 89	Bergsöta 105	Bärnispel 77. 80	Dverg-mandel 77
Akeleja 52. 85	Beta 27	Bärapple 80	Dverg-palm 95
Al 77	Betelpalm 92	Böna 6. 35	Dyfvelsträck 56
Aleppofur 75	Betesgröe 13	Bönträd 79. 97	Ek 81
Alm 82. 83	Bindsallad 8	Cajeputträd 69. 103	Ekorrebär 54
Aloe 63. 91	Binka 55	Calla 65. 94	Elefantsnabel 45
Alpros 71. 81	Bisamblermster 39	Camellia 65. 94	Eleusingräs 31
Alsikeklöver 14	Biskopsmössa 103	Camellie-balsamin 22	Elm 32
Alströmeria 64. 91	Björnklo 27. 90	Cantaloup 11	En 74. 79
Amaryllis 64. 91	Björnfloka 29. 87	Caprifolium 78	Endivie 8
Amerikansk aloe 63. 91	Björnrefva 85	Cardoner 7	Engelskt gräs 52. 85
Amerikansk becktall 75	Björnöra 37	Cardy 7	Enkan i sorg —
Amerikansk rödgrän 74	Björk 77	Carolinapoppel 80	Enkeblomster 48. 61
Amur 13	Bladkål 3	Caroter 4	Escario 8
Andrieux-balsamin 22	Bladselleri 7	Cederträd 74. 78	Eschalottlök 10
Anemon 51. 57. 85. 101	Bladblomster 105	Cedronell 53. 85	Esdragon 9
Angelika 7	Bladbok 79	Celaster 33. 78	Esparsett 14
Anguriepumpa 11. 33	Bladdroppe 68	Cembrafur 75. 80	Evighetsblomser 42. 68
Anis 9	Blodlilja 100	Centnerpumpa 33	Fackelblomster
Apelsin 66	Blödört 61. 101	Cerast 28. 85 58. 87
Apelsinpumpa 12. 33	Blomkål 3	Champignon 12	Fackelbärare 33
Aprikos 76	Blommar för dagen	Christofffersört 51. 84	Falsk akasia 81
Aralia 27. 64. 77. 91	24. 34	Christustörne 79	Falsk cypress —
Araukaria 74. 77. 91	Blomsterböna 6	Cichorius 4. 8	Falsk indigo 77
Arfve 37. 91	Blomsterlyra 55. 86	Cistusros 96	Fantasielargonia
Ask 79	Blomsterör 27. 94	Citronmeliss 9 70. 104
Askört 28. 66. 96	Blyerts-ceder 74	Citronpumpa 12. 33	Fantasipensé 25
Aster 16. 37. 52	Blyersträd 74. 79	Citronträd 66	Femfingerör 60. 80
Astragalkaffe 6	Blötrot 59. 105	Cokospalm 96	Fenkol 9
Atlas-ceder 78	Blåklint 39	Coriander 9	Fetknoppar
Aurikel 60	Blåklocka 88	Cymbalblomster 46 49. 61. 88. 107
Avgatoträd 70	Blåkunt 41	Cypergräs 32. 97	Fetört 49. 61. 88. 107
Axsvingel 31	Blåluzern 14	Cypress 74. 79. 97	Fjellros 64. 77. 92
Azalea 64. 92	Bläsippa 57. 101	Daddelpalm 105	Fjetterskjida 86
Backtörne 80. 83	Bläskor 51. 84	Daggkåpa 84	Figurkurbits 12. 33
Baldrian 39. 62	Blästräd 78.	Daggört 71	Fikonkaktus 70. 104
Balsamin 22. 43	Blätatél 32	Dagliilia 87	Fikonträd 76. 99
Balsamgurka 35	Bockhornsklöfver	Dahlia 56. 86. 100	Fingerborgsblomster
Balsampoppel 80	Bohvete 15. 48. 88	Damspelsblomster 55. 86
Balsamtall 75. 80	Bok 79 56. 86	Fingergräs 31
Bambus 27. 92	Bolmört 57. 87	Darrax 31	Fingerört 60. 88
Bananas 70. 103	Bondbörnor 6	Darrgräs 13. 31. 32	Finnbär 79
Bandblomster 87. 102	Bondros 88	Deodoracered 78	Floringräs 12
Bandgräs 88	Boretsch 9	Dill 9	Fjädergräs 31. 32. 89
Bandpalm 97	Borstneglika 23. 86	Diptam 55. —	Fjäderkål 3. 27
Basilika 9. 47	Bourbonpalm 102	Dragon 9	Fjäderneglika 54. 86
Bastard-löfkoja 20. 21	Boört 88. 107	Drakblodträd 67. 98	Flamblomster 22. 59
Batrams-ört 60. 88	Broekoli 3	Drakhuvud 41. 55. 86	Flaskkurbits 12. 34
Becktall 75	Brudspira 61. 82. 88	Drufläder 82	Flaskträd 64
Begonia 64. 92	Brunskära 38	Dubbelfrukt 67	Flikrefva 34
Benved 79. 99	Brysselkål 3	Durragräs —	Flipkrage 43. 57
Benzointräd 69	Bränpalm 94	Dvergaster 18	Flockblomster 55. 99
Bergangeliaka	Bukett-aster 18	Dverg-balsamin 22	Flocklilja 63. 90
. 64. 77. 85. 91	Bukett-löfkoja	Dvergfur 75. 80	Flugblomster 44. 57

Pagina.	Pagina.	Pagina.	Pagina.
Flugfalla 52	Gökmata 47	Höll 82	Kattost 82
Flugyxne 104	Gökskälla 51	Höstgröe 13	45. 58. 69. 87. 102
Fläckblomster 49	Hafre 31	Höstklocka 56. 86	Kattört 72. 108
Fläder 82	Hafreötter 4	Höst-löfkoja 20	Kejsarkrona 56. 86
Foderbetr 15	Hafslöj 88. 107	Höstsyrnen 59. 88	Kejsar-löfkoja 21
Foderkål 15	Hastörne 79	Hör 44. 58. 69	Kejsarmössa 12. 33
Fodermorötter 15	Hagtorn 78. 83	Ibisblomster	Kinesisk neglika 23
Foderpalsternackor 15	Hallon 76. 81 43. 68. 101	Clarkia 39. 84
Foderroffvor 14	Hammarbuske 65	Idegran 75. 82	Klibbal 77
Frumynta 27	Hampa 15. 28	Igel-aster 19	Klibbför 105
Fur. 75. 80	Handblomster 45	Igelkaktus 67. 98	Klint 28. 39. 54. 95
Fågelfluvud 104	Harklöver 5. 47. 104	Inkarnathlöfver 14	Klockblomster
Fågelmjölk 88	Harsvans 31	Indiansk krasse 9 38. 53. 85. 94
Fågelnöt 105	Hartimjan 53	Indigobuske 69	Klotakasia 81
Färrapunzel 57	Hassel 76. 78	Ingefär 91	Klotamarant 42
Fårsvingel 13	Hasselölt 85	Isop 19	Klotaster 17
Förgätmigej. 41. 58	Helgonört 106	Isplanta. 8. 45. 69. 103	Klottistel 55
Gamander 72	Heliotrop 68. 101	Italiensk pinie 75	Klöärter 53
Gemsrot 55. 86	Herkulesklubba 12. 33	Jacobsblomster 22	Klätt 36. 51
Georgin 56. 86. 100	Herkulesört 29. 87	Jasmin 79. 101	Klöfver 14. 49
Getnos 61. 88. 107	Hjelmört 61. 88. 107	Jernek 79	Knylhafre 13
Gigelsärter 14. 69	Himalaja-ceder 78	Jernört 49. 72. 108	Kokardaster 19
Ginkgoträd 74. 79	Himmelsros 36	Jobstårar 31	Kolfhirs 15
Ginstuske 68. 79. 100	Hjorthorn —	Johannishlöfver 57	Korallträd 67. 99
Gipsblomster 42. 56. 86	Hjorttunga 107	Johannishuske —	Korgpil 81
Glis 52	Hirs 15. 29. 32. 104	Jordbröd 66. 97	Korkalm 82
Gossen i det gröna 36. 51. 84	Honungsbloomster	Jordmandel 5	Korn 31
Gran 74. 77. 83	Honungsklöfver 14	Jordpalm 100	Kornblomster 39
Granatäpple 71. 106	Hornbuske 78	Jordärtskockar 5	Kornell 78
Grekisk fur 75	Hortensia 79	Juda silfverpenn 58	Koronill 78. 97
Grekiskt hö 14	Hufvduskål 3	Judekörs 47	Korsblad 54. 85
Grobлад 15	Hufvdussallad 8	Jungfrun i det gröna 46	Korsikansk fur 80
Grål 77	Humleklöfver 14	Jungfrulin 105	Kransblomster 68. 101
Gråbo 27. 92	Hundexding 13	Jungfru Marie klocka 53	Krafrot 70
Grådådra 51. 84	Hundrofva 33. 85	Jungfru Marie kåpe —	Krasse 9. 36. 108
Grätätel 12	Hundtand 86	Jungfru Mariaësko 51. 84	Krepe 40
Grüskar 11. 12. 33	Hundtunga 41. 54. 85	Jungfruskört 40	Kronärtskockor 7
Grüsllija 61	Husarknopp 49	Jungfruvrin 33. 77	Krusbär 76. 81
Gräslök 10. 76	Hven 31. 32	Jupitersblomster 51	Kruskål 3
Gräsneglika 52. 85	Hvit-ceder 74. 78	Jättebalsamin 43	Krusmynta 9
Gröe 32	Hvit Förägt-mig-ej 41	Jättegröe 13	Kruståtel 12
Guajavaträd 71	Hvitgröe 13	Jättemelon-pumpa	Kryddträd 78
Gudsblomster 55. 86. 98	Hvitvhinen 12	Jätterör 11. 33	Krypbönor 6
Gudsgåfva 55. 86. 98	Hvitklöfver 14	Kabbalök 85	Kryphven 12
Guldblomster 39	Hvitkål 3	Kaffeträd 66. 96	Kräftbuske 97
Guldbufvud 39	Hvitlöt 10	Kakaomalva 63	Kräknöt 101
Guldmalva 51	Hytte 87	Kaktus 64	Kummin 9
Guldris 61. 88	Hårdsvinfel 13	Kalabassträd 97	Kungsljus 62. 89
Guldsvens 31	Hårgriffl 35	Kalfecka 85	Kurbits 11. 33
Guldrät 77	Hågräs 31	Kalmia 79	Kyndel 9
Gulhafre 13	Hångurka 35	Kalmus 90	Kål 3. 15. 17
Gulrefva 35	Hårhven 12	Kamexing 13	Kålask 79
Gullregn 79. 97	Hårkalk 65	Kamfrö 34. 102	Kålräbbi 3
Gullyfiva 60. 88. 106	Hägg 80	Kamnäfva 41	Kålroffvor 4
Gummiträd 99	Hängalm 82	Kampfertsträd 105	Kålrotter 4. 14
Gurka 10. 11. 32	Hängask 79	Kanadapoppel 80	Källarhalsbuske 79
Gurkört 9	Hängbjörk 77	Kanariefrö 13	Käringkruka 84
Gyckelblomster 46. 103	Hängbok 79	Kapuzinerkrasse 9	Käringtänder 14
Gyllenlack 21. 84. 95	Hängpoppel 80	Kassiaträd 65. 95	Kärleksgräs 31
Gäsfot 28	Hästkastanje 77	Kasuarträ 65. 95	Kärleksäpple 9. 45
Gåsört 52	Hökbloomster 57. 87	Kastanje 76. 77. 95	Körvel 9

Pagina.	Pagina.	Pagina.	Pagina.
Körfvelrofvor 5	Melon 11	Pappersväxt 97	Ranunkelvallmo 26
Körsbär 16. 76. 80	Melonträd 65	Passionsblomster 70. 104	Rapontika 5
Lackviol 21. 84. 95	Mispel 80	Patientia 7	Rapunzel 5
Lager 69. 102	Mjuklosta 13	Pelargonia 70. 104	Rapunzelselleri 5
Lagerströmia 69	Mjölke 86	Pense 25	Rasselblomster 53
Lambertsfur 75	Molla 7. 27	Pepparmynta 10	Raygräs 13
Lambertnötter 76	Morot 4. 15	Pepparväxt 105	Remontantros 83
Lavendel 9	Monke 57	Perlgräs 13. 32	Regnvisaren 38
Lefverbalsam 36	Mossros 83	Perlhycinth 87	Reseda 48
Lefverört 88	Moutanpion. 59. 80. 88	Persika 76	Rhabarber. 6. 30. 76. 88
Lejonblad 57	Munklöss 54	Persilja 10	Riddarsporre
Lejongap 22. 52. 84	Murgröna 79	Persiljebläder 82 28. 41. 54. 85.
Lejontand 8	Muskusblomster. 46. 103	Perukträd 81	Rigafur 75
Libanons-ceder 74. 78	Musmat 70	Pestrot 88	Ringblomster 38
Liboceder 102	Mustörne 106	Petunia 23. 84	Rockamboll 10
Licualapalm 102	Mynta 87	Phytolak 8	Rofvor. 4. 15
Lifträd 75. 82. 83	Myrten 70. 104	Pil 81	Ros 81. 83
Liguster 80. 83	Mänfrö 35	Pilgrimsflaska 83	Rosen-aster 17
Lilja 69. 87. 102	Mänviol 58	Pimpernöt 82	Rosen-balsamin 22
Liljekonvalje 54. 85	Märgärter 6	Pimpinella 10	Rosenblomster 48
Lin 15. 44. 58. 69	Nakna Jungfrun.	Pingstlilja 87	Rosenböna 6
Lind 82. 83 54. 85	Pinie 75. 80	Rosenklädning 71
Linser 6	Narciss 87	Pion 59. 80. 88	Rosenkål. 3
Ljung 67. 99	Nattens drottning 64	Pion-aster 17	Rosentry 80
Ljungmyrten 105	Nattljus 47. 59. 88	Pipblomster 77. 85. 92	Rosmarin 10
Lobelia 44. 69. 84	Nattviol 57. 87	Pisang 70. 103	Rotabagga 4. 14
Losta 13. 31. 32	Neglika. 23. 41. 54. 86	Plommon 16. 76. 80	Rotpersilja 5
Luddhafre 13	Neglikrot 56. 100	Plymblomster. 72	Rotselleri 5
Luddtåtel 13	Nerium 70. 104	Pomerans 66	Runkelrofva 15
Luftblomster 90	New-Jerseyfur. 75. 80	Pompon-aster 19	Rädiser 4
Luikeraurikel 60	Nysrot 57. 87	Poppel 80	Räfböna 62
Luktgräs 13	Nyzeelandslin. 70. 105	Poppelros. 29. 44. 102	Räfklor 14
Luktviol 62	Nyzéeländsk spenat 7	Porslinsblomster. 101	Räfmjölk 41
Lummer 102. 107	Näl-aster 19	Portlak 8. 24	Räfsvans. 27. 37
Lundgröe 13	Näfverlönn 77	Potatis 5	Rättika 4
Lupin 15. 44. 58	Nässla 108	Potatislök 10	Rödbetor 5
Luzern 14. 45. 103	Obeliskblomster.	Prairiegräs 100	Rödklöver 14
Lýncosfur 75	Oleanderbuske 70. 104	Praktax 65	Rödlök 10
Lysing 58	Oljeträd 104	Praktbuske. 65	Rödrefva. 33
Läderträd 80	Olivträd 104	Prakttilja 100	Rödsvingel 13
Lärkträd 75. 80	Oxitropis 104	Praktmalva 45	Rölleka 51
Lötkoja. 10. 39. 45. 84	Ontariopoppel 80	Praktmössa 29. 94. 99	Rönn 82
Lök 10. 51. 84	Orange 66	Praktvicka 40. 66	Rör 32. 92
Lönn 77. 83	Original-aster. 19	Prestkrage 39. 66. 95	Röraster 16
Maderalager 70	Ormbunke 72	Pressträd 96	Rörflen 13. 98
Madra 37	Ormgurka 11. 35	Prophetgurka 33	Sabalpalm 106
Majnyckel 60. 70. 88. 106	Ormhufvud 41	Prustrot 57. 87	Sabelärter 5
Majs 15. 30. 84	Ornlök 51. 84	Pumpa 11	Saffran 85
Malva 10. 45. 58	Ormrot 49. 61. 71	Punkttilja 67	Sagopalm 97
Malört 9. 27. 92	Ormört 103	Purjolök 10	Sallad. 8
Mammouthräd 83	Ornäsbjörk 77	Pyramidalm 82	Saltbuske 76
Mandarinorange 66	Oxbär 78	Pyramidek 81	Salvia. 10. 30. 48. 61. 71
Mandel 77	Oxel 82	Pyramidpoppel 80	Sammetsblomster 24
Mangold 8. 27	Oxlägga 88	Pyrenéefur 75	Sandelman 32
Mannagräs 13	Oxtunga 51	Qasjilja 88	Sandlilja 51. 85
Manskraft 55	Oxöga 30. 53	Päron 16. 76. 80	Sandluzern 14
Marieklocka 53	Paddbär. 51. 84	Qvesved. 82	Sandneglika 54. 85
Maskros 8	Palmlilja 72. 108	Qvitten 79	Sandrör 13
Matrhabarber 6. 30. 76. 88	Palsternacka 4. 15	Qvinoa 8	Sandtörne 79
Mell 7. 27	Pampasgräs 29. 100	Ranunkel. 60. 88	Savoykål. 3
Mejram 10	Pappersblomster 50	Ranunkel-aster 19	Schallottlök 10
	Pappersgräs 97	Ranunkel-buske 78	Schersmin 80

Pagina.	Pagina.	Pagina.	Pagina.
Senap 10. 15	Sommarlöfkoja 19. 84	Syrén 82. 83	Weichsel 80
Senetsträd 65. 95	Spaltblad 48	Säpört 48. 88	Weimuthstall 75. 80
Sensitifva 45	Spaltblomster 48	Säfsvingel 13	Venusblomster 88
Seradella 15	Spaltrefya 33	Säfvenbom 74. 79	Venushår 90
Sidenpappersväxt 64	Spanks cardy 7	Sälg 81	Venussko 97
Silén 49. 61	Spanks peppar 10. 38	Söderhafsmyrten 69. 102	Venusspiegel 38
Silfveral 77	Spanks syra 7	Sötblomster 45	Venusvagn 60. 88
Silfverbuse 79	Sparris 6. 76	Taggbräken 92	Verbenä 49. 72. 108
Silfvergran 75. 80	Sparriskål 3	Taggvallmo 37	Vicka 50
Silfverlönn 77	Sparrissalad 7	Taklök 71	Victoria-aster 17. 18
Silfverpoppel 80	Sparrisräter 6	Tall 75. 80	Vide 81
Silfverträd 71. 106	Spergel 15. 61	Tamarind 72	Vildvin 33. 77
Sippa.51.57.85.87.101	Spetsblomster 64	Tazett —	Vimbär 76. 81
Sitsblomster 48	Spetssvans 47	Theros 83	Vinda 40. 66. 96
Sjökål 7. 54	Spikklubba 41. 66	Thimotej 13	Vindruvfa 36. 76. 83
Skällerskida 66	Spinat 7	Thrinaxpalm 108	Vingnöt 80
Skarlakanmalva 47	Spindelträd 79. 99	Thunbergia 35	Vinruta 10
Skarletpelargonia 70. 104	Spiralfrukt 107	Tidlösa 54. 85	Vintergröna 89
Skogsklöver 14	Spiralpalm 104	Tigerlilja 99	Vinterkrasse 55
Skogsrefva 33. 78. 96	Springgurka 46	Timjan 10	Vinterlöfkoja 21. 84
Skogstulpan 62	Spriträter 5	Tjärblomster 50. 58. 87	Vinterlök 10
Skogsärtå 47. 59. 88	Stenbräcka 61. 88. 106	Tobak 15. 29	Vintersallad 9
Skorzonera 4	Stenlind 80	Toffelblomster 38. 64. 94	Vinterspenat 7
Skriftblomster 42	Stensöta —	Trifft 52	Virginia-ceder 79
Skålblomster 35	Stenör 51. 84	Trollbär —	Virsing 3
Skägg-gräs 27. 32. 91	Stjernblomster 37. 52	Try 30. 49. 71. 82. 107	Viol 25. 62. 89
Skärmrefva 35	Stjernfloka 53. 85	Troll-lök 51	Vårbrodd 12. 31
Sköldblomster 54. 85. 92	Stjernfur 75	Trumpetblomster	Vårtkaktus 102
Skönhetssöga 38	Stinknässa 30. 61 25. 33. 64. 78. 93	Vätgtörne 81. 83
Slottergröe 13	Stjufmorsblomster	Try 80. 83	Vägvärda 59. 88
Smultron 76 13 25. 84. 89	Tuberos 105	Välksa bönor 6
Smultronspinat 38	Stockros 25. 37. 51. 84	Tubrefva 35	Vändelrot 62. 89
Smultronträd 64	Storknäbb 56. 86. 100	Tutfåtel 12	Zellernötter 76
Smörblomster 60. 88	Stormhatt 51. 84	Tulpan 62. 89	Zirbelnötter 75
Snabellilja 97	Strandfur 75. 80	Tuppufvud 56. 101	Zinnia 26. 50
Snittsallad 8	Strandhafre 13	Tuppkkam 25. 84.	Akerhirs 31. 32
Snäsklöver 45	Strandkål 7. 54	Turban-aster 18	Akerkrans 36. 51
Snöboll 72. 83. 108	Strandlöfkoja 39	Turbanpumpa 12. 33	Akerkulla 37
Snöbär 82. 83	Strandvallmo 56	Turkist hvide 30	Äkersallad 9
Snödroppe 86	Strålblomster 42. 68	Turnips 14	Ålandsrot 29. 57
Snöpäron 30	Strålträs 31	Tusensköna 53. 85	Äggplanta 49
Sockerbetor 15	Strutbräken 107	Tårgräs 31	Akta kastanje 76
Sockerbirs 15. 29	Studentneglika	Tåtel 32	Törnros 81. 83
Sockerlönn 77 51. 58. 87	Ullgräs 28. 32	Ulltistel 29
Sockerpalm 92	Stångböna 6	Underträd 30. 84	Underblomster 26. 46
Sockerrör 106	Sumakträd 81	Värgböna 44. 58. 87	Underträd 30. 84
Sockerrötter 5	Sumpblomster 44	Vargmjöll 41. 99	Värtblomster 25. 34. 87
Sockerärter 5	Surtörne 64. 77. 83. 93	Vattengrä 13	Ärtträd 66. 78. 83
Solvän 43	Svalrot 52. 64. 85	Vattenmelon 11	Österrikisk fur 75
Solvärd 43	Svartpoppel 80	Vaxblomster 39	
Solvända 57	Svartrot 89		
Solvändare 42	Svenskt kaffe 6		
Sommarendivie 8	Svensk turnips 14		
	Svingel 13. 32		
	Sykomorlönn 77		
	Syra 7. 30		





Rosen-Aster.