


Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.







Biomedicinska biblioteket

PERIODIKA


87.260.

*Medicinsk
material DS*



BIOMEDICINSKA
BIBLIOTEKET





Barnmorskeläroanstalten
Göteborg

BARNBÖRDSHUSET

ÅRSBERÄTTELSE 1922

UTARBETAD AV

L. LINDQUIST och N. BOTHÉN
ÖVERLÄKARE AMANUENS
GÅNGVÄRDEN (OBSTETR. AVD.)

SAMT

H. BENCKERT
BITR. LÄKARE
(GYNEK. AVD.)

Barnbördshuset
Göteborg

BARNBÖRDSHUSET

ARBETSREGLER FÖR 1923

GÖTEBORG 1923
GÖTEBORGS LITOGRAFISKA AKTIEBOLAG

Årsberättelse för 1922 från Göteborgs Barnbördshus.

1. Under året intagna och avförda.

Grupp	Intagna										Avförda		
	Under 20 år	20-30 år	30-40 år	Över 40 år	Ogifta	Giffta	Änkor och från-skilda	Förstföderskor	Omföderskor	Summa intagna	Summa avförda	Därav	
												döda	till sjukhus
A	154	1583	903	189	167	2201	11	1108	1721	2829	2829	14	28
B {	a	8	90	47	14	—	—	—	—	159	159	1	1
	b	(pat. intagna å Gynek. avdelningen)								266	261	4	17

Kvarligg. d. ¹/₁, A: 47;

B: { a 0

 b 5

d. ³¹/₁₂, A: 47; därav oförl. B: { a 0

 b 10

Anm. Antalet intagna i grupp A skall med frånräknande av kvarliggande oförlösta vara lika med summan av barn och missfall med vederbörlig reduktion för flerbörder. — Grupp B upptager kvinnor med hotande missfall, påbörjat men avstannat förlossningsarbete, blödnigar, gynekologiska fall m. m., som inkommit på barnbördshuset, men ej blivit förlösta därstädes.

2. Fosterlägen.

Nack- bjudning	Hjäss- bjudning	Pann- bjudning	Ansikts- bjudning	Sätes- och fotbjudning	Tvär- och snedläge	Obestämt läge	Summa fosterlägen
2414	71	4	3	101	6	24	2617

Bland obest. lägen: Kejsarsnitt: 6

Förlöst före ink.: 14

3. Dödsorsaker bland på anstalten avlidna kvinnor.

Journal-nummer	Dödsorsak
Förlossn.-afd.	
78	Eclampsia gravidarum.
268	Influenta epidem. c. Bronchopneumon. + Abort (mens VII).
369	Graviditas extrauterina (fullgången).
794	Salpingoophoritis purulenta exacerbata.
935	Sepsis puerperalis.
942	Nephropathia gravidarum + Hæmorrhagia p. p.
1264	Vitium organ. cordis incomp. Oedema pulmon.
1547	Sepsis puerperalis(?).
1882	Eclampsia gravidarum + Trombosis cerebri.
2298	Endocarditis septica c. abort. (mens V).
2500	Abscess. ovarii rupta c. peritonit. ac. purulent. (p. abort).
2521	Septicæmia p. abort. (mens V).
2637	Eclampsia parturientium + Vitium. org. cord. (mitral. et aort.).
2741	Nephritis chronica c. hepatit. parenchym. diff. ac. (graviditetstoxikos).

13. a LHM

Carus + Gahrstedt

4. Till sjukhus eller annan vårdanstalt avförda kvinnor och barn.

Journal-nummer	Sjukhus	Sjukdom
80	Epidemisjukhuset	Typhus abdominalis.
394	Gibraltars tbc-avdelning	Tbc. pulm. ambor.
767	Holtermanska sjukhuset	Gonorrhoea.
957	Epidemisjukhuset	Paratyphus.
1038	Holtermanska sjukhuset	Lues.
1072	Sahlgrenska	Bronchopneumonia.
1210	"	Vitium org. cord. incomp.
1240	"	" " " "
1451	Welanderhemmet	Lues.
1887	Barnsjukhuset	Debilitas congenita.
2040	Holtermanska sjukhuset	Gonorrhoea.
2148	Barnsjukhuset	Debilitas congenita.
2153	Sahlgrenska sjukhuset	Psycosis.
2200	Holtermanska	Lues.
2261	"	"
2277	Sahlgrenska	Myocarditis + Pyelitis
2280	"	Tbc. pulm.
2316	"	Abscess, pulmon. p. oper. (Sectio Cæsar).
2318	"	Nephritis chronica
2327	Barnsjukhuset	Debilitas congenita
2365	"	"
2422	Sahlgrenska sjukhuset	Blenorrhoea gc.
2460	"	Nephritis chron.
2649	Gibraltars tbc.-avdeln.	Tbc. pulm.
2680	Holtermanska sjukhuset	Scabies.
2685	Sahlgrenska sjukhuset	Vitium org. cord.
2753	Barnsjukhuset	Ileus.

5. Sjukdomar och oregelbundenheter hos intagna barnaföderskor.

	Antal fall	Journalnummer	
Albuminuria	412		
Nephropathia gravidarum	65		
Eclampsismus	21	208, 397, 822, 980, 1096, 1163, 1224, 1384, 1508, 1585, 1805, 1807, 2139, 2222, 2255, 2278, 2484, 2491, 2496, 2587, 2618.	
Eclampsia {	gravidarum	5	38, 78, 1502, 1882, 2514.
	parturientium	7	1087, 1226, 1881, 2086, 2277, 2515, 2637.
	puerperarum	3	403, 782, 2281.
Nephritis	13		
Neuroretinitis albuminurica	—	(Se Nephritis)	
Pyelitis, pyelonephritis	38		
Cystitis	19		
Hydramnion	6		
Mola hydatidosa	3	381, 728, 2170.	
Placenta prævia totalis	2	574, 2141.	
„ „ partialis	6	309, 319, 1097, 1318, 2316, 2633.	
Ablatio placentæ præmatura	13	434, 921, 1710, 1771, 1807, 1819, 1860, 1863, 2030, 2085, 2264, 2318, 2785.	
Pelvis justo minor	13	371, 478, 485, 559, 652, 714, 775, 813, 1276, 1633, 2472, 2787 + 1134 (relat. bäckenförträngning).	
Myoma uteri	6		
Salp. ooph. p. p.	5		
Tumor ovarii (Cysta)	1		
Prolapsus funiculi	9		
„ extremitatum	1		
Ruptura vaginæ	3		
„ cervicis	1		
„ perinei completa	7		
Hypotonia uteri et musc. abdom.	79		
Retentio placentæ totalis	19		
„ „ partialis	18		
Retentio velamentorum tot.	11		
Hämorrhagia (gravis) sub et post partum, > 600 cm.	212		
Abortus mensium 1—3	155		
„ „ 4—7	88		
Partus præmaturus	142		
Graviditas extrauterina (fullg.)	1	369.	
Hämatoma vaginæ et vulvæ	2		
Febris resorptionis in partu (abortu)	6		
Febris resorptionis in puerp.	27		
Parametritis. Pelveoperitonitis	1		
Sepsis puerperalis	3	f. ö. (se gyn.).	
Trombophlebitis v. saphenæ	25		
„ iliac. et cruralis	26		
Lymfangitis mammae	42		
Mastitis	8		
Angina tonsillaris	2		
Hæmiplegia	1		
Thrombos. cerebri	1		
Hymen biforus	1		
Lochiometra	11		
Fistula ani	1		

	Antal fall	Journalnummer
Endocardit. sept. (in gravid)	1	
Embolia pulm.	3	
Kyphoscolios. rhach.	1	
Tuberculosis pulmonum	21	
Syphilis	20	
Gonorrhœa	5	(se gyn.)
Diabetes mellit.	1	
Anæmia	3	
Epilepsia	2	
Psycosis	2	
Morbus Basedowii	1	710.
Andra nervsjukdomar	3	
Vitium organicum cordis	15	
Varices	70	
Pneumonia acuta (Influens.)	10	
Otitis media pur.	1	
Andra andningsorganens sjukd.	10	
Appendicitis	—	(se gyn.)
Cholelithiasis	2	
Andra matsmältningsorganens sjukdomar	1	
Muskelnas, ledgångarnas och bensystemets sjukdomar	3	
Hudens sjukdomar (Scabies)	2	
Erysipelas	1	
Sublimatexcem	5	
Foglossning	4	608, 1090, 2048, 2587.
Polyp. urethræ	1	
Prolapsus uteri	2	
Hotande uterusruptur	3	51, 714, 1184.
Typhus abdominalis	2	
Panaritium	2	
Periostitis alveol.	2	
Dacryocystit phleg.	1	
Dermoid. sacral. inf.	1	

6. Digivning.

Antal mödrar (under året intagna), vilkas barn fått endast moderns mjölk	2469
D:o vilkas barn fått moderns mjölk + konstgjord föda	5
D:o oförmögna till digivning på grund av sjukdom	13
vårtornas beskaffenhet	3
dålig mjölkavsöndring	2
Summa mödrar	2492

7. Förlossningsoperationer.

O p e r a t i o n	Antal fall	Journal- nummer	A n l e d n i n g
Kejsarsnitt, abdominalt.....	6	{ 775. 309, 547, 2361, 2633. 1096.	Pelvis justo minor. Plac. prævia. Eclampsism + Suspicio rupt. uteri in cicatr. p. Sect. Cæsar.
Kejsarsnitt, vaginalt	2	{ 1887. 1807 2445.	Eclampsism. + Ablat. plac. præm. Hotande fosterasfyxi.
Operation för utomkvedshavandeskap	1	369.	Fullg. X-grav. (se i övr. gyn.).
Hysterotomia vag. (mens V)	1	1395.	Hæmorrhagia in gravid.
Yttre vändn. på säte.....	1	1948.	Tvårläge. {Seks värksvagh. 3. {Snedläge 1.
Nedtagning av en fot	4		{Seks värksvagh. 3. {Snedläge 1.
Nedtagning av fötter + Extract.....	4		Seks värksvagh.
Inre vändning på fot	2	319, 1097.	Placenta prævia partial. {Tvårläge 4. {Primär värksvagh. + Hy- dramnion.
D:o med utdragning	5	1905.	{Primär värksvagh. 1. {Prolaps. funic. 1.
Utdragning på säte, manuel	2		Värksvagh.
” ” ” instrumental.....	1		{Fosterasfyxi 2. {Vitium org. cord. 1.
” ” fot.....	3		Tbc pulm. Eclampsism.
Utdragning med tång	151	{ 1 (2711). 1 (2491). 2 (1163, 2496). 5 (38, 1226, 1882, 2514, 2515).	” + värksvagh. Eclampsia. Fosterasfyxi. Seks värksvagh.
		63.	
		53.	
		2.	” ” + Feber.
		21.	Primär ”
		1.	” ” + Feber.
		2 (535, 2335).	Prolapsus funiculi umbil.
		51.	Hot. Uterusrupt. (dött foster).
		714.	” ” + Pelv. just. minor + Pannbj. (lev. fost.).
		1134.	Hot. Uterusrupt. + Relat. bäckenförtr. (lev. foster).
Borring och utdragn. med kranioklast.	9	559.	Pelv. just. minor + Feber, (dött foster).
		1086, 1276, 1640, 1547. 2277.	Primär värksvagh. (dött fost.). Dött foster.
Huvudets avtagande och fostrets ut- dragning	2	2352, 2787.	” ” + Eclampsi.
Utpressning av efterbörden ur livmo- derhålan under de 3 sista hav.-mån.	7		Försummat tvårläge.
Inre lossande och uttagande av efter- börden	19		Ret. placent. c. hæmorrh.
Uttagande av kvarhållen moderkaksbit	17		” ” ” ”

O p e r a t i o n	Antal fall	Journalnummer	A n l e d n i n g
Abortoperation	181		
Skrapning för Mola hydatidosa.....	3	351, 728, 2170.	Mola hydatidosa.
		(177.	Ablatio plac. præmat.
		38, 1882.	Eclampsia gravid.
		2514.	
		144, 1887.	Nephritis chron.
		2449.)	
		2682.)	Hæmorrhagia in gravid.
Framkallande av förtidig börd	16	451.	Tbc. pulm.
		1210.	Vitium org. cord.
		710.	" " " + Morb.
			Basedowii.
		2306.	Nephropathia grav. + dött foster.
		208, 1224.	Eclampsism.
		1585, 2618.	
		(1683.	Vit. org. cord.
		1739.	Hydramnion.
		1835.	Nephropathia grav. + Missed abortion.
Framkallande av missfall.....	20	2231, 2460, 2559.	Nephritis chron.
		1395, 1950, 2363, 2524.	Hæmorrhagia in gravid.
		96, 307, 394, 568, 581, 665, 1487, 2280.	Tbc. pulm.
		376, 1499.	" "
			+ steril-op.
Reposition av framfallen navelsträng	2		
Utvidgn. av moderhalsen med ballong	1		
Episiotomi i samband med annan oper.	59		Primär värksvaghet.
„ + Expressio	16		{ Prolapsus funiculi 2.
			{ Sek. värksvaghet 4.
			{ Fosterasyxi 10.
Exstirpation	1		Polyp. cervic. uteri.
Suturering.....	9		{ Ruptura vaginæ 2.
			{ „ total. perin. 7.
Incisio	9		{ Hæmatoma vaginæ 1.
			{ Mastitis phlegmonosa 8.

8. På anstalten födda barn.

<i>Summa levande födda</i>	2553	<i>Summa dödfödda</i>	64
Levande födda, fullgångna.....	2430	Dödfödda, fullgångna.....	45
Av dem mankön.....	1229	Av dem mankön.....	29
" " kvinnkön.....	1201	" " kvinnkön.....	16
Levande födda, ofullgångna.....	123	Dödfödda, ofullgångna.....	19
Av dem mankön.....	55	Av dem mankön.....	10
" " kvinnkön.....	68	" " kvinnkön.....	9

Summa enkelbörder 2557; Summa tvillingbörder 27; Summa trillingbörder 2.

9. På anstalten avlidna barn.

	Efter naturlig förlösning	Efter utdragning på säte eller fot	Efter tångförlösning	Summa	Anmärkingar
Under 1:sta levnadsdygnet	21	—	4	25	Därav 2 monstra.
" 2:dra "	7	2	3	12	" 1 Vit. org.
" 3:dje "	4	—	4	8	cor.
Övriga	5	—	2	7	" 1 Melaena.
Summa	37	2	13	52	

10. Dödfödda samt dödsorsaker bland på anstalten avlidna barn.

	Antal fall	Journalnummer
<i>Dödfödda.</i>		
Döda före födelsen	31	
" under " av kvävning	28	
" " " " annan orsak.....	5	
Summa dödfödda	64	
<i>Dödsorsaker bland på anstalten avlidna barn.</i>		
Missfoster och bildningsfel	2	1876, 2158.
Ofullgångenhet	30	
Melaena neonatorum	2	270, 1389.
Hæmorrhagia cerebri	11	
Medfödd syphilis	1	
Pneumonia	3	
Vitium congenitum cordis	2	799, 1356.
Hæmorrh. ren. bil.....	1	2533.
Summa avlidna barn	52	

11. Levande utskrivna barns sjukdomar under vistelsen på anstalten.

	Antal fall		Antal fall
Kephalhämatoma	2	Bronchitis acuta	4
Melaena neonatorum	3	Hæmorrhagia cerebri	1
Blennorrhæa gonorrhœica	2	Tumor frontis	1
„ non gonorrhœica	17	Hæmorrhagisk diates	1
Paresis nervi facialis	1	Abscessus	2
„ brachii (Erb.)	1	Dacryocystitis	1
Fractura claviculæ	1		

12. Missbildningar.

	Antal fall	Journalnummer
Monstrum	2	1876, 2158.
Acrania	1	926.
Cheilognathopalatoschisis	1	
Spina bifida	2	
Labium leporinum	2	
Pes varus, valgus	3	
Polydactylia	2	
Hypospadiæ glandis	2	
Syndactylia	1	
Amputatio dig. III man.	1	

13. Sjukdomar hos på anstalten vårdade, men där icke förlösta kvinnor.

	Antal fall
Graviditas	90
Abortus imminens	27
Albuminuria	9
Nephropathia gravidarum	9
Pyelitis	10
Gravidit. + Vit. org. cord. + Tbc. pulm.	1
Infl. epid.	3
Psycosis	1
Gravid. + Tbc. ren.	1
Polyarth. rheum. ac.	1
Ileus + Graviditas	1
Hyperemesis	3
Ca. ventric. c. metastas. periton.	1
Cholelithiasis	2

15. Sjuk- och obduktionsberättelser till dödsfallen.

I. Å Förlossningsavdelningen (grupp A).

1. N:o 78. A. L. S. M. 25 år, gift II-p. Sjuknade 9/1 med upprepade konvulsionsanfall, inga värkar. Inkom samma dag, rikligt med äggvita i urinen, blodtryck 130. I. u.: Cervix utplånad, m. m. öppen för ett finger, venesectio (500), hinnsprängning. Partus 5½ timmar efter inkomsten, dött foster. Pat. hade haft c:a 20 anfall före förlossningen och hade 137 efter. Mors 11/1.

Diagnos: Eclampsia gravidarum (mens VII).

P. A. D. Nephritis (sub) chronica parenchymatosa + Degeneratio lev. et haemorrhagiae minimae hepat. + Oedema cerebri + Bronchopneumonia part. et confluent. pulm. amb. (Eclampsia gravid.)

2. N:o 268 G. M. S. 24 år, gift I-p. Inkom 30/1, spontan abort (mens VII) samma afton. Mors 31/1.

Diagnos: Influenta epidemica c. bronchopneumonia bil. + Graviditas (mens VII).

3. N:o 369. H. Ch. K. 40 år, gift V-p. Inkom 8/1 med smärtor i buken. Sista regleringen 6/4. Status: Buken starkt utspänd, ymnigt barnvatten. Fosterläget obestämbart. Inre undersökning: Försök att spränga hinnorna, vilket misslyckades. Rtgn. 10/2: Fullgånget foster i vänstra delen av buken, i längdriktning bjudande sätet.

Först härefter uppgav pat., som var nästan stendöv, att hon under havandeskapet haft upprepade svindelanfall och buksmärter.

Op. 11/2 (Prof. Lst) på indikation: X-graviditet. Efter öppnande av buken framträdde genast fostersäcken, som innehöll ett fullgånget dött foster + abnormt mycket fostervatten. Tarmar och oment skjutna uppåt. Fostersäcken gick lätt att lossa, men vid försök att lossa placentan uppstod en ostillbar blödning varför op. måste avslutas efter tamponad. Pat. avled efter 8 timmar under tecken på förblödning.

P. A. D. Graviditas tubar. abdominal. + Anaemia excessiva.

Fallet kommer utförligare att publiceras.

4. N:o 794. A. E. P. 45 år, gift XII-p. Inkom 2/4 med svaga värkar; under urinering hinnebristning och navelsträngs prolaps. Vid i. u. omedelbart efteråt inga pulsationer, cervix öppen för två finger, delvis bibehållen.

Spontan förlossning 4/4. Total hinnretention. Under och efter partus frossbrytningar och feber med remitterande hög feber.

10/4. Stort vänstersidigt infiltrat i bäckenet. Fortskridande försämring. Mors. d. 18/4.

Diagnos: Sepsis puerperalis.

P. A. D.: Saloingo-oophoritis purulenta exacerbata sin. + Thrombophlebitis v. ovaric, et haemorrhoid. sup. et. meseraic. + Abscessus intraabdominalis.

5. N:o 942. A. O. J. 29 år, ogift I-p. Inkom 22/4 med värkar.

Status: Sned i högra höften och skuldran. Alb. 1 %. Bäcknutgångstång 23/4 på indikation hotande fosterasfyxi (temp. 39.3). Omedelbart efter fostrets framskaffande en ganska kraftig ihållande blödning, trots hypophysininjektion, varför gjordes manuell placentarlösning, varefter blödningen helt upphörde. Sammanlagda blödningar 12—1500 cm.

Trots hjärtstimulans och subcutan NaCl-injektion avtynade pat. under symptom på förblödning. Mors 12 timmar efter förlossning.

Sektion vägrades.

Diagnos: Haemorrhagia p. p. + Nephropathia gravidarum.

6. *N:o 935. V. E. B.* 25 år, gift II-p. Inkom 22/4. Sista menses 16/8.

Spontan förlossning 5 timmar efter inkomsten. Omedelbart efter partus varit mycket orolig och stigit upp ur sängen. 25/4 frysning och temp. 40.6. Låg med upprepade frossbrytningar och remitterande feber utan andra lokala symptom än någon ömhet och utfyllnad vid högra uterusranden. Mors 29/5.

P. A. D. Endometritis (septica) fere sanata c. septicæmia sec.

7. *N:o 1264. A. A. H. L.* 33 år, gift II-p. Behandlats för hjärtfel sedan flera år. Sista menses 18/11. Värkarna började 4/6. Inkom hit 5/6, starkt inkompenenserad, cyanotisk, med lungödem, hade inga värkar. Sätetsbjudning. Stimulerades kraftigt. Värkarna började åter. Efter hinnsprängning och ett par timmars värkar gjordes utdragning på säte, manuellt. (Bothén). Stimuleringen fortsattes ehuru utan resultat. Mors 6/6, 12 timmar efter förlossning. Barnet vägde 1990 gr., dog efter ett dygn.

Diagnos: Vitium organ. cordis incompen. c. Oedem. pulmon.

8. *N:o 1547. H. V. R.* 30 år, gift I-p. Inkom 11/7. Sista reglering 26/9, värkar började 11/7 kl. 3 fm.; till en början svaga, senare på dagen starkare. Stort foster, pannbjudning. Vattnet gick samma dag kl. 11 fm. Trots starka värkar fortgick förlossningsarbetet långsamt. 12/7 kl. 10 fm. gavs morfin, för att pat. skulle få vila. Efter två timmar ånyo kraftiga värkar. Kl. 5 em. blevo fosterljuden oregelbundna. På grund härav gjordes (Benckert) vid utplånad modernmun och huvudet strax ovan sittbenstaggarna tångförsök, som misslyckades, och omedelbart efteråt, när fosterljuden upphörde, perforation + kranioklasi + extraktion. Manuell placentalösning. De närmaste dagarna efter partus gott allmäntillstånd, men temp. upp till 38.3 på kvällarna. Så småningom symptom av trombos i bäckenkärlen, (ödem i benen). 27/7 frysning, temp. 38.8 och symptom av lungemboli. — Under den följande tiden upprepade anfall av lungembolier och 13/8 mors. — Ingen sektion.

Diagnos: Thromboohlebitis pelvis (septica?) + Embolia pulmonum.

9. *N:o 1882. K. E. T. O.* 29 år, änka, II-p. Sista menses 15/1. Inkom hit 16/8. Hade veckan förut haft eclampsism-symtom. I hemmet haft tre eclamp-tiska anfall inkomstdagen. Vid hitkomsten vid fullt medvetande, blodtryck 160. Venesectio + Stroganoff. Inget anfall efter hitkomsten. Blodtrycket steg följande dagar till 200, varför hinnstick gjordes 24/8. Forceps (utgångs) anlades 25/8 (Bothén). Normalt puerperium. Sjunkande blodtryck, efter 5/9 mellan 130—140. Kläder 17/9. Thrombus i benen 20/9. Thrombosis cerebri 3/10. Mors 7/10. *P. A. D.* Thrombus, sin sagittal. et ven. cerebri c. encephalomalac. et haemeohhag. minim. sec. + Bronchopneumoniae dx. + Bronchopneumoniae dx. + Tubercul. ren. dx.

10. *N:o 2298. G. L. M. F.* 21 år, og. III-par. Inremitterad från Sahl-grenska sjukhuset, där hon vårdats för Endocarditis septica.

Status vid inkomsten 14/10: Usel, omtöcknad. Gravid i VI månaden. Vatt-net gått för 2 timmar sedan. Låg 4 dagar med frysningar och starkt remmitterande feber samt svaga värkar. Förlöst spontant 18/10. Mors 19/10.

Sektion: Septicæmia.

11. *N:o 2,500. R. M.* 33 år, VI-par. Amenorrhoe i 3 mån. Aborterat i hemmet 15/11. Inremitterad hit för blödning, samma kväll

Status vid inkomsten: Afebril, blek, ringa blödning. I uterus stora placenta rester, som löstes manuellt. Härvid riklig blödning, varför skrapning med trubbig slev gjordes (Bothén). Fullständig normal temp. t. o. m. 27/11. Första 4 dagarna efter skrapningen urin-mängd 150 cm. och kräkningar. 28/11 frysning och temp. 39,8, samt smärtor och défense över nedre 1/3 av buken. 29/11 Bim: Bakåt och till höger om uterus en starkt ömmande resistens. 0 fluktuationer. Då peritonitsymptomen ökade gjordes lap. (Lindquist) 1/12 med drainage av varhåla i bäckenet. Tillståndet försämrades. Mors 4/12. *P. A. D.* Abscess ovarii rupta c. peritonit. ac. purulent. (Abort [provoc?]).

12. *N:o 2,521. E. V. G.* 41 år, IX-par. Sista menses 14/6. Ringa blödning och värkar 11/11, fortsatte till 16/11, då ägget avgick. Blödningarna fortsatte och temp. steg till över 39, med upprepade frysningar. Vid inkomsten hit 19/11 starka frysningar, 39,3 och tämligen riklig blödning. Exaeresis man. et instr. (Bothén). Följande dagar omkring 40,5 och fortskridande försämring. Mors 23/11. Septicæmia p. abort. (mens V).

13. *N:o 2637. O. C. J.* 40 år, gift VII-p. Sista menses slutet av mars. Sista tiden av grossessen haft eclampsism-symptom. 5/12 kl. 1 fm. fått eclamp-tiskt anfall, som följts av ytterligare fyra. Förlöstes från dött foster i hemmet utan sakkunnig hjälp kl. 5.30 fm. Inkom hit 5/12 kl. 6.40 fm. Temp. 38,6. Puls 120. Medvetslös. Cor: Förstorat, starkt stoliskt blåsljud. Arythmia perpetua. Fick Mo +. Och kraftig hjärtstimulans. Inget anfall efter hitkomsten. 6/12 medvetandet klarare, puls sämre. 7/12 Mors.

Diagnos: Eclampsia parturient. + Vitium organ. cord.

P. A. D.: Nephrit-nephros (chon, et) acuta + Vitium org. cord. (mitral et aortae).

14. *N:o 2741. H. M. E.* 31 år, gift II-p. Fullgången. Svullnad i benen hela grossessen. Sista mån. flimmer för ögonen. Sjuknat 17/12 med andnöd, kräkningar och svåra smärtor i epigastriet. Inkom 18/12 kl. 12,45 fm. Temp. 36,5, blodtryck 220, alb. ++, stark oro och dyspnoe, tydlig förstoring av hjärta och lever med ömhet i epigastriet samt ödem till navelplanet. Venesection (500), stimulans. Subjektivt förbättrad. Värkar började 18/12 kl. 3 fm. Fosterljud hade ej med säkerhet kunnat höras. Bäckenutgångstång på kvällen samma dag. Följande dagar blodtryck omkring 150. Alb. ++. Urin-mängd 100—300 cm. Stimulans. 23 akut hjärtsvaghet, mors.

Diagnos: Graviditetstoxikos.

P. A. D.: Nephrit. chron. parenchym. c. exacerb. acut. + Atrophia hepat. ac. + Hypertrofia et myodegeneratio cordis + Oedema et hypostasis pulm. amb. + Hyperplasia lienis ac.

II. Å Förlossningsavdelningen (grupp B:a).

15. *N:o LXII. H. J. K.* 34-årig I—p. Inkom 6/5. Död 1/6. Cancer ventriculi c. metastas. hepatis et peritonei + Graviditas (mens VI—VII).

III. Å Gynekologiska avdelningen (grupp B:b).

16. *N:o 34. M. J.* 48 år, gift V—p. Veckan före inkomsten värk i buken och feber. Inkom 10/2.

Status: A. T. gott. Bimanuellt: portio palpabel högt upp bakom symfyen. Bakre fornix starkt frambuktad av en halvfast tumör, som fullständigt utfyller

bäckenet, och når upp till 2 tvärfinger nedanför naveln. Tumören är föga förskjutbar och kan ej skiljas från uterus. Följande dag på em. plötsligt svårare smärtor och en känsla av svimning. Status då: Puls ej kännbar, cyanotisk, kall.

Diffus peritonitretning. Op. efter en timma (Benckert): Laparotomi; rikligt med var i buken. Trots kraftig stimulans mors på bordet.

Diagnos: Pyosalpinx c. peritonit. diffusa.

17. N:o 67. A. T. 31 år, gift IV-p. Behandlats för Tbc pulm. sedan 1913 avläkare, som konstaterat försämring under föregående grossesser, varför pat., som var gravid i andra mån., remitterats hit för abort. provoc. + steril.-op. Op. 29/3 (Benckert) Abort. provoc. + Salp. ectomia bil. 3/4 frysning, temp. 40.1. Bronchopneumonia bil. 9/4 A. T. betydligt försämrat, höggradig cyanos och dyspnoe. Mors 15/4.

P. A. D. Endocarditis chron. fibr. (stenosis ost. venos. sin.) et acuta ulcerosa c. dilatata, et myodegenerat. cordis + Infarct. multiplic. pulmon. + Hyperplasia lien. subacut. + Nephrit. ac. + Bronchopneumoma subacut. bil. + Hyperplasia mecanica hepatis.

18. N:o 111. A. V. G. 41 år, gift VII-p. Förlöst i hemmet utan hjälp 24. Två dagar efteråt frysning och feber (över 39). Inkom 29/5, temp. 39.7, puls 120, starkt påverkad. Buk diffust uppdriven, ömmande mest över nedre 1/2. 31/5 erysipelöst utslag å ascrum, som spred sig ned över bägge benen. I övrigt inga lokal-symptom. Försämrades efter hand.

Mors 7/6. Diagnos: Sepsis puerperalis.

P. A. D. Endometritis septica c. peritonitide fibrin. circumscript. et septicaemia secund.

19. N:o 133. H. I. P. 35 år, gift VI-p. Förlöst utom anstalten 21/6. Normal partus. 23/6 frysning och 39.8, följande dagar hög feber. Inkom hit 27/6. Temp. 40.5. Puls 110. Inga lokal-symtom. 29/6 stinkande diarrhoer och temp. över 40. Mors 3/7.

Diagnos: Sepsis puerperalis.

P. A. D. „ „

16. Intagna, döda, underhållsdagar och platsantal inom olika betalningsklasser.

	Dag-avgift		Ordinarie antal sjukplatser vid årets slut	Antal patienter under året		Antal underhållsdagar för samtliga vårdade	Medeltal, vårdade pr dag	Högsta	Lägsta	Medellängd av sjukhusvistelsen, dagar
	kr.	öre		intagna	döda			antalet någon dag under året vårdade		
Enskilt rum	18	—	17	91	—	1188	80,95	103	63	9,08
„ „	12	—		308	4	2815				
Allmänt rum	7	50	79	532	2	4974				
„ „	2	75		1908	6	16297				
„ „	Ingen			416	7	4274				
<i>Hela barnbördshuset</i>			96	3255	19	29548	80,95	103	63	9,08

Sammanställning av 8 fall av Placenta prævia.

N:o	Journal N:o	Ålder	para	Fullg. ber. efter sista. regl.	Förlossnings-arbete	Behandling	Utgång för modern	Utgång för fostret	Anmärkingar
✓ 1	309	40	VI-p.	Ja	Nej	Klassiskt kejsarsnitt.	Utskr. fr. efter tre veckor, febril första veckan.	Utskr. lev. Vikt vid föd. 2800 gr., vid utskr. 2550 gr.	Upprepade blödningar under graviditeten. Häftig blödn. (500 cm ³) 6½ tim. efter ink. Os uteri öppen för ett finger, allmänna tillståndet starkt påväkat, puls hastig. <i>Plac. prævia part.</i>
✓ 2	319	25	II-p.	Nej	Ja	Vändning på fot + spont. partus + expr. plac.	Utskr. frisk elfte dygnet. Puerp. afebrilt.	Utskr. lev. Vikt vid föd. 2900 gr., vid utskr. 2600 gr.	<i>Plac. prævia part.</i>
✓ 3	1097	25	III-p.	Ja	Ja	Vändning på fot + spont. partus + Exaeres. man. plac.	Utskr. fr. efter tre veckor, febril åtta dagar (högst 39,6).	† under förl. Vikt vid föd. 2800 gr.	Komplikation: två eklamp-tiska anfall efter vändn. Urin 0 alb. Manuell lösn. på gr. av adhaerent plac. <i>Plac. prævia part.</i>
4	1318	37	III-p.	Ja	Ja	Hinnsprängning + spont. partus + Exaeres. plac.	Utskr. fr. efter två och en halv mån. Thrombo phlebit ven. femoral + emboli. pulm.	† före förlossn. (macererat). Vikt 3250 gr.	<i>Plac. prævia part.</i>
5	2316	38	III-p.	Ja	Ja	Klassiskt kejsarsnitt. (Häftig blödn. här 1½ lit.) Os uteri fingervid.	Utskr. med lungabscess tjugosjette dygnet till Sahlgr. sjukh. ¹⁾	Utskr. lev. Vikt vid föd. 3760 gr., vid utskr. ?	<i>Plac. prævia part.</i> ¹⁾ Pat. avled tre veckor efter utskr. (på Sahlgr. sjukhuset). Abscederande bronchopneumonier. Hade åtit frukost omedelbart före den häftiga blödn. som påford. op. Kräkn. under narkosen.
6	2633	26	II-p.	Ja	Nej	Klassiskt kejsarsnitt. (Häftig blödn. 1200 cm ³ efter ink.) Cervix bibehållen, fingervid.	Utskr. fr. efter 2½ mån. Thromb. phlebit. v. femor. bil. + Embolia pulmon.	Utskr. lev. Vikt vid föd. 3280 gr., vid utskr. 5500 gr.	Svimningar under slutet av graviditeten utan yttre blödn. <i>Plac. prævia part.</i>
✓ 7	574	36	VII-p.	Nej	Nej	Klassiskt kejsarsnitt (efter vändningsförsök), cervix öppen för nära två finger. Blödn. 800 cm ³ .	Utskr. fr. fjortonde dygnet. Febril fjärde dagen efter op. (högst 38,7).	Utskr. lev. Vikt vid föd. 2520 gr., vid utskr. 2700 gr.	<i>Plac. prævia totalis.</i>
8	2141	18	II-p.	Nej (7½ m.)	Ja	Hinnsprängning + nedtagning av fot.	Utskr. fr. åttonde dygnet.	† före inkomsten. Vikt 1970 gr.	<i>Plac. prævia totalis.</i> Upprepade blödn. före ink. Os uteri utplånad, fylld av den prol. plac.

Sammanställningen omfattar 6 fall av praevia partialis och 2 fall av praevia totalis.

- 3 voro II-parae resp. 18, 25 och 26 år.
- 3 voro III-parae resp. 25, 37 och 38 år.
- 1 var VI-parae 40 år.
- 1 var VII-parae 36 år.

Fem av fallen voro fullgångna och tre ofullgångna.

I ett fall (1,318) skedde partus spontant efter hinnsprängning, i två fall (319, 1,097) efter vändning på fot och i ett fall (2,141) efter nedtagning av fot; i ej mindre än fyra fall (309, 574, 2,316, 2,633) har klassiskt kejsarsnitt utförts. I alla dessa hava pat. hotats av synnerligen ymniga blödningar under det att mjukdelarna ej varit tillräckligt förberedda för utförande av vändning på fot.

I ett fall (574) hade först gjorts yttre vändning på säte, men det visade sig sedan ej möjligt att genom den för knappt två finger vida och oeftergivliga cervix nedhämta en fot och då pat. redan blött 800 cm. beslöts skrida till sectio Caesar. I tre fall har placentaroperation verkstälts: en expressio och två manuela lösningar.

Alla mödrarna hava lämnat anstalten levande, — en (1,316) förlöst genom kejsarsnitt, avled 3 veckor efter utskrivningen på Sahlgrenska sjukhuset av abscederande pneumonier, med visshet uppkomna ex. inhalatione av under nar-kos uppkräkt ventrikelinnehåll.

Av övriga tre kejsarsnitt voro två febrila under fyra resp. sju dagar utan påvisbar orsak. Ett fick bentromber + sekundär lungemboli.

I ännu två fall förlöpte puerperiet febrilt med resp. 21 dag. och 2¹/₂ mån. sjukhusvistelse, i sistnämnda fall bentromb och lungemboli. 5 barn utskrevos levande. Ett (vikt 2,800 gr.) dog under förlossningen, 2 foster (därav ett macerat) döda under inkomsten.

Mortalitet: för mödrarna 16,6 %, för fostren 37,5 %.

Sammanställning av 45 fall av Placenta prævia å Göteborgs Barnbördshus under åren 1918—1922.

	Placenta prævia total	Placenta prævia partial	Resultat för mödrarna		Resultat för fostren			Anmärkningar
			Lev. utskr.	Död utskr.	Levande födda		Dödfödda	
					Lev. utskr.	Död utskr.		
Spontan partus.		1918 — 1919 3 1920 — 1921 — 1922 —	— 3 — — —	— — — — —	— 2 — — —	— 1 ¹⁾ — — —	— — — — —	1) Vit. cong. cordis. (Vikt 2000 gr.) 2) Föreliggande pulslös navelstr. 3) Ej viabelt (850 gr.) 4) Foster macererat (3250 gr.) 5) Exæresis placentaë. Thrombophlebitis + Embolia pulmon.
Spontan partus efter hinnsprängning.		1918 2 1919 1 1920 1 1921 — 1922 1 ⁵⁾	2 1 1 — 1	— — — — —	1 — 1 — —	— 1 ³⁾ — — —	1 ²⁾ — — — 1 ⁴⁾	6) + 4½ tim. efter partus (2120 gr.) 7) † före inkomsten (1970 gr.) 8) Exæresis placentaë + Uterustamponad. 9) Exæresis part. placentaë på 17:de dygnet. 10) Bronchit. capillar. (sektion).
Nedtagning av fot + spontan partus	1	1921 1 1922 —	1 1	— —	— —	1 ⁶⁾ —	— — ⁷⁾	11) En med komplikation av Prolapsus funiculi; 2 övriga ofullg. 12) Ett foster under 2000 gr. Vid ett annat Prolapsus funiculi. Det tredje asfyktiskt, kunde ej upplivas (2100 gr.) 13) Avled efter 5 tim. (2190 gr.) 14) Vikt 2800 gr. 15) I ett fall med dött foster. Eclampsii + Exæresis placentaë.
Vändning på fot + spontan partus.	1 ⁸⁾ 1 ⁹⁾	1918 5 1919 1 1920 2 1921 5 1922 2 ¹⁵⁾	6 1 2 6 2	— — — — —	2 1 2 2 1	1 ¹⁰⁾ — — 1 ¹³⁾ —	3 ¹¹⁾ — — 3 ¹²⁾ 1 ¹⁴⁾	16) Tångindikation: värksvagheter. 17) I ett fall Exæresis placentaë + Uterustamponad. 18) Extraction på grund av temperaturstegring över ett dygn efter vändning. Cervixrupt. Thrombos + Emboli. † 19 dag. efter partus. 19) Båda döda före inkomsten. 20) Vikt 2740 gr. 21) > 3980 gr. 22) > 2000 gr. † 6 t. efter partus. 23) Exæresis placentaë. 24) Vikt 1220 gr. † före partus. 25) > 1030 gr. † 6 t. efter partus. 26) Tbc. pulmon. 27) † en t. efter partus. Vikt 1300 gr. 28) Ett fall med bentromb + lungemboli.
Hinnsprängning. Senare Forceps.		1920 1 ¹⁶⁾	1	—	1	—	—	19) Båda döda före inkomsten. 20) Vikt 2740 gr. 21) > 3980 gr. 22) > 2000 gr. † 6 t. efter partus. 23) Exæresis placentaë. 24) Vikt 1220 gr. † före partus. 25) > 1030 gr. † 6 t. efter partus. 26) Tbc. pulmon. 27) † en t. efter partus. Vikt 1300 gr. 28) Ett fall med bentromb + lungemboli.
Vändning + Extraction.	1	1918 4 ¹⁸⁾ 1919 1 1920 — 1921 — 1922 —	3 1 1 1 —	1 ¹⁷⁾ — — — —	2 — — — —	— — — 1 ²²⁾ —	2 ¹⁹⁾ 1 ²⁰⁾ 1 ²¹⁾ — —	19) Båda döda före inkomsten. 20) Vikt 2740 gr. 21) > 3980 gr. 22) > 2000 gr. † 6 t. efter partus. 23) Exæresis placentaë. 24) Vikt 1220 gr. † före partus. 25) > 1030 gr. † 6 t. efter partus. 26) Tbc. pulmon. 27) † en t. efter partus. Vikt 1300 gr. 28) Ett fall med bentromb + lungemboli.
Extraction på fot		1918 1 ²³⁾ 1919 — 1920 1 1921 — 1922 —	1 — 1 — —	— — — — —	— — — — —	— — 1 ²⁵⁾ — —	1 ²⁴⁾ — — — —	29) Alla fall med ymnig blödning och oförberedda mjukdelar. I ett fall av dessa lungabscess, död 3 veckor efter utskrivningen å Sahlgrenska sjukhuset, — räknas som död i mortalitetssiffran. 30) Avled med modern under narkosen (æther) före utförande av vändning (luftemboli).
Vagin. kejsarsnitt. Vändn. + Extract.		1920 1 ²⁶⁾	1	—	—	1 ²⁷⁾	—	Mortalitet för Mödrarna: 6,67 % D:o d:o (reduc. se not 29): 4,4 %
Abdominalt kejsarsnitt.	1 ²⁹⁾ 1	1919 — 1920 1 ²⁹⁾ 1921 — 1922 3 ²⁸⁾	1 1 — —	— — — —	1 1 — 4	— — — —	— — — —	Mortalitet för Fostren: 53,33 % D:o d:o (reducerad): 32,25 %
Oförlöst före ingrepp.	1	1920 —	—	1	—	—	1 ³⁰⁾ (ofullg.)	
Summa	7	38	43	2	21	8	16	
		45 fall		45		24		

Översikt över mortaliteten vid fall av graviditetstoxikos å Göteborgs Barnbördshus åren 1918—1922.

E c l a m p s i s m u s						
År	1918	1919	1920	1921	1922	1918—1922
Antal fall	13	11	12	12	21	69
Mortalitet för mödrar	—	9,09 %	—	—	—	1,45 %
Mortalitet för foster resp. barn.....	38,46 %	14,28 %	25 %	22 %	19 %	23,18 %
	5 † av 13	2 † av 14	3 † av 12	2 † av 9 ¹⁾	4 † av 21	16 † av 69
	1) 3 mödrar utgingo oförlösta.					
E c l a m p s i a g r a v i d a r u m						
År	1918	1919	1920	1921	1922	1918—1922
Antal fall	10	3	9	10	5	37
Mortalitet för mödrar	20 %	—	11,1 %	10 %	40 %	16,21 %
Mortalitet för foster resp. barn.....	36,3 %	66,7 %	66,7 %	60 %	60 %	57,89 %
	4 † av 11	2 † av 3	6 † av 9	6 † av 10	3 † av 5	21 † av 38
E c l a m p s i a p a r t u r i e n t						
År	1918	1919	1920	1921	1922	1918—1922
Antal fall	10	5	2	4	7	28
Mortalitet för mödrar	10 %	—	—	—	14,28 %	7,14 %
Mortalitet för foster resp. barn.....	27,2 %	40 %	—	25 %	28,57 %	27,58 %
	3 † av 11	2 † av 5	—	1 † av 4	2 † av 7	8 † av 29

Eclampsia puerperar						
År	1918	1919	1920	1921	1922	1918—1922
Antal fall	7	7	5	3	3	25
Mortalitet för mödrar	—	—	—	—	—	—
Mortalitet för foster resp. barn.....	12,5 %	—	—	—	—	3,7 %
	1 † av 8	7	5	3	3	1 † av 27

Graviditetstoxikoser						
År	1918	1919	1920	1921	1922	1918—1922
Antal fall	40	26	28	29 ¹⁾ (30)	36 ²⁾ (37)	159 (161)
Mortalitet för mödrar	7,5 %	3,8 %	3,57 %	3,4 % (6,4)	8,33 % (10,8)	6,28 % (6,82)
Mortalitet för foster resp. barn.....	30,2 %	20,7 %	31,03 %	34,6 % (37)	25 % (27)	28,22 % (29,09)

Mortalitet för mödrar döda i Eclamsi under åren 1918—1922 = 8,88 %.

» » fostren, vars mödrar dogo i Eclamsi under åren 1918—1922 = 37,97 %.

¹⁾ Tillkommer ett förut i dessa tabeller ej upptaget fall av akut leveratrofi hos 21-års kvinna som i föreg. års rapport upptagits under diagnosen graviditetstoxikos. Såväl moder som barn avledo.

²⁾ Tillkommer ett fall akut leverdegeneration (2741). Moder och foster avledo.

Sammanställning av 21 fall av Eclampsismus.

N:o	Journ. N:o	Ålder	-para	Fullg.	Tillstånd vid inkomsten	Tillstånd senare	Behandling	Utgång för modern	Utgång för fostret	Anmärkn.
1	208	36	I-p.	Nej	Allm. ödem. Huvudvärk. Blodtryck 210. Alb. 1,2 %. Hyalina cylind.	4 d. senare: Blodtryck 210. Alb. 2 %.	+ Mo + Venesectio 2 ggr med 3 d. intervall med tillfälliga subj. förbättringar. Därpå hinnst. efter 4 dagar spont. partus.	Utskr. 11 dygn. Afebril. Alb. 0,05.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 1600 gr., vikt v. utskr. 1650 gr.	
2	397	34	V-p.	Ja	Huvudvärk. Ögonflimmer. Blodtryck 185. Alb. 0,05 %. Värkar.	—	+ Mo. Venesectio 500. Vid öppnade. Mjukdelar: Forceps.	Utskr. 8 dygn. Afebril. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 3550 gr., vikt v. utskr. 3400 gr.	
3	822	36	II-p.	Nej	Svullnad i ögon- locken. Blodtryck 220. Alb. 0,8 %. Sediment: 0.	Efter 4 d. svår huvud- värk och flimmer för ögonen. Alb. 0,4 %. Blodt. 230.	Venesectio som upprepades 2 ggr. 2 veckor efter ink. Värkar och spont. partus.	Utskr. efter 7 veckor. Thrombos i benen. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 2100 gr., vikt v. utskr. 3000 gr.	
4	980	26	I-p.	Ja	Svullnad i ben. Kräkningar. Blodtryck 165. Alb.sp. Värkar. Vattnet gått.	—	Spontan partus.	Utskr. 8 dygn. Afebril. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 4000 gr., vikt v. utskr. 3850 gr.	
5	1096	26	II-p.	Ja	Svullnad i ben. Kräkningar. Alb. 0,8 %. Blodtryck 130—140.	Alb. 0,6. Blodtr. 155. Värkar efter 10 d. Sym- tom på ho- tande uter. rupt.	Abdominalt kejsarsnitt.	Utskr. efter 5 veckor. Puerp. komlic. av Pyelit + hjärtsvaghet. Blodtryck 125 Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 4290 gr., vikt v. utskr. 3670 gr. (efter 3 veckor).	Förlöst med ab- dominalt kejs- arsnitt 15 män. föret för Ecl. + Bäckenför- trängning. Albuminuri un- der hela sista graviditeten.

6	1163	26	I-p.	Ja	Ringa svullnad i ben. Huvudvärk. Kräkn. Smärta i epig. Blodtr. 175. Alb. 0,1 %.	—	+ Mo. Forceps för. sek. värksvaghhet + temp. stegring.	Utskr. efter 27 dag. Puerper. febrilt 11 dag. Ulcus puerper. Alb. 0.	† under förlösningsen. Vikt v. fød. 3100 gr.	
7	1224	40	II-p.	Nej	Svullnad i benen. Huvudvärk. Diarrhoe. Blodtr. 160. Alb. 0,2 %.	Efter 6 dag.: Blodtr. 165. Alb. 1,2 %.	Hinnstick. Värkar ett dygn senare. Spont. partus.	Utskr. 18 dygn. Afebr. puerp. Alb. 0. Blodtr. 135—140.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 1900 gr., vikt v. utskr. 1960 gr.	
8	1384	33	I-p.	Nej	Svullnad i ben. o. ögonlock. Ögonflimmer. Blodtr. 180—185. Alb. 1 %.	8 d. senare: Blodtr. 190. Alb. 0,5 %.	Venesectio 2 ggr. ¹⁾ Spont. partus.	Utskr. 14 dygn. Afebr. puerp. Blodtr. 110. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 2200 gr., vikt v. utskr. 2200 g.	¹⁾ Sista venesection dagen eft. partus, då blodtrycket steg till 205 samtidigt som hon fick huvudvärk, smärtor i epig. o. kvaljningar.
9	1508	25	I-p.	Ja	Svullnad i ben. Huvudvärk. Kräkn. Ögonflimmer. Urin: porterfärg. Blodtryck 160. Alb. 1,5 %.	—	+ Mo + Venesect. Forceps, vid utplånad m. m. o. djupt stående huvud.	Utskr. 24 dygn. Puerp. febrilt. Ulcus puerp. Blodtr. 135. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 3850 gr., vikt v. utskr. 3750 gr.	
10	1585	32	I-p.	Ja	Svullnad i ben. Ögonflimmer. Blodtryck 160. Alb. 0,3 %.	3 d. eft. ink.: Alb. 0,5 %.	Venesectio efter 3 d. Hinnstick (12 d) Forceps vid utplånad m. m.	Utskr. 10 dygn. Puerp. afebr. Blodtr. 130. Alb. 0,05.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 3300 gr., vikt v. utskr. 3460 gr.	Forceps för värksvaghhet. Exæres. placent. för Retentio placent.
11	1805	20	I-p.	Ja	Svullnad i ben, ansikte och händer. Huvudvärk. Blodtr. 135. Alb. 0,25 %.	3 d. senare: Blodtr. 170. Alb. 0,3.	Venesectio. Forceps vid dricksglasvid m. m. för hot. fosterasfyxi.	Utskr. 9 dygn. Puerp. afebr. Blodtr. 105. Alb. sp.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 3100 gr., vikt v. utskr. 2890 gr.	

N:o	Journ. N:o	Ålder	para	Fullg.	Tillstånd vid inkomsten	Tillstånd senare	Behandling	Utgång för modern	Utgång för fostret	Anmärkn.
12	1807	43	VI-p.	Ja	Svullnad i benen. Blodtryck 185. Alb. 0,15 % Liv- modern spänd. Fosterläge svårt att bestämma. Värkar.	Tydl. symtom på ablatio placent. Fosterljud ej hörbara.	Venesect. Vag. kejsarsnitt + (Perforation o. Kranioklasi).	Utskr. 18 dygn. Puerperiet lindrigt febrilt. Blodtr. 120. Alb. 0.	† under för- lossningen.	Exæresis av delvis adherent placenta.
13	2139	31	II-p.	Nej	Allm. ödem. Tryck i mag- gropen. Blodtr. 160. 0,9 alb.	Urinmängd. ökade, alb. halt sjönk. Blodtryck varierade 115—180.	Venosectio. 1 mån. efter ink. spontan partus.	Utskr. 24 dygn. Puerp. febrilt. Mastit. supp. Blodtr. 115. Alb. 0,02 %.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 3200 gr., vikt v. utskr. 3300 gr.	
14	2222	42	III-p.	Ja	Svullnad i ben. Huvudvärk. Kräkning. Blodtr. 175. Alb. 0,1 %.	Förbättrades närmaste 14 dagarne sedan stig. Blodtryck (195). 0 alb.	Venesectio. Dagen efter hinnstick spont. partus.	Utskr. 10 dygn. Puerp. afebr. Blodtr. 125. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 2380 gr., vikt v. utskr. 2120 gr.	1920 part arte præm. för Eclamp- sism.
15	2225	39	I-p.	Ja	Allm. svullnad. Huvudvärk. Kräk- ning. Blodtr. 185. Alb. Neurit. optic. Värkar.	—	Venesectio. Spont. partus.	Utskr. 8 dygn. Puerp. afebr. Alb. 0. Blodtr. 130	Utskr. lev. Vikt v. fød. 3620 gr., vikt v. utskr. 3350 gr.	
16	2278	35	I-p.	Ja	Svullnad i ben. och ansikte. Blodtr. 160. Alb. 0,8 %. Värkar.	Efter 4 dag. Blodtr. 165. Alb. 0,5.	Forceps vid ut- plånad moder- mun o. djupst. fosterhuvud på grund av hot. fosterasfyxi.	Utskr. 12 dygn. Puerp. lindr. febrilt 3 dag. Blodtr. 115. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 3240 gr., vikt v. utskr. 3400 gr.	

17	2484	42	XII-p.	Nej	Allm. svullnad. ascites. Hydrotorax. Blodtr. 160. Alb. 1,2 %.	Efter 4 dag. Blodt. 180. Alb. 0,6. Huvudvärk. Restkväve 22,4 mgm.	Spont. partus.	Utskr. 16 dygn. Puerp. afebr. Blodtr. 150. Alb. 0,1.	Utskr. dött. Vikt v. fød. 1170 gr. Debilitas congenit.	
18	2491	32	I-p.	Ja	Huvudvärk. Ögonflimmer. Blodtr. 245. Alb. sp. korn. och hyalina cylindrar. Värkar.	—	Venesectio. Forceps vid utpl. modermun och djupställt huvud.	Utskr. 16 dygn. Puerp. febrilt 12 dagar. Blodtr. 120. Alb. spår.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 3380 gr., vikt v. utskr. 3060 gr.	
19	2496	28	I-p.	Ja	Allm. Svullnad. Huvudvärk. Blodtr. 170. Alb. 0,2 %.	Efter 3 dagar Blodtr. 135. Alb. 1 %.	+ Mo. Forceps efter främre och bakre cervixklipp. ¹⁾ (värksvaghett).	Utskr. 19 dygn. Puerp. febrilt första veckan. Cystitis. Blodtr. 110. Alb. 0.	Utskr. dött (levde knappt en timma). Section: Hæmorrhagia. Cerebri.	¹⁾ Fostervatten stinkande, missfärgat.
20	2587	41	III-p.	Ja	Svullnad i ben. Huvudvärk. Kräkningar. Blodtr. 140. Alb. 0,05. Värkar.	Blodtr. 170.	Venesectio. Spont. partus.	Utskr. levande. Puerp. febrilt 6 dagar. Blodtr. 120. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 3820 gr., vikt v. utskr. 3830 gr.	Foglossning
21	2618	34	I-p.	Nej	Allm. svullnad. Blodtr. 170. Alb. 0,1 %.	Blodtryck 185 - 190. Alb. 0,5. Restkväve 19,6 mgm.	Venesectio. Senare hinnstick och spont. partus.	Utskr. levande. Puerp. afebr. Blodtr. 135. Alb. 0,3 %.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 2750 gr., vikt v. utskr. 3121 gr.	

Sammanställning av 5 fall av Eclampsia gravidarum.

N:o	Journ N:o	Ålder	-para	Fullg.	Urinens beskaffenhet Blodtr: m m.	Anfall före förlossn.	Behandling	Anfall efter förlossn.	Utgång för modern	Utgång för fostret
1	38	30	II-p.	Nej	Urin 1 % alb. Allm. ödem. Huvudvärk. Kräkningar.	4	Venesectio + Stro- ganoff + Hinnst., sedan värkar efter 1¼ timma. Efter 4 anf. och utplån. modern. Forceps.	0	Utskr. 10 dygn. Puerp. afebr. Spår av alb.	Utskr. lev. Vikt vid fød. 2750 gr. Vikt vid utskr. 2740 gr.
2	78	25	II-p.	Nej	Urin U % alb. Blodtr. 130.	18	Venesectio + Stro- ganoff + Hinn- stick. Spont. Partus. ✓	137	† två dagar efter partus. ¹⁾	† under förl. Vikt vid fød. 1150 gr.
3	1502	31	I-p.	Nej	Urin 1,2 % alb. Porterbrun. Korn. cylindr. Blodtr. 170. Allm. ödem. Huvudvärk. Smärt. i maggr.	7	Venesectio + Stro- ganoff. Värkar 15 t. efter ink. intet anfall efter inledd beh. Spont. partus. ✓	0	Utskr 11 dygn. Puerp. afebrilt. Blodtr. 145. Alb. 0,05 %.	† under förl. Vikt vid fød. 1620 gr.
4	1882	29	II-p. (1 Ab.)	Nej	Urin 1,2 % alb. Blodtr. 180. Svulln. i benen. Huvudvärk. Kräkningar.	3	Venesectio + Stro- ganoff + Hinn- stick. Värkar 4 t. senare + Forceps vid utplånad modernun. ✓	0	²⁾ Utskr. † 6 v. efter part. Blodtr. 3½ v. eft. part. sjunkit till 130. Alb. 0,06%. Fått kläder. Sjukt. i bentr. + hjärtromb.	Utskr. lev. Vikt vid fød. 1900 gr. Vikt vid utskr. 1980 gr.
5	2514	44	I-p.	Nej	Urin 0,8 % alb. Blodtr. 185. Allm. ödem. Huvudvärk. Restkv. 36,4 mgm.	3	Venesectio + Stroga- noff. 2 d. efter ink. vid stigande blodtr. (210), urinmängd 500 cm., alb. 0,5 %, hinnstick. Sedan åter venesect. Värkar. Forceps vid utpl. modernun. ✓	0	Utskr. 13 dygn. Blodtr 140. Alb. 0,05 %. Puerp. afebr.	Utskr. † 2 dag efter partus. Vikt vid fød. 1350 gr.

¹⁾ Section: P. A. D. Neph. (sub.) Chron. Parenkymat. + Degeneratio et Hæmorrhagia hepatis + Oedema cerebr. (Eclampsia).

²⁾ Efter inledandet av Stroganoff intet anfall. En v. senare vid stig. blodtr. (200) och alb. 1,4 %, Hinnstick. Section: P. A. D. Thromb. sin. sagitt. et ven. Cerebri c. encephalomalacia + bronchopneumon. + tuberculos rese. dx.

Sammanställning av 3 fall av Eclampsia post partum.

N:o	Journ. N:o	Ålder	para	Fullg.	Tillstånd före förlossningen.	Förlossning	Anfall	Utgång för modern	Utgång för fostret
1	403	26	I-p.	Nej	Blodtryck 155. alb. 0,3 %.	Spontan partus	1	Utskr. 10 dygn. Puerp. afebr. Alb. 0 %.	Utskr. levande. Vikt vid fød. 1720 gr. Vikt vid utskr. 1650 gr.
2	782	38	VII-p.	Ja	Svullnad i benen. Huvudvärk. (För- löst i hemmet).	Spontan partus	1 före in- komsten. Blodtr. 145. Alb. 0,8 %.	Utskr. 12 dygn. Puerp. afebr. Alb. 0,1 %.	Utskr. levande. Vikt vid fød. 2610 gr. Vikt. vid utskr. 2500 gr.
3	2281	22	I-p.	Ja	Blodtryck 155. Alb. spår.	Spontan partus	1	Utskr. 9 dygn. Puerp. afebr. Blodtryck 130. Alb. spår.	Utskr. levande. Vikt. vid fød 3640 gr. Vikt vid utskr. 3600 gr.

Sammanställning av 7 fall av Eclampsia parturient.

N:o	Journ. N:o	Ålder	para	Fullg.	Tillstånd före förlossningen	Anfall före förlossn.	Behandling	Anfall efter förlossn.	Utgång för modern	Utgång för fostret	Anm.
1	1087	39	I-p.	Nej	Allm. vattensv. Huvudvärk. Kräkning. och smärtor i maggropen. Alb. 1,2 %/o. Blodtr. 220 + Retinit-albumin.	1	Venesectio + + mo. Spont. partus.	0	Utskr. 11 dygn. Blodtr. 170. Alb. 0,08 %/o. Puerp. afebr.	Utskr. levande. Vikt vid fød. 1500 gr. Vikt vid utskr. 1460 gr.	Ablatio placentaë (1/2 flat-hand).
2	1226	28	I-p.	Ja	Svullnad i ben. Kräkningar. Alb. 0,6 %/o. Blodtr. 160.	1	Venesectio + + mo + Forceps v. utpl. m. m.	0	Utskr. 18 dygn. Febrilt 3 d. Alb. 0. Blodtr. 90-100.	Utskr. levande. Vikt vid fød. 2550 gr. Vikt vid utskr. 3025 gr.	
3	1881	17	I-p.	Ja	Allm. Vatten-svullnad. Huvudvärk. Blodtr. 140. Alb. 1 %/o.	4	Venesectio + Stroganoff + Spont. partus.	0	Utskr. 11 dygn. Puerp. afebr. Alb. 0. Blodtr. 120.	Utskr. levande. Vikt vid fød. 2630 gr. Vikt vid utskr. 2600 gr.	

4	2086	26	III-p.	Ja	Huvudvärk. Kräkning. Mörkbrun urin. Alb. 0,2 ‰. Blodtr. 130.	3	Stroganoff. Hinnsprängn. Spont. partus. ✓	0	Utskr. 9 dygn. Puerp. afebr. Alb. 0. Blodtr. 120.	Utskr. levande. Vikt vid fød. 4060 gr. Vikt vid utskr. 4000 gr.	
✓ 5	2277	22	I-p.	Ja	Allm. vatten- svullnad. Huvudvärk. Vit cordis. Blodtr. 125. Alb. 0,1 ‰.	1	Digitalis, mo. Perforat. + Kranioklasi v. utpl. m. m. ✓	0	Utskr. 16 dygn. till Sahlgr. sjukhuset för sitt hjärtfel. Puerp subfebr. Alb. 0.	† före förlossn.	
✓ 6	2515	21	I-p.	Ja	Svulln. i fötter- na, flimmer för ögonen. Huvudvärk. Kräkning. Blodtr. 155. Alb. 0,06.	1	+ Mo. Forceps v. nära utpl. modermun. ✓	0	Utskr. 11 dygn. Puerp. nästan afebrilt Blodtr. 100. Alb. 0.	Utskr. levande. Vikt vid fød. 2490 gr. Vikt vid utskr. 2150 gr.	
7	2637	40	VII-p.	Ja	Allm. ödem. Huvudvärk Blodtr. 140. Alb. 0,9.	5?	Förlöst före hitkomsten. + Mo.	0	Utskr. † 3 da- gen. ¹⁾	† under för- lossningen. Vikt 3065 gr.	¹⁾ Section: (P. A. D.) Nephrit- nephros (chron. et acut.)+Vit org.cordis.

Enligt bifogade sammanställningar hava under året vårdats å Göteborgs barnbördshus 36 fall av Graviditetstoxikos (Nephropatier ej inberäknade).

- 1) 21 fall av Eclampsismus.
- 2) 5 » » Eclampsia gravid.
- 3) 7 » » » parturient.
- 4) 3 » » » puerp.

Eclampsismus.

Inom grupp I, där åldern varierar mellan 20—43 år voro: 12 I-p., 4 II-p., 5 plurip. (därav 1 XII-p.).

Av I-p. voro 9 fullgångna, 3 ofullgångna.

- | | | | |
|-----------|-----|-----|---|
| » II-p. | » 1 | » 3 | » |
| » plurip. | » 4 | » 1 | » |

11 av fallen inkommo med värkar. 2 av dessa fall förlöstes spontant utan ingrepp, 3 spontant efter endast vensection.

3 förlöstes efter vensection och spontant öppnade mjukdelar med forceps (N:o 397, 1508, 2491).

1 förlöstes efter vensection med vaginalt kejsarsnitt (1807) på ind. ablat. placent.

2 » utan » med forceps (i ett fall värksvaghhet, i ett hotande fosterasfyxi) (2496, 2278).

I fallen utan börjat förlossningsarbete vid inkomsten förlöpte N:o 822, 1,384 och 2,139 spontant efter vensection: i det första påkom förlossning 2 veck. efter inkomsten, i det andra 1 vecka efter ink. och i det tredje en mån. efter.

I fall 208, 1,224, 2,618, 2,222 spontan förlossning efter hinnstick (i 3 av fallen vensection).

I fall 1,096 gjordes abdominalt kejsarsnitt vid misstanke på hotande uterusruptur. I fall 1,585 vensection, hinnstick och forceps (värksvaghhet), i fall 1,805 vensection och forceps (hotande fosterasfyxi). Alla mödrar utskrevos levande, 7 med kvarstående albumin (spår till 0,1) i urinen. I 11 fall puerperiet afibrilt, i 5 fall lindrigt febrilt, i 2 fall ulcus puerperales, i 2 fall urinvägsinfektion, i ett suppurerande mastit.

Av fostren (21 till antalet) voro 19 levande vid födelsen (2 dogo under förlossningen), 17 utskrevos levande. Av de 2 efter födelsen döda barnen var det ena ej viabelt, det andra avled av Haemorrhagia cerebri (2496) efter forceps.

Mortaliet: för mödrarna: 0, för fostren 19 %.

Eclampsia gravidarum.

I grupp 2) varierar åldern mellan 25—44 år.

- | | |
|-----------|--------------|
| 2 I-para. | ofullgångna, |
| 3 II-paræ | » |

Alla behandlades med vensection och Stroganoff, i 4 fall sprängdes hinnorna, varpå värkar inställde sig och förlossningen avslutades spontant i fall 78 och i 3 fall (38, 1882, 2514) vid utplånad modermun med forceps. I ett fall (1502) slutade anfallen efter inledd behandling. Värkar inställde sig spontant och

förlossningen avslutades av naturen. Utom i fall 78, som utmärkte sig genom ett ovanligt stort antal anfall: särskilt efter förlossningens slut, upphörde anfällen med partus.

2 mödrar avledo, den ena två dagar efter partus, den andra 6 veckor efteråt. Dödsfallet torde dock stå i samband med hennes eclampsi. Av fostren dogo 2, (vikt resp. 1150 och 1620 gr.) under förlossningen, ett tredje (vikt 1350 gr.) 2 dagar efter partus.

Mortalitet: för mödrarna 40 %, för fostren 60 %.

Eclampsia parturientium.

Grupp omfattar 7 fall med åldern varierande mellan 17—39 år.

5 voro I-para (därav 4 fullgångna).

2 fullgångna pluriparae (därav en VII-parae, förlöst före ink.)

Efter vensection + Stroganoff spontan förlossning i fallen 1087, 1881, efter endast vensection och hinnsprängning förlossning i fall 2086.

I fallen 2515 och 1226 förlöstes vid utplånad m. m. med forceps, och i fall 2277 (dött foster) med perforation och kranioklasi.

Ett fall 2637, som ej undergått någon behandling, inkom, efter en del anfall i hemmet, förlöst.

I alla fallen upphörde anfällen med partus.

Alla å anstalten före förlossningen vårdade mödrar utskrevos levande, endast den i hemmet förlösta avled — 3 dagar efter partus.

5 av fostren utskrevos levande, 2 döda resp. före och efter förlossningen.

Mortalitet: för mödrarna 14.28 %, för fostren 28.57 %.

Eclampsia puerperarum.

I grupp 44 hava förekommit 3 fall från 22—38 år.

2 I-para, den ena fullgången, den andra ofullgången.

1 VII-parae fullgången.

Alla förlöstes spontant, hade vardera endast ett anfall, utskrevos levande liksom fostren.

Mortalitet: för mödrarna 0, för fostren 0.

För samtliga 36 fall av graviditets-toxikos blir mortalitets-% för mödrarna 8.33 %, för fostren 25 %.

Till graviditets-toxikoserna bör även inräknas ett i tabellen ej inrubricerat fall av Akut leverdegeneration vadan mortalitets-% för samtliga mödrar och foster höjes till 10.8 % resp. 27 %.

För samtliga Eklampsifall (90) under åren 1918—1922 är mortalitets% för mödrarna 8.88, för fostren (antal 94) 32.97 %.

För Eklampsifallen under 1922 blir mortalitets-% för mödrarna 20 %, för fostren 53 %.

Sammanställning av 13 fall av bäckenförträngning.

Fall	Journ. No	Ålder	Fullg. ber. efter sista regl.	para	Föregående förlossningar	Bäckenförträngningens art och grad	Förlossn. duration	Förlossningens förlopp	Utgång för modern	Utgång för barnet. Dess vikt och huvudets storlek	Anm.
1	371	23	Ja	I-p.	—	Allm. förträngt bäcken. Sp. il. 22,5 cm. Cr. il. 26,5 » C. B. 17 »	36 t.	Forceps. (hotande fosterasfyxi).	Utskr. 8 dygn. Puerperiet afebrilt.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 3600 gr. Vikt v. utskr. 3300 gr. Huvudomk. 36,5 cm. D. B. 9,5 cm.	
2	478	22	Nej	II-p.	I spont part. Lev. barn.	Allm. förträngt bäcken. Sp. il. 21,75 cm. Cr. il. 23,75 » C. B. 17,5 » C-d 10 »	4 d.	Spontant.	Utskr. 8 dygn. Puerperiet afebrilt.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 2750 gr. Vikt v. utskr. 2700 gr. Huvudomk. 32 cm. D. B. 9,5 cm.	Primär värksvaghet.
3	485	30	Nej	II-p.	I Forceps. Lev. barn.	Platt förträngt bäcken. Sp. il. 26,5 cm. Cr. il. 30 » C. B. 19 » C-d 10 »	11 t.	Hög tång sedan eft. 5 t. kraft. krystv. och stigande kontr. ring huv. upphörde att skrida.	Utskr. 10 dygn. Puerp. afebr. utom en dag (Lymfangit nammæ).	Utskr. lev. Vikt v. fød. 3680 gr. Vikt v. utskr. 3650 gr. Huvudomk. 35 cm. D. B. 8,5 cm.	
4	559	26	Ja	I-p.	—	Allm. förträngt bäcken. Sp. il. 25 cm. Cr. il. 27 » C. B. 17,5 » C-d 11 »	3½ dag	Efter tångf. och sedan fostret dött perforat. + Kranioklasi.	Utskr. 23 dygn. Puerp. febrilt 9 första dag. (Pyelit).	† under förlossningen.	Långvarigt förl.-arbete. temp. stegr. (39,3). Hög tång.

5	652	23	Ja	I-p.	—	Allm. förträngt bäcken. Sp. il. 23,5 cm. Cr. il. 25 » C. B. 17,5 »	11 t.	Spontant.	Utskr. 8 dygn. Puerperiet afebrilt.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 2670 gr. Vikt v. utskr. 2410 gr. Huvudomk. 32,5 cm. D. B. 8,5 cm.	
6	714	41	Ja	VIII-p.	7 föreg. spont. förlossningar med levande barn.	Platt förträngt bäcken. Sp. il. 28 cm. Cr. il. 29 » C. B. 18,5 » C-d 9,5 »	33 t.	Pannbjudn. Hotande uterupt. Tångf. Perf. av lev. fost. + Kranioklasi.	Utskr. 10 dygn. Puerperiet afebrilt.	† under förlossningen.	Pat. som förut hade 7 lev. barn vägrade att underkasta sig kejsarsnitt och då hennes tillst. indicer. förl. avslutn. skreds, efter tångf. till perf. av det lev. fostret.
7	775	29	Ja	IV-p.	I p. abort. II p. besvärlig tångförlossn. Lev. barn. III p. abort.	Allm. förträngt bäcken. Sp. il. 27 cm. Cr. il. 29 » C. B. 18 » C-d 11 »	20 t.	Kejsarsnitt (Lågt snitt).	Utskr. 16 dygn. Lindrigt febril (Högst 38,3) 10 dagar.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3700 gr. Vikt v. utskr. 3710 gr. Huvudomk. 38 cm. D. B. 10 cm.	Huvudets ben mycket hårda. Op. före vattnets avgång.
8	813	36	Ja	IV-p.	I p. Eclampsi Lev. barn. II p. dödfött foster. III p. Hæmorrhagia p. p.	Förtr. bäcken C-d 11 cm.	20 t.	Fotbjudn. + Prolaps funic. Extraktion.	Utskr. 11 dygn. Puerperiet afebrilt.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3800 gr. Vikt v. utskr. 3500 gr. Huvudomk. 37 cm. D. B. 11 cm.	Större inpression å ena hjässonen.
9	1134	45	Ja	V-p.	4 spontana förl. med lev. barn.	Relativ bäckenförträngning. Sp. il. 24,5 cm. Cr. il. 26,25 » C. B. 21 » C-d 12 »	3 t.	Långv. förl.-arb. Hot uterusrupt Efter förs. med h. tång perf. av asf. fost. + Kranioklasi.	Utskr. 7 dygn. Puerperiet afebrilt.	† under förl. Vikt sine cerebro 4100 gr.	

Fall	Journ. N:o	Ålder	Fullg. ber. efter sista regl.	para	Föregående förlossningar	Bäckenförträngningens art och grad	Förlossn. duration	Förlossningens förlopp	Utgång för modern	Utgång för fostret	Anm.
10	1276	40	Ja	I-p.	—	Relativ bäckenförtr. Bäckenmått ej antecknade.	3 d.	Cervixklipp + Perforat. (dött fost) + Kra-nioklasi. Hot. uter. ruptur.	Utskr. 12 dygn. Puerp. lindrig feber (38,2) 2 dagar.	† under förlossn. Vikt sine cerebro 3640 gr.	Rachitis som barn. Myoma uteri.
11	1633	32	Ja	VI-p.	I p. tång, lev. barn. II p. abort. III p. » IV p. tång, dött foster. V part. präm. (dött foster).	Platt förträngt bäcken. Sp. il. 28 cm. Cr. il. 29 » C. B. 19 » C-d. 10 » Symfys inbuktande.	29 t.	Spontant.	Utskr. 8 dygn. Puerperiet afebrilt.	Utskr. lev. Vikt v. fød. 3600 gr. Vikt v. utskr. 3400 gr. Huvudomk. 36 cm. D. B. 9,2 cm.	
12	2472	30	Ja	II-p.	I-p. abort.	Allm. förträngt bäcken. Sp. il. 23,5 cm. Cr. il. 27,5 » C. B. 19 »	68 t	Forceps Exaeres. Placent.	Utskr. 11 dygn. Febril 3 dag. (högst 38,8).	† under förlossningen. Vikt 3350.	Hæmorrhagia p. p.
13	2787	34	Ja	VIII-p.	5 lev. barn. spont. part. 2 instr. förl. (döda foster)	Platt förträngt bäcken. Sp. il. 25 cm. Cr. il. 27 » C. B. 18 » C-d. 10 »	Över 4 d.	Försumm. tvärläge (dött fost.) Decapitati 0.	Utskr. 7 dygn. Puerperiet afebrilt.	† under förlossningen.	Inkom från landet med försummat tvärläge.

Efter 33 timmars förlossningsarbete uppstod en hotande uterusruptur.

Kejsarsnitt vägrade patienten att underkasta sig. Efter misslyckat tångförsök måste det ännu levande fostret offras. Puerperiet normalt.

Den andra (2787) kom in efter fyra dygns förlossningsarbete från landet med försummat tvärläge och förlöstes genom dekapitation.

Puerperiet även här afebrilt.

Inom grupp III var 1 I-p. den andra V-p.

Båda utmärkte sig genom långvarigt (3 d.) förlossningsarbete och genom hotande uterusruptur. I ena fallet (1276) dog fostret före perforationen, i det andra (1134) försöktes, då fostret ännu levde, att förlösa med hög forceps, och då detta misslyckades perforerades det asfyktiska fostret. Puerperiet i båda fallen utan nämnvärd anmärkning.

I grupp IV med bäckenförträngning av obestämd art bjöd sig fostret med en fot. Efter 15 timmar gjordes extraktion, varvid det uppstod rätt stora svårigheter att få huvudet genom övre bäckenöppningen.

Levande foster. Alla mödrar utskrevos friska. Puerperierna (det längsta 23 dagar) relativt ostörda. Medeltalet vård dagar 10.

Av fostren utskrevos 7 levande och 6 döda (4 under förlossningen spontant döda) 2 efter perforation (det ena asfyktiskt).

Mortalitet: för mödrarne 0, för fostren 46 %.

Sammanställningen omfattar 13 fall av missförhållande mellan fosterhuvudet och bäckenet.

- 1) 6 fall av allmänt förträngt bäcken.
- 2) 4 » » platt » »
- 3) 2 » » relativ bäckenförträngning.
- 4) 1 » där av brist på uppgift i journalen bäckenets art ej kunnat bedömas men där det sannolikt är fråga om ett lindrigt plattförträngt bäcken.

Inom grupp I voro 3 I-p. och 2 II-p. samt I IV-p.

Av I-p. voro alla fullgångna, en (652) förlöstes efter 11 timmars förlossningsarbete spontant från levande litet foster; i ett fall (371) anlades, på indikationen hotande fosterasfyxi, tång med lyckligt resultat, i det tredje fallet (559) gjordes efter $3\frac{1}{2}$ dygns förlossningsarbete sedan tång misslyckats och fostret dött perforation + extrakt. med kranioklast.

I ett av dessa fall var puerperiet stort av lymfangit mammae, i ett annat av pyelit.

Av II-p. inom grupp 1 var den ena (478) ofullgängen och fick efter 4 dygns svagt förlossningsarbete spontant ett litet, levande barn, den andra (2472) som förut endast aborterat och således var jämnställd med en I-p. hade en 68 timmars långvarig förlossning, varunder fostret dog, och förlöstes med forceps. I sistnämnda fall var puerperiet febrilt 3 dagar.

På IV-p. som aborterat 2 gånger och 1 gång genomgått en mycket besvärlig förlossning som dock lyckligt avslutades med forceps, gjordes efter 20 timmar

från värkarnes insättande och innan hinnorna Brustit, kejsarsnitt (lågt corpus-
snitt) med gott resultat för såväl moder som barn.

Inom grupp II voro: 1 II-p. ofullgången,
1 VI-p. fullgången,
2 VIII-p. fullgångna.

Den förstnämnda (485) förlöstes, då efter 5 timmars kraftiga krystvärkar
nedre uterinsegmentet hotade att övertänjas, med hög tång från levande kraf-
tigt barn.

VI-p. (1633) förlöstes efter 29 timmar spontant.

Av de två VIII-p. hade den ena (714) förut genomgått alla sina partus
spontant och fött levande barn. Denna gång bjöd sig fostret med pannan.

Under det behandlingen av särskilt Eclampsia gravid. under 1918 och 1919
var uteslutande aktiv, inleddes under 1920 och 1921 en än aktiv än exspekt
behandling, och under 1922 har i de få fall, som förekommit, behandlingen
varit uteslutande exspektiv. (Venesection + Stroganoff + event. ingrepp vid
öppnade mjukdelar.)

Av *Eclampsia gravid.* hava under åren 1918—1922 förekommit 37 fall, därav
kirurg. behandlade 22; mortalitet för mödrar 13,6 %,
exspekt. » 15; » » » fostren 47,8 % (reduc. 25 %),
» » » mödrar 20 %,
» » » fostren 66,7 % (reduc. 33,3 %).

Av *Eclampsia parturient.* hava under samma år förekommit 28 fall, därav
kirurg. behandl. 1 mortalitet för mödrar 0 %, för fostr. 1,00 %,
exspekt. » 27 » » » 7,4 %, för fostren 28,57 % (reduc. mor-
talit. 25,9 %).

Av *Eclampsia puerperar.* representerat med 25 fall, hava alla mödrar utskr.
levande, mortalitet 0 %.

Av 27 foster, ett (ofullg. gemellus vikt 1860 gr.) dött, mortalitet 3,7 %,
reduc. 0 %.

Av *Eclampsism.* under samma tidrymd 69 fall, 1 moder (n:o 842/1919) med
gemelli död i Nephrit. subcut. Hämorrhagia subseros et interparenell. hepat.
etc. Mortalitet 1,45 %.

Av 69 foster 16 döda, mortalitet 23,18 %.

Uppgift från B. B:s Gynekologiska avdelning för år 1922 angående
intagna sjukdomsfall ävensom döda.

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
	<i>III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.</i>				
8	Abortus	—	10	—	—
10	Graviditas extrauterina	—	12	—	—
13	Placentarpolyp	—	5	—	—
14	Subinvolutio uteri	—	1	—	—
16	Ruptura perinei	—	2	—	—
19	Septichæmia et pyoseptichæmia puerperalis	—	4	—	2
	Graviditet i uterus divert	—	1	—	—
	Mola hydatidosa	—	1	—	—
	<i>IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar.</i>				
22	Erysipelas	—	2	—	—
39	Influenza epidemica	—	2	—	—
33	Typhus abdominalis	—	1	—	—
42	Tuberculosis	—	7	—	—
	„ pulmonum. Tuberculosis laryngis	—	2	—	—
	„ urogenitalis	—	5	—	—
44	Syphilis acquisita	—	4	—	—
46	Gonorrhæ	—	14	—	—
	Stricture urethræ gonorrhœica	—	1	—	—
	Endomet., Salping., Peritonit.	—	13	—	—
	<i>VIII. Nervsystemets sjukdomar.</i>				
98	Epilepsia	—	1	—	—
99	Hysteria	—	2	—	—
	<i>X. Cirkulationsorganens sjukdomar.</i>				
113	Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis	—	2	—	1
116	Phlebitis	—	10	—	—
119	Thrombosis. Embolia	—	7	—	—
	<i>XI. Andningsorganens sjukdomar.</i>				
129	Tracheitis acuta. Bronchitis chr.	—	1	—	—
134	Pneumonia crouposa acuta	—	1	—	—
134	Bronchopneumonia acuta	—	1	—	—
	<i>XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.</i>				
144	Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta.	—	3	—	—
159	Appendicitis	—	9	—	—
161	Hernia	—	2	—	—
162	Obstipatio	—	1	—	—
171	Peritonitis chronica	—	4	—	—
	<i>XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.</i>				
175	Pyelitis. Cystopyelonephritis	—	4	—	—
177	Nephrolithiasis	—	1	—	—

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
180	Cystitis	—	1	—	—
184	Polypus urethræ	—	1	—	—
	Divertienhum urethræ	—	1	—	—
<i>XIV. Könsorganens sjukdomar.</i>					
B. Kvinnliga könsorganen.					
190	Prolapsus vaginæ et uteri	—	12	—	—
193	Endometritis	—	11	—	—
194	Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonitis	—	55	—	1
195	Parametritis	—	1	—	—
196	Amenorrhœa. Dysmenorrhœa. Menorrhagia, metrorrhagia	—	38	—	—
199	Mastitis	—	6	—	—
200	Hymen imperforatus	—	1	—	—
	Rupt. hymen. c. hæmorrh.	—	2	—	—
201	Polypus uteri	—	6	—	—
	Sterilitas	—	1	—	—
	Bartholinit	—	1	—	—
<i>XVI. Hudens sjukdomar.</i>					
232	Carbunculus	—	1	—	—
<i>XIX. Svulster.</i>					
307	Myoma	—	29	—	—
314	Adenoma. Kystadenoma	—	9	—	—
316	Carcinoma	—	13	—	—
	„ genitalium	—	12	—	—
	„ vesied urin.	—	1	—	—
318	Blastoma teratoides	—	1	—	—

Uppgift från B. B:s Gynekologiska avdelning för år 1922 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Pat. utskr.			Anmärkn.
			frisk eller förbättrad	oförbättrad	död	
<i>9. Sjukdom. i bröstkörteln.</i>						
Mastit. supp.	4	Incisio	4	—	—	
” subacuta	1	Amputatio mammæ	1	—	—	
<i>16. Append. vermif.</i>						
Append. chron. v. sec.	7	Appendectomi	7	—	—	
” ac.	1	”	1	—	—	
Empyema append.	1	”	1	—	—	
Frisk appendix	12	” i samband med annan op.	12	—	—	
<i>17. Bräck.</i>						
Hernia crur. incarc.	1	Rad. op.	1	—	—	
” ventr. post op.	1	” ”	1	—	—	
<i>18. Rectum o. Anus.</i>						
Fissura et contract. ani	1	Dilat. forcée	1	—	—	
Hæmorrhoider	2	Exstirpatio	2	—	—	
<i>19. Bukväggen o. peritoneum.</i>						
Peritonit. s. pelv. perit. chr. ...	3	Lap. + lysis	3	—	—	
” ” ” ...	1	” + ” + amput. uteri supra vag.	1	—	—	
” tbc.	1	” + ” explor	1	—	—	
” pur. diff. c. salpingit.	2	” + drainage	1	—	1	
Abscess. pelvis	2	Kolpotomia post.	2	—	—	
<i>23. Urinröret, blåsan.</i>						
Polyp. urethræ	1	Excisio	1	—	—	
Divertic. ”	1	Exstirpatio	1	—	—	
Strictura urethræ	1	Dilatatio	1	—	—	
Cancer vesic. urin.	1	Sectio alta + exstirp.	1	—	—	
<i>25. Kvinnl. könsorganen.</i>						
Bartholinit	1	Incisio	1	—	—	
Ruptura perinei invet.	1	Kolpoperineoraphia	1	—	—	
Prolaps uteri et vag.	2	”	2	—	—	
” ” ”	2	Kolporaphia ant. + kolpoperin.	2	—	—	} S:a 11 prolapsop.
” ” ”	4	” + kolpoperin. + amp. cerv.	4	—	—	
” ” ”	2	Kolporaphia ant. + kolpoperin. + interp. uteri (enl. Wertheim)	2	—	—	
” ” ”	2	”	2	—	—	
” ” + myoma	1	Kolporaphia ant. + kolpoperineraphia + enucl. + interpos. uteri	1	—	—	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Pat. utskr.			Anmärkn.
			frisk eller förbättrad	oförbättrad	död	
• Cervixpolyp	4	Exstirpatio	4	—	—	
• Endometrit	11	Abrasio	11	—	—	
• Metrorrhagia, menorrh.	22	”	22	—	—	
• Dysmenorrhé	6	”	6	—	—	
• Placentarpolyp	6	Exaeresis instr.	6	—	—	
• Abort	8	”	8	—	—	
• ” provoc. + steril op. ...	1	Tbc. pulm.	1	—	1	
• Myoma polyp uteri	2	Torquering	2	—	—	} S:a 24 op. för myom.
• ” subseros uteri	3	Lap. + enucleatio	3	—	—	
• ” ” uteri	14	Amputatio ut. supravag.	14	—	—	
• ” ”	4	Abrasio	4	—	—	
• ” ” + pyosalpinx ...	1	Total uterusexstirp.	1	—	—	
• Menorrhagia	1	Amput. ut. supravag.	1	—	—	
• Metrit. fibros.	1	”	—	—	—	
• Ca cervic. uteri	2	Provexcision	2	—	—	
• ” ”	2	Totalexstirp. (enl. Wertheim)	2	—	—	
• Ca corp. uteri	1	Abrasio	—	1	—	
• Graviditet i uterius div.	1	Resectio uteri	1	—	—	} S:a 11 op. för x-gravid.
• Graviditas tubar.	9	Salpingectomia	9	—	—	
• ” ”	1	” + Salp. ooph. orect.	1	—	—	
• ” abdom. (fullg)	1	Lap. + extr. av foster + drain.	—	—	1	
• Salpingo-ooph. chron.	9	Salpingectomi	8	1	—	} S:a 32 op. för Salpingit.
• ” ”	7	Salpingo-oophectomia	7	—	—	
• ” ”	12	” + Salp. ect.	12	—	—	
• Retroflex. uteri fix.	1	Salpingect. + vertrofix. ut. ...	1	—	—	
• Salpingit. tbc.	2	”	2	—	—	
• Oophorit	1	Oophorectomia	1	—	—	
• Suspect. Salpingit.	1	Lap. explor.	1	—	—	
• Graviditas + pelveoperit. ad- hær.	2	” + lysis	2	—	—	
• Kystoma ovarii	9	Ovariectomia	9	—	—	
• Cysta dermoides	1	”	1	—	—	
• ” foll. ov. c. pelv. perit. ...	1	Exstirp. av cysta + lysis	1	—	—	
• Ca ovarii	1	Ovariectomia	1	—	—	
• ” ” c. ascit.	1	Laparocentes	1	—	—	
• Fibroma ovarii	1	Ovariectomia	1	—	—	
• Tumor pelvis (Ca)	1	Provexcision fr. bakre forn. ...	—	1	—	
• Suspekt chorion epit.	1	Total uterusexstirp.	1	—	—	
28. Småoperationer.						
• Abscess. gluteal	2	Incisio	2	—	—	



6000107126



Göteborgs universitetsbibliotek

